E427|B.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30507819

LE REGNE
ANIMAL.

REGNUM
ANIMALE.

REGNUM ANIMALE

IN CLASSES IX DISTRIBUTUM,

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS GENERALEM *ANIMALIUM* diſtributionem in Claſſes IX, & duarum primarum Claſſium, *Quadrupedum* ſcilicet & *Cetaceorum*, particularem diviſionem in Ordines, Sectiones, Genera & Species.

CUM BREVI CUJUSQUE SPECIEI deſcriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium, Nominibus eis ab ipſis & Nationibus impoſitis, Nominibuſque vulgaribus.

A D. BRISSON, Hiſtoriæ Naturalis Muſei Realmuriani Demonſtratore.

Cum Figuris æneis.

PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM.

Apud Cl. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam, ad Inſigne Stæ. Genovefæ, & Sti. Joannis in Deſerto.

M. DCC. LVI.

Cum Privilegio Regis & Approbatione.

LE REGNE ANIMAL
DIVISÉ EN IX CLASSES,

OU

MÉTHODE

CONTENANT LA DIVISION GENERALE DES *Animaux* en IX Claſſes, & la diviſion particuliere des deux premieres Claſſes, ſçavoir de celle des *Quadrupedes* & de celle des *Cetacées*, en Ordres, Sections, Genres & Eſpéces.

AUX QUELLES ON A JOINT UNE courte deſcription de chaque Eſpéce, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leurs ont donnés, ceux que leurs ont donnés les différentes Nations, & les noms vulgaires.

Par M. BRISSON, Démonſtrateur du Cabinet d'Hiſtoire Naturelle de M. de Reaumur.

Avec Figures en taille douce.

A PARIS,

QUAY DES AUGUSTINS.

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte Geneviéve & S. Jean dans le Deſert.

M. DCC. LVI.

Avec Privilege du Roi & Approbation.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

A MONSIEUR
DE REAUMUR,

Commandeur & Intendant de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis; de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, des Académies de Peterſbourg & de Berlin, de l'Inſtitut de Bologne, &c. &c.

MONSIEUR,

Il ne fut jamais d'hommage plus légitime que celui que je vous rends aujourd'hui. Cet Ouvrage doit être

regardé comme votre bien, puiſque c'eſt chez vous que j'ai puiſé les connoiſſances qui l'ont produit. Si le Public lui accorde ſon ſuffrage, c'eſt à votre Nom ſeul que je le devrai.

J'ai l'honneur d'être avec un profond reſpect,

MONSIEUR,

Votre très humble &
très obéiſſant ſerviteur.
BRISSON.

PREFACE.

LA place que j'ai le bonheur d'occuper depuis pluſieurs années, m'ayant mis journellement ſous les yeux la plus riche collection des productions de la nature, qui ait jamais été faite, m'a donné la facilité de faire un grand nombre d'obſervations ſur le Regne Animal, de comparer entr'eux les êtres animés qui lui appartiennent, d'en examiner les rapports les plus prochains & les plus éloignés. J'ai été ainſi conduit à penſer à diſpoſer les Animaux dans un ordre différent de ceux, où on les a mis juſqu'ici. Mon intention, en y travaillant, étoit uniquement de m'inſtruire moi-même, & de me mettre en état de juger des places les plus convenables aux nouveaux Animaux, qui ſe préſenteroient pour en avoir une dans ces Cabinets, dont le ſoin m'eſt confié, & où il y en a tant de raſſemblés: & la juſte défiance que j'ai de mes lumieres, ne m'eût pas permis de faire paroître au jour la diſtribution qui m'avoit ſemblé la plus commode, ſi je n'y euſſe été encouragé par des Sçavans, qui m'ont aidé de leurs conſeils, pendant que j'y travaillois; & pour tout dire, par l'approbation que lui a donnée la plus célébre des Académies, l'Académie Royale des Sciences.

J'oſe embraſſer tout le Regne Animal. Il ſera diviſé en Claſſes ; les Claſſes en Ordres ; les Ordres en Sections ; les Sections en Genres ; & les Genres en Eſpéces. Chacune de ces diviſions ou ſous-diviſions aura un caractere qui lui ſera propre. Le premier déſignera la Claſſe ; le ſecond l'Ordre ; le troiſiéme la Section ou le Genre. Je dis, la Section, ou le Genre ; parce qu'il y a quelques Animaux, comme le *Rhinoceros*, qui ſeuls compoſent un Ordre, lequel par conſéquent n'eſt point diviſé en Sections : alors le troiſiéme caractere eſt celui du Genre. Au contraire, lorſque l'Ordre ſera diviſé en Sections, ce ſera par le quatriéme caractere que le Genre ſera déſigné. Pour ce qui eſt des Eſpéces, je me contenterai d'une courte énumeration de ce qu'il y a de propre à les faire diſtinguer les unes des autres ; me reſervant à donner des deſcriptions plus détaillées de ces mêmes Eſpéces, lorſque je publierai, comme je me le propoſe, une deſcription générale du magnifique Cabinet d'Hiſtoire Naturelle de M. de Reaumur.

Il y aura donc tout au plus cinq choſes à obſerver, non ſeulement pour mettre un Animal dans ſon Genre, mais encore pour en déterminer l'Eſpéce. Je ſuppoſe, par exemple, qu'on préſente un *Caſtor* à quelqu'un qui n'en a jamais vû, & qui ne le connoît point du tout : par le moyen de cette méthode il connoîtra dans le moment l'eſpéce de cet Animal. Premierement ſes *quatre pieds*, & le *poil* dont ſon corps eſt couvert, lui apprendront qu'il eſt de la premiere Claſſe, de celle des Quadrupedes. Secondement les *deux dents inciſives* qu'il a à chacune de ſes mâchoires, & les ongles de ſes doigts, ou ſes doigts qui ſont de ceux que l'on

nomme *onguiculés*, lui feront connoître qu'il eſt du XII Ordre de cette Claſſe. Troiſiémement en continuant de l'obſerver, il remarquera qu'il eſt dépourvû de *dents Canines*, & qu'il n'a pas de *picquants* ſur le corps; ce qui lui apprendra qu'il eſt de la II Section de cet Ordre. Quatriémement ſa queue *platte & écailleuſe* lui déſignera le XXI Genre pour celui auquel l'Animal appartient. Cinquiémement enfin l'applatiſſement *horizontal* de cette queue déterminera l'Eſpéce, & lui apprendra qu'il eſt le *Caſtor*: & ainſi des autres Eſpéces.

J'ai tâché de ne faire rien entrer dans les caracteres que de ſimple & de facile à appercevoir, pour ne point expoſer aux erreurs dans leſquelles des caracteres plus compliqués pourroient induire. Au reſte je ne me flatte pas d'avoir toujours été aſſez heureux pour ſaiſir ce qu'il y avoit de mieux; je ſerai ſenſiblement obligé à ceux qui voudront bien me le montrer, & me faire connoître mes fautes, que je ſerai empreſſé à corriger.

On imagine bien que je n'ai pû parvenir à voir toutes les eſpéces d'Animaux dont il eſt parlé dans cet Ouvrage. Celles que j'ai éte à portée d'éxaminer de mes propres yeux, je les ai décrites avec le plus d'exactitude qu'il m'a été poſſible. Pour ce qui eſt de l'exactitude des deſcriptions des autres Eſpéces, j'en donne pour garants les Auteurs qui me les ont fournies. Auſſi, afin qu'on ſache à quoi s'en tenir, ai-je marqué de * * les Eſpéces dont j'ai fait la deſcription ſur l'Animal même; & de * ſeulement celles que je n'ai vûes qu'en partie, celles dont j'ai vû ſeulement les parties d'où j'ai tiré les caracteres. Le reſte de leur deſ-

cription, & les deſcriptions entieres des Eſpéces qui n'ont aucune marque, je les ai faites d'apres les différens Auteurs cités dans cet Ouvrage : & j'ai toujours préferé la deſcription de ceux qui ont dit avoir vû l'Animal.

Ce premier Volume ne contiendra que les deux premieres Claſſes, celle des Quadrupedes, & celle des Cetacées. Si cet Eſſai eſt agréé du Public, le deſir que j'ai de lui plaire, & de lui être utile, me fera travailler avec ardeur à achever de mettre les autres Claſſes en état de lui être préſentées.

Les Figures que j'ai fait graver, ont toutes été deſſinées ſur l'original. Mon intention étoit d'en donner au moins une de chaque Genre; mais l'impoſſibilité, dans laquelle je me ſuis trouvé, d'avoir les originaux néceſſaires, jointe à ce qu'elles m'ont paru aſſez peu utiles, puiſque la plûpart des caracteres ne ſont tirés que du nombre des *dents* & des *doigts*, m'a déterminé à n'en donner qu'un petit nombre : & ce petit nombre contient des parties d'Animaux, qui, quoique pour la plûpart aſſez communs, nont jamais été bien décrits. Je ferai mon poſſible pour remplir ma premiere intention dans les Claſſes ſuivantes; c'eſt-à-dire, que je donnerai au moins une Figure de chaque Genre; parce que le plus ſouvent il ne s'agira plus de nombres, mais de formes, toujours difficiles à ſaiſir par la ſimple deſcription : & toutes ces Figures ſeront gravées d'après nature.

E R R A T A.

Precedens, *ſemper lege*, præcedens.

Page 3	Ligne 13.	qui eſt, *liſez*, qui en.
4	20.	CETACE'S, *liſez*, CETACÉES.
6	17 & 38.	CRUSTACE'S, *liſez*, CRUSTACE'ES.
7	29.	CETACE'S, *liſez*, CETACE'ES.
18	39.	nudique, *lege*, undique,
28	7.	*Kelin. liſez*, *Klein.*
36	14, 17 & 25.	eum, *lege*, illud.
40	34.	SCHILRVERKEN, *liſez*, SCHILDVERKEN.
69	6.	Bezoarticus, *lege*, Bezaarticus.
	8.	Bezaarticus, *lege*, Bezoarticus.
73	4.	craſſia, *lege*. craſſa
75	16.	L^{e}MBLIN, *liſez*, L$\overset{e}{A}$MBLIN.
88	23.	Goenlandica, *lege*, Groenlandica.
140	33.	1 ^{1} pede, *lege*, $1\frac{1}{2}$ pede.
	39.	2 ^{1} pollices, *lege*, $2\frac{1}{2}$ pollices.
156	12.	Au, *lege*, An.
170	33.	7 pollicum, *lege*, $7\frac{1}{2}$ pollicum.
175	16.	$1\frac{}{2}$ pouce, *liſez*, $1\frac{1}{2}$ pouce.
196	18.	C aapud, *lege*, Cay apud.
201	29.	Gaput, *lege*, Caput.
215	16.	Fig. a, *lege*, Fig. 4. a.
241	26.	BL$\overset{e}{A}$R$\overset{e}{A}$F, *liſez*, BL$\overset{o}{A}$R$\overset{e}{A}$F.
246	37.	habet l ata, *lege*, habet latas
259	40.	d'argentré, *liſez*, d'argenté.
270	3.	variegatâ, *lege*, variegata.
310	37.	Aſna, *lege*, Äſna.
311	17.	Biſon, 1. 6. *lege*, Biſon, 11 6.
	18.	— Amériquain, 1. 7. *lege*, — Amériquain, 11 7.
312	24.	Bandhirts, *lege*, Brandhirts.
319	19.	Fl^{e}dermus, *lege*, Fl$\overset{e}{a}$dermus.
347	11.	Maxillâ, *lege*, Maxilla,
352	6.	*Geſn. lege*, *Gen.*
	13.	*Gen. lege*, *Geſn.*
375	5.	en, *lege*, ex.

De l'Imprimerie de D'HOURY Fils.

REGNUM

REGNUM *ANIMALE* IN CLASSES IX. DISTRIBUTUM.

ANTEQUAM caracteres uniuſcujuſque claſſis enumeremus, obſervandæ ſunt rationes ob quas in hoc ordine claſſes iſtas reponimus. Agemus primó de Animalibus, quæ majorem habent cum homine analogiam: & deinde de Animalibus, quæ ab iſta analogia magis recedunt. Inter Animalia, alia, hominis modo, ſunt *Sanguinea*; id eſt, liquor rubicundus circulari & indeſinenti motu per ipſorum arterias & venas fluit, cui liquori rubicundo *Sanguinis* nomen inditum eſt: alia veró ſunt *Exanguia*; id eſt, liquore illo rubicundo omninò carent. Inter *Sanguinea*, alia *Pulmonibus* ut homo; alia *Branchiis* ſpirant. Ex iſtis quæ *Pulmoni-*

LE REGNE *ANIMAL* DIVISÉ EN IX. CLASSES.

AVANT d'établir les caracteres propres à diſtinguer chaque claſſe, il eſt à propos de faire les obſervations, qui m'ont conduit à leur donner à chacune le rang qu'elle occupe. Je commence par les Animaux qui ont le plus d'analogie avec l'homme, & finis par ceux qui en ont le moins. Parmi les Animaux qui habitent notre globe, les uns ont du *Sang* analogue à celui de l'homme; c'eſt-à-dire qu'il circule dans leurs arteres & leurs veines une liqueur rouge à laquelle on a donné le nom de *Sang*: & les autres n'ont point cette liqueur rouge. Parmi ceux qui ont du *Sang*, les uns reſpirent, comme l'homme, par des *Poumons*: & les autres reſpirent par des *Ouïes*. De ceux qui reſpirent par des *Poumons*, les uns ont,

comme l'homme, *deux Ventricules* au cœur: & les autres n'en ont qu'*un*. Parmi ceux qui ont *deux Ventricules* au cœur, les uns, comme l'homme, ſont *Vivipares*, & *alaittent* leurs petits: & les autres ſont *Ovipares*. Parmi ceux qui ſont *Vivipares*, & qui *alaittent* leurs petits, les uns ont, comme l'homme, du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & *quatre Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme: & les autres ont le corps *nud*, & au lieu de pieds, ils ont des *Nageoires charnues*.

La premiere claſſe eſt compoſée des Animaux qui ont avec l'homme ces *cinq* analogies; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *Sang*; qu'ils reſpirent par des *Poumons*; qu'ils ont *deux Ventricules* au cœur; qu'ils ſont *Vivipares* & *alaittent* leurs petits; & qu'ils ont du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & *quatre Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme.

Dans la ſeconde ſont ceux qui n'ont avec l'homme que les *quatre* premieres analogies; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *ſang*; qu'ils reſpirent par des *poumons*; qu'ils ont *deux ventricules* au cœur; & qu'ils ſont *vivipares*, &

bus ſpirant, alia, ut homo, *duobus* gaudent in corde *Ventriculis*: alia verò *unico* tantum donantur. Inter iſta quæ *duos* habent in corde *Ventriculos*, alia, ut homo, ſunt *Vivipara*; id eſt, *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt: alia ſunt *Ovipara*. Inter *Vivipara*, alia, ut homo, corpus habent *Piloſum*, ſaltem in aliqua ſui parte, & *quatuor* donantur *Pedibus*, manibus & pedibus hominis reſpondentibus: alia verò corpus habent *nudum*, & *pilis* deſtitutum, *pinniſque carnoſis*, pedum loco, prædita ſunt.

In prima claſſe continentur ea quæ in *quinque* illis capitibus cum homine conveniunt; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea*; *pulmonibus* ſpirant; *duobus* gaudent in corde *Ventriculis*; *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt; & corpus habent *piloſum*, ſaltem in aliqua ſui parte, & *quatuor* donantur *pedibus*, manibus & pedibus hominis reſpondentibus.

In ſecunda continentur ea, quæ in *quatuor* tantùm primis capitibus cum homine conveniunt; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea*; *pulmonibus* ſpirant; *duos* habent in corde *ventriculos*; & *vivos* fœtus pariunt, eoſque

lacte alunt : quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod corpus habeant *nudum*, & *pilis* deſtitutum, *pinniſque carnoſis*, pedum loco, prædita ſint.

In tertia continentur ea, quæ in *tribus* tantùm primis capitibus cum homine conveniunt ; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea*; *pulmonibus* ſpirant ; & *duos* habent in corde *ventriculos* : quæ verò ab homine differunt in eo quod ſint *ovipara*.

In quarta continentur ea, quæ in duobus tantùm primis capitibus cum homine conveniunt ; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea* ; & *pulmonibus* ſpirant : quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod *unicum* habeant in corde *ventriculum*.

In quinta & ſexta continentur ea, quæ in *primo* tantum capite cum homine conveniunt ; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea* : quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod *branchiis* ſpirent.

In tribus ultimis claſſibus continentur ea, quæ in nullis ex iſtis *quinque* capitibus cum homine conveniunt.

Dividitur ergò *regnum Animale* in claſſes novem.

In prima claſſe continentur Animalia, quæ corpus

alaittent leurs petits : mais qui en différent en ce qu'ils ont le corps *nud* & ſans *poil*, & en ce qu'aulieu de pieds, ils ont des *nageoires charnues*.

Dans la troiſiéme ſont ceux, qui n'ont avec l'homme que les *trois* premieres analogies ; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *ſang*; qu'ils reſpirent par des *poumons* ; & qu'ils ont *deux ventricules* au cœur : mais qui eſt différent en ce qu'ils ſont *ovipares*.

Dans la quatriéme ſont ceux, qui n'ont avec l'homme que les *deux* premieres analogies ; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *ſang*; & qu'ils reſpirent par des *poumons* : mais qui en différent en ce qu'ils n'ont qu'*un ventricule* au cœur.

Dans la cinquiéme & la ſixiéme, ſont ceux qui n'ont avec l'homme que la *premiere* analogie ; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *ſang* : mais qui en différent en ce qu'ils reſpirent par des *ouies*.

Les trois dernieres claſſes ſont compoſées des Animaux qui n'ont avec l'homme aucune de ces *cinq* analogies.

Je diviſe donc le *regne Animal* en neuf claſſes.

La premiere comprend les Animaux qui ont du *poil*, au

moins à quelque partie du corps: & *quatre pieds*. Tous ceux-là, comme je l'ai dit ci-deſſus, ont du *ſang*: reſpirent par des *poumons*: ont *deux ventricules* au cœur: & leurs femelles ſont *vivipares*, & *alaittent* leurs petits. On leur a donné le nom de QUADRUPEDES.

Dans la ſeconde claſſe ſont les Animaux qui ont le corps *nud* & *allongé*: des *nageoires charnues*: & la queue *platte horizontalement*. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du *ſang*: reſpirent par des *poumons*: ont *deux ventricules* au cœur: & leurs femelles ſont *vivipares*, & *alaittent* leurs petits. On les appelle CETACÉS. Ils vivent toûjours dans la mer.

Dans la troiſiéme ſont ceux, qui ont le corps couvert de *plumes*: un *bec* d'une matiere analogue à la *corne*: *deux aîles*: & *deux pieds*. Tous ceux-là ont du *ſang*: reſpirent par des *poumons*: ont *deux ventricules* au cœur: & leurs femelles ſont *ovipares*. On leur a donné le nom D'OISEAUX.

Dans la quatriéme ſont ceux, qui ont, ou le corps *nud*, & *quatre pieds*: ou le corps couvert d'*écailles*, & *quatre pieds*, ou *point de pieds*: & qui reſpirent par des *poumons*. Tous ceux-là ont du *ſang*: & n'ont qu'*un ventricule* au cœur. Quelques-unes

habent *piloſum*, ſaltem in aliqua ſui parte: & *pedes quatuor*. Omnia iſta, ut ſupra notavi, ſunt *ſanguinea*: *pulmonibus* ſpirant: *duobus* gaudent in corde *ventriculis*: eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt. QUADRUPEDA vocantur.

In ſecunda claſſe continentur ea, quæ corpus habent *nudum* & *elongatum*: *pinnas carnoſas*: & caudam *horizontaliter planam*. Omnia iſta, ſicut & præcedentia, ſunt *ſanguinea*: *pulmonibus* ſpirant: *duobus* gaudent in corde *ventriculis*: eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt. CETACEA nominantur. Perpetuò in mari degunt.

In tertia continentur ea, quæ corpus habent *plumis* tectum: *roſtrum corneum*: *alas duas*: & *pedes duos*. Omnia iſta ſunt ſanguinea: *pulmonibus* ſpirant: *duos* habent in corde *ventriculos*: eorumque fœminæ ſunt *oviparæ*: AVIUM nomine donantur.

In quarta continentur ea, quæ, vel habent corpus *nudum*, & *pedes quatuor*: vel corpus *ſquamoſum*, & *pedes* vel *quatuor*, vel *nullos*: quæque *pulmonibus* ſpirant. Omnia iſta ſunt *ſanguinea*: & *unico* in corde *ventriculo* donan-

tur. Horum fœminæ quædam ſunt *vivipara*: aliæ ſunt *ovipara*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intra corpus in quibuſdam fœminis; quæ idcircò *vivos* fœtus pariunt: in aliis veró fœminis incubatio fit extra corpus. Omnia hujus claſſis Animalia *repunt*; quamobrem ea REPTILIA vocavi.

de leurs femelles ſont *vivipares*: les autres ſont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*; mais dans quelques-unes l'incubation ſe fait dans le corps de l'Animal, qui fait enſuite ſes petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation ſe fait hors du corps. Tous les Animaux de cette claſſe *rampent*; c'eſt pourquoi je leur ai donné le nom de REPTILES.

In quinta continentur ea quæ *pinnas* habent *cartilagineas*: quæque per *foramina* ad *branchias* aperta ſpirant. Omnia hujus claſſis Animalia ſunt *ſanguinea*: & perpetuò in aqua vitam agunt. Ipſorum fœminæ quædam ſunt *vivipara*; aliæ verò *ovipara*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intrà corpus in quibuſdam fœminis, quæ deinde *vivos* fœtus pariunt: in aliis verò fœminis incubatio fit extra corpus. PISCES CARTILAGINEI vocantur.

Dans la cinquiéme ſont ceux qui ont des *nageoires cartilagineuſes*: & qui reſpirent par des *ouies*, vis-à-vis deſquelles ſont ouverts des *trous*. Tous les Animaux de cette claſſe ont du *ſang*: & vivent toujours dans l'eau. Quelques-unes de leurs femelles ſont *vivipares*: les autres ſont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*, dont l'incubation ſe fait dans quelques-unes dans le corps de l'Animal, qui fait enſuite ſes petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation ſe fait hors du corps. On les appelle POISSONS CARTILAGINEUX.

In ſexta continentur ea, quæ *pinnas* habent *oſſiculis conſtantes*: quæque *branchiis tegmine mobili, partibus oſſeis conſtante*, coopertis ſpirant. Omnia iſta, ſicut & præcedentia, ſunt *ſanguinea*; perpetuoque in aqua degunt. Fœminæ eorum fere omnes ſunt *ovipara*. *Ova* concipiunt valde exigua, quæ gallice

Dans la ſixiéme ſont ceux qui ont des *nageoires compoſées d'oſſelets*: & qui reſpirent par des *ouies* ſur leſquelles ſont des *couvercles mobiles, compoſez de parties oſſeuſes*. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du *ſang*: & vivent toujours dans l'eau. Preſque toutes leurs femelles ſont *ovipares*. Elles ont des *œufs* extrêmement petits, auxquels

on a donné le nom de *frais*. J'appelle les Animaux de cette claſſe POISSONS PROPREMENT DITS.

Dans la ſeptiéme ſont ceux qui ont des *antennes* à la tête & au moins *huit pieds*. Leur corps eſt couvert d'une enveloppe qui ſe *renouvelle*, c'eſt-à-dire, que, lorſque, par l'accroiſſement du corps de l'Animal, elle eſt devenue trop petite pour le contenir, elle ſe détache naturellement du corps, ſur lequel il s'en eſt produit une nouvelle. C'eſt ce qu'on appelle *changer de peau*. On appelle les Animaux de cette claſſe CRUSTACÉS.

La huitiéme claſſe comprend tous les Animaux, qui ſubiſſent pluſieurs *méthamorphoſes* avant d'être parvenus à leur accroiſſement parfait; c'eſt-à-dire, qui naiſſent ſous une forme différente de celle qu'ils doivent avoir dans la ſuite. Ce n'eſt qu'après avoir ſubi la derniere *méthamorphoſe* qu'ils ſont en état de multiplier leur eſpéce. Tous ces animaux ont, avant leur derniere *méthamorphoſe*, *pluſieurs ſtigmates*, ou organes de la reſpiration; & après leur derniere *méthamorphoſe*, ils ont des *antennes* à la tête; toujours *ſix pieds*, & jamais d'avantage. Ils changent de peau, comme les CRUTACÉS. Ces changemens ne ſe font dans le plus grand nom-

frais vocantur. Hujus claſſis Animalia PISCES PROPRIE DICTOS nominavi.

In ſeptima continentur ea, quæ caput habent *antennis* inſtructum: & *pedes octo*, & ultra. Corpus ipſorum tegitur tegmine *mutabili*; id eſt, tegmine, quod, cùm, incremento corporis, ad illud continendum fit ſtrictius, naturaliter à corpore avellitur, ſupra quod corpus novum producitur tegmen: quod gallice dicitur, *changer de peau*. Hujus claſſis Animalia CRUSTACEA vocantur.

In octava continentur omnia Animalia, quæ, antequam perveniant, ad ultimum incrementum, diverſas *formas* induunt; id eſt, quæ ſub unâ naſcuntur formâ, diverſâ ab illis quas poſtea induere debent. Speciem ſuam multiplicare nequeunt, niſi poſt ultimam *méthamorphoſim*, poſt ultimam *formam* indutam. Omnia iſta Animalia ante ultimam *méthamorphoſim*, *plura* habent *ſtigmata*, aut reſpirationis organa: & poſt ultimam *méthamorphoſim*, caput habent *antennis* inſtructum: & *pedes ſex*, nec ultra. Tegmen habent *mutabile*, ſicut & CRUSTACEA: attamen fere omnia tegmine

non mutant, niſi ante ultimam *formam* indutam : pauca verô ſunt quæ poſt ultimam *méthamorphoſim* tegmine mutent. Sola iſta Animalia INSECTORUM nomine donavi.

bre, qu'avant d'avoir ſubi la derniere *méthamorphoſe* : il y en a très peu auxquels ils arrivent après avoir pris la derniere *forme*. Ces Animaux ſont les ſeuls auxquels je donne le nom D'INSECTE.

In nona & ultima claſſe continentur Animalia, quæ corpus habent *retractibile*, aut ſaltem corporis aliquam partem *retractibilem* ; id eſt, quorum corpus, aut ſaltem corporis aliqua pars ſponte contrahi, aut extendi poteſt : quæque nec *antennas* habent, nec *pedes*, nec *ſtigmata*. Hujus claſſis Animalia VERMES dicuntur.

Dans la neuviéme & derniere claſſe ſont tous les Animaux qui ont le corps, ou du moins quelque partie du corps, *capable d'un mouvement de contraction & d'extenſion ;* de ſorte que ce corps, ou cette partie du corps peut occuper plus ou moins d'eſpace à volonté : & qui n'ont ni *antennes*, ni *pieds*, ni *ſtigmates*. On a donné à ces Animaux le nom de VERS.

CLASSIUM characteres.

CARACTERES des différentes Claſſes.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

Horum character eſt
Corpus piloſum, ſaltem in aliqua ſui parte :
Et pedes quatuor.

CLASSE I.

LES QUADRUPEDES.

Leur caractere eſt
D'avoir du poil au moins à quelque partie du corps :
Et quatre pieds.

CLASSIS II.

CETACEA.

Horum character eſt
Corpus nudum & elongatum:
Pinnæ carnoſæ :
Cauda Horizontaliter plana.

CLASSE II.

LES CETACÉS.

Leur caractere eſt
D'avoir le corps nud & allongé :
Des nageoires charnues :
Et la queue platte horizontalement.

CLASSE III.

LES OISEAUX.

Leur caractere eſt
D'avoir le corps couvert de plumes :
Un bec d'une matiere analogue à la corne :
Deux aîles :
Et deux pieds.

CLASSIS III.

AVES.

Harum character eſt
Corpus plumis tectum :
Roſtrum corneum :
Alæ duæ :
Pedes duo.

CLASSE IV.

LES REPTILES.

Leur caractere eſt d'avoir
Ou le corps nud :
Et quatre pieds ;
Ou le corps couvert d'écailles :
Et quatre pieds, ou point de pieds ;
Et de reſpirer par des poumons.

CLASSIS IV.

REPTILIA.

Horum character eſt
Vel corpus nudum :
Et pedes quatuor ;
Vel corpus ſquamoſum :
Et pedes vel quatuor, vel nulli ;
Et pulmonibus ſpirare.

CLASSE V.

LES POISSONS Cartilagineux.

Leur caractere eſt
D'avoir des nageoires cartilagineuſes :
Et de reſpirer par des ouies, vis-à-vis deſquelles ſont ouverts des trous.

CLASSIS V.

PISCES Cartilaginei.

Horum character eſt
Pinnæ cartilagineæ :
Et per foramina ad branchias aperta ſpirare.

CLASSE VI.

LES POISSONS proprement dits.

Leur caractere eſt
D'avoir des nageoires compoſées d'oſſelets ;

CLASSIS VI.

PISCES proprie dicti.

Horum character eſt
Pinnæ oſſiculis conſtantes :

Et

Et branchiis, tegmine mobili, partibus oſſeis conſtante, coopertis ſpirare.

Et de reſpirer par des ouies ſur leſquelles ſont des couvercles mobiles, compoſés de parties oſſeuſes.

CLASSIS VII.

CRUSTACEA.

Horum character eſt
Caput antennis inſtructum:
Et pedes octo & ultra.

CLASSE VII.

LES CRUSTACÉES.

Leur caractere eſt
D'avoir des antennes à la tête:
Et au moins huit pieds.

CLASSIS VIII.

INSECTA.

Horum character eſt
Ante ultimam methamorphoſim, plura ſtigmata, aut reſpirationis organa;

Et poſt ultimam methamorphoſim,
Caput antennis inſtructum:
Et pedes ſex.

CLASSE VIII.

LES INSECTES.

Leur caractere eſt
D'avoir, avant leur derniere méthamorphoſe, pluſieurs ſtigmates, ou organes de la reſpiration;

Et après leur derniere méthamorphoſe,
Des antennes à la tête:
Et ſix pieds.

CLASSIS IX.

VERMES.

Horum character eſt
Corpus retractibile, aut ſaltem corporis aliqua pars retractibilis:

Nec antennæ:
Nec pedes:
Nec ſtigmata.

CLASSE IX.

LES VERS.

Leur caractere eſt
D'avoir le corps, ou du moins quelque partie du corps capable d'un mouvement de contraction & d'extenſion:

Et de n'avoir ni antennes:
Ni pieds:
Ni ſtigmates.

CLASSE I.

LES QUADRUPEDES.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

CATALOGUS AUTHORUM.

ALDRO. Avi. . . . Uliſſis Aldrovandi Philoſophi ac Medici Bononienſis Hiſtoriam Naturalem in gymnaſio Bononienſi profitentis, Ornithologia; hoc eſt, de Avibus hiſt. libri XII. Bononiæ 1599. in-folio.

Aldro. Piſc. . . . . Uliſſis Aldrovandi Philoſophi ac Medici Bononienſis de Piſcibus libri V, & de Cetis liber 1. &c. Bononiæ 1638, in-folio.

Aldro. Quadr. biſ. . . . . Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis, Quadrupedum omnium Biſulcorum Hiſtoria, &c. Bononiæ 1642, in-folio.

Aldro. Quadr. dig. ovi. . . . . Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus digitatis oviparis, libri II, &c. Bononiæ 1645, in-folio.

Aldro. Quadr. dig. viv. . . . . Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus digitatis viviparis, libri tres &c. Bononiæ 1645, in-folio.

Aldro. Quadr. ſolid. . . . . Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus ſolidipedibus volumen integrum, &c. Bononiæ 1639, in-folio.

Art. Gen. Piſc. . . . . Petri Artedi Sueci genera Piſcium, in quibus ſyſthema totum Ichtyologiæ proponitur, cum claſſibus, ordinibus, generum characteribus, ſpecierum differentiis, obſervationibus plurimis, &c Ichtyologiæ pars III. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.

Art. ſynon. Piſc. . . . . Petri Artedi Angermannia-ſueci ſynonimia nominum Piſcium fere omnium; in qua recentio fit nominum Piſcium, omnium facile authorum, qui unquam de Piſcibus ſcripſere: uti Græcorum, &c. Ichtyologiæ pars IV. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.

Barr. Hiſt. Fr. eq. . . . . Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle de la France équinoxiale, ou dénombrement des plantes, des Animaux, &c. Par Pierre Barrere, correſpondant de l'Académie des Sciences de Paris, &c. A Paris 1741, in-12.

Bell. de Aquat. . . . . Petri Bellonii Cenomani de Aquatilibus libri duo, &c. Pariſiis 1553, in-octavo. Oblong.

Bell. obſ. . . . . Petri Bellonii Cenomani plurimarum ſingularium & memorabilium rerum in Græcia, &c. Obſervationes tribus libris expreſſæ, &c. Raphelengii 1605, in-folio.

Bont. Ind. ori. . . . . Jacobi Bontii, Medici civitatis Bataviæ novæ in Java ordinarii Hiſtoriæ Naturalis & medicæ Indiæ orientalis libri ſex, &c. A Gulielmo Piſone, in ordinem redacti, &c. Amſtelodami 1658, in-folio.

Cat. . . . . Hiſtoire Naturelle de la Caroline, la Floride, & les Iſles Bahama, contenant les deſſeins des Oiſeaux, Animaux, &c. Par Marc Cateſby, de la Société Royale. Londres 1743, in-folio.

Charlet. exer. . . . . Gualteri Charletoni exercitationes, de differentiis & nominibus Animalium, &c. Oxoniæ 1677, in folio.

Cluſ. exot. . . . . Caroli Cluſii Atrebatis, Aulæ Cæſareæ quondam familiaris, exoticorum libri decem, &c. Raphelengii 1605, in folio.

Colum. aquat. . . . . Aquatilium & terreſtrium aliquot Animalium aliarumque naturalium rerum obſervationes, Fabio Columna authore, Romæ 1616, in-quarto.

Des March. . . . . Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, Iſles voiſines & à Cayenne, fait en 1725, 1726 & 1727, &c. A Paris 1730, in-12. 4 vol.

Edwards. . . . . Hiſtoire Naturelle de divers Oiſeaux qui n'avoient point encore été figurés ni décrits, &c. Par George Edwards; traduit de l'Anglois, par M. D. de la S. R. A Londres 1745, in-quarto.

Euſ. Nieremb. . . . . Joannis Euſebii Nierembergii Madritenſis, ex Societate Jeſu, in Academia Regia Madritenſi, Phyſiologiæ Profeſſoris, Hiſtoria Naturæ maxime peregrinæ libris XVI. diſtincta. Antuerpiæ 1635, in-folio.

Faun. Suec. Linn. .... Caroli Linnæi Medic. & Botan. Prof. Upſal. horti Academici Præfect. Acad. Imperial. Monſpelienſ. Stockolm. Upſal. Soc. hujuſque Secretar. Fauna Suecica, ſiſtens Animalia ſueciæ regni, &c. Stockolmiæ 1746, in-octavo.

Fern. Hiſt. N. Hiſp .... Hiſtoriæ Animalium & Mineralium Novæ Hiſpaniæ liber unicus, in ſex tractatus diviſus, Franciſco Fernandez, Philippi ſecundi primario Medico Authore.

Flor. Sin. .... Flora Sinenſis à P. Michaële Boym, Soc. Jeſu, 1656.

Gaz. Pet. .... Gazophilacii naturæ, & artis decades à Jacobo Petiver Pharmacop. Londin, & Regiæ Societatis ſocio. in-folio.

Gaz. Rup. Beſl. .... Gazophilacium rerum naturalium è regno vegetabili, Animali & minerali depromptarum, &c. Opera Michaëlis Ruperti Beſleri. Lipſiæ & Francofurti 1716, in-folio.

Geſn. Avi. .... Conradi Geſneri Tigurini, Medicinæ & Philoſophiæ Profeſſoris in ſchola Tigurina, Hiſtoriæ Animalium liber III, qui eſt de Avium natura. Francofurti. 1585, in-folio.

Geſn. Icon. Aquat. .... Icones Animalium Aquatilium in mari & dulcibus aquis degentium, &c. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Icon. Avi. .... Icones Avium omnium, quæ in Hiſtoria Conradi Geſneri deſcribuntur, &c. Editio ſecunda. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Icon. Quadr. .... Icones Animalium Quadrupedum viviparorum & oviparorum, &c. Editio ſecunda. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Piſc. .... Conradi Geſneri Medici Tigurini, Hiſtoriæ Animalium liber IV, qui eſt de Piſcium & Aquatilium animantium natura. Tiguri 1558, in-folio.

Geſn. Quadr. .... Conradi Geſneri Medici Tigurini, Hiſtoriæ Animalium lib. I. de Quadrupedibus viviparis. Tiguri 1551, in-folio.

Hernand. Hiſt. Mex. .... Nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum hiſtoria, à Franciſco Hernandez, Medico, in Indiis præſtantiſſimo, primùm compilata, dein à Nardo Antonio Reccho in volumen digeſta; &c. Romæ 1651, in-folio.

Hiſt. de l'Acad. .... Hiſtoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris, in-quarto.

Hiſt. d'Iſl. & de Gro. .... Hiſtoire Naturelle de l'Iſlande, du Groenland, du détroit de Davis & d'autres pays ſitués ſur le Nord; traduite de l'Allemand, par M. Anderſon, &c. A Paris 1750, in-12. 2 vol.

Hiſt. Nat. Gen. & Part. .... Hiſtoire Naturelle Générale & Particuliere, avec la deſcription du Cabinet du Roi. A Paris, in-quarto & in-12.

Jo. de Laet. .... Novus orbis, ſeu deſcriptionis Indiæ Occidentalis libri 18. Authore Joanne de Laet Antuerp. &c. Lugduni Batavorum 1633, in-folio.

Jonſt. Avi. .... Hiſtoriæ Naturalis de Avibus libri VI. cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Jonſt. Piſc. .... Hiſtoriæ Naturalis de Piſcibus & Cetis libri V. cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Jonſt. Quadr. .... Hiſtoriæ Naturalis de Quadrupedibus libri cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono, Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Klein. Quadr. .... Jacobi Theodori Klein, Secr. Civ. Ged. Soc. Reg. Lond. & Acad. Scient. Bonon. Membri, Quadrupedum diſpoſitio, breviſque Hiſtoria Naturalis. Lipſiæ 1751, in quarto.

Kæmpf. Amœn. .... Amœnitatum exoticarum Politico-Phiſico-Medicarum faſciculi V, &c. Auctore Engelberto Kæmpfero. Lemgoviæ 1712, in-quarto.

Kolbe. .... Deſcription du Cap de Bonne-Eſperance, où l'on trouve tout ce qui concerne l'Hiſtoire Naturelle du pays, &c. Tirée des Mémoires de M. Pierre Kolbe, Maître ès Arts. A Amſterdam 1741, in-12.

Linn. Syſt. Nat. ed. 6. .... Caroli Linnæi Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profeſſ. Upſal. Syſthema Naturæ, ſiſtens regna tria naturæ in claſſes & ordines genera & ſpecies redacta, Tabuliſque æneis illuſtrata. Editio ſexta. Stockolmiæ 1748. in-octavo.

Marcgr. Hiſt. Br. .... Georgi Marcgravii de Liebſtad, Miſnici Germani, Hiſtoriæ rerum naturalium libri octo. in-folio.

Muſ. Beſl. .... Rariora Muſei Beſleriani, quæ olim Baſilius & Michael Rupertus Beſlerus collegerunt, &c. Illuſtrata à Joanne Henrico Lochuero, &c. 1716, in-folio.

Muſ. Worm. .... Muſeum Wormianum, ſeu Hiſtoria rerum rariorum tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm, Med. Doct. &c. Amſtelodami 1655, in-folio.

Piſon. Hiſt. Nat. .... Gulielmi Piſonis Medici Amſtelodamenſis, Hiſtoriæ Naturalis & Medicæ Indiæ Occidentalis, &c. Libri quinque. Amſtelodami. 1658, in-folio.

Proſp. Alp. Ægypt. .... Proſperi Alpini Maroſticenſis Philoſophi, Medici, &c. Hiſtoria Ægypti naturalis, &c. Lugduni Batavorum. 1735, in-quarto.

Raj. Syn. Quadr. .... Synopſis Methodica Animalium Quadrupedum, & Serpentini Generis, &c. Authore Joanne Rajo. Londini. 1693, in-octavo.

Rzac. Auct. .... Auctuarium hiſtoriæ naturalis curioſæ Regni Poloniæ, Magni Ducatûs Lithuaniæ, annexarumque Provinciarum, per P. Gabrielem Rzaczynſki, Soc. Jeſu Concinnatum, &c. Gedani. 1745, in-quarto.

Rzac. Hiſt. Nat. Pol. .... Hiſtoria naturalis curioſa Regni Poloniæ, Magni ducatûs Lituaniæ, annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX. diviſa, &c. à P. Gabriele Rzaczynski, Soc. Jeſu. Sandomiviæ. 1721, in-quarto.

Seb. .... Locupletiſſimi rerum naturalium Theſauri accurata deſcriptio, & iconibus artificioſiſſimis expreſſio, &c. Ex toto terrarum orbe collegit, digeſſit, deſcripſit, & depingendum curavit Albertus Seba, &c. Amſtelaedami. 1734, in-folio. 2 vol.

Sloane. .... A voyage To The Iſlands, Madera, Barbadoes, Nieves, S. Chriſtophers, And Jamaïca; With The Natural Hiſtory, &c. by ſir Hims Sloane, Bart. London. 1725, in folio.

Tranſ. Phil. .... Tranſactions philoſophiques de la Société Royale de Londres, traduites par M. de Bremond. A Paris. in-quarto.

Voy. de la B. de Hud. .... Voyage de la Baye de Hudſon, fait en 1746 & 1747, pour la découverte du paſſage de Nord-Oueſt, &c. Traduit de l'Anglois de M. Henry Ellis, &c. A Paris 1749. in-12. 2 vol.

Voy du Lev. .... Relation d'un voyage du Levant, &c. Par M. Pitton de Tournefort &c. A Paris. 1717, in-quarto. 2 vol.

CLASSE I.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

HORUM character eſt Corpus piloſum, ſaltem in aliqua ſui parte: Et pedes quatuor.

Omnia QUADRUPEDA ſunt *ſanguinea* : *pulmonibus* ſpirant: *duos* habent in corde *ventriculos* : eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt.

Quædam ſunt edentula, ut *Myrmecophaga*, &c: Alia omnia ſunt dentata. Inter dentata, alia dentes habent tantummodò *molares* (1), ut *Tardigradus*, &c. Alia dentes *molares* & *caninos*

(1) *Dentes molares* vocantur iſti, qui poſteriorem Maxillæ partem occupant.

CLASSE I.

LES QUADRUPEDES.

LEUR caractere eſt D'avoir du poil, au moins à quelque partie du corps: Et quatre pieds.

Tous les QUADRUPEDES ont du *ſang* : reſpirent par des *poumons* : ont *deux ventricules* au cœur: & leurs femelles ſont *vivipares* & *alaittent* leurs petits.

Quelques-uns n'ont point du tout de dents, comme le *Fourmiller*, &c. Le plus grand nombre en eſt muni. De ces derniers les uns n'ont que des dents *molaires* (1), comme le *Pareſſeux*, &c: d'autres n'en ont que des

(1) On appelle *dents molaires*, celles qui ſont placées à la partie poſtérieure de la mâchoire.

molaires & des *canines* (1), comme l'*Elephant* &c: d'autres enfin en ont des *inciſives* (2). Parmi ceux-ci, les uns n'ont des dents *inciſives* qu'à la mâchoire inférieure ſeulement: & les autres en ont aux deux mâchoires. De ceux qui n'ont des dents *inciſives* qu'à la machoire inferieure, les uns n'en ont que ſix, comme le *Chameau*: les autres en ont huit, comme le *Bœuf*, le *Cerf*, &c. Parmi ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires, les uns ont la corne du pied d'*une ſeule piece*, comme le *Cheval*: d'autres ont le *pied fourchu* (3), comme le *Cochon*: d'autres ont trois doigts *ongulés* (4) à chaque pied, comme le *Rhinoceros*: d'autres ont quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere: & de ces derniers, les uns n'ont que

(1), ut *Elephas*, &c. alia denique dentes habent *inciſores* (2). Horum ultimorum alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore tantùm: alia in maxilla utraque. Inter prima iſta, alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore ſex, ut *Camelus*: alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore octo, ut *Bos*, *Cervus*, &c. Horum quæ dentes habent *inciſores* in maxilla utraque, alia pedibus *ſolidungulis* (3) donantur, ut *Equus*: alia pedibus *biſulcis* (4), ut *Sus*: alia pedibus *terungulatis* (5) anticè & poſticè, ut *Rhinoceros*: alia pedibus *quaterungulatis* anticè, *terungulatis* poſticè: inter quæ alia dentes habent *inciſores* in utraque maxilla duo tantùm, ut *Hydrochœrus*:

(1) On appelle *dents canines*, celles qui ſont placées entre les *molaires* & les *inciſives*. Elles ſont ordinairement pointues.

(2) On appelle *dents inciſives* celles qui ſont placées à la partie antérieure de la mâchoire.

(3) On appelle *pieds fourchus* ceux qui ont quatre doigts *onguleʒ*, & qui ne s'appuyent que ſur deux, en marchant.

(4) On appelle *doigts onguleʒ* ceux dont l'extrêmité eſt toute entourée de l'ongle, & qui, en marchant, s'appuyent ſur l'ongle même.

(1) *Dentes canini* dicuntur, qui *molares* inter & *inciſores* ſiti ſunt. Hi communiter ſunt acuti.

(2) *Dentes inciſores* nuncupantur, qui anteriorem maxillæ partem obtinent.

(3) *Pedes ſolidunguli* ſunt iſti, quorum extremitas *ungulâ* ſolidâ undique circumdatur.

(4) *Pedes biſulci* dicuntur, qui quatuor habent digitos *ungulatos*, quique duobus tantum digitis incedunt.

(5) *Pedes ungulati* vocantur illi, quorum extremitas digitorum *ungula* undique circumdatur, quique ungulis ipſis incedunt.

alia verò decem habent dentes *inciſores* in utraque maxilla, ut *Tapirus* : alia pedibus donantur *quaterungulatis* anticè & poſticè, ut *Hippopotamus* : alia tandem digitis *unguiculatis* (1) prædita ſunt. Inter illa quæ digitos habent *unguiculatos*, alia dentes habent *inciſores* in utraque Maxilla duo tantùm, ut *Hyſtrix*, *Lepus*, *Mus*, &c : alia dentes *inciſores* in utraque Maxilla quatuor, ut *Simia* &c : alia dentes *inciſores* in maxilla ſuperiore quatuor, in inferiore ſex, ut *Proſimia* &c : alia dentes *inciſores* in Maxilla ſuperiore ſex, in inferiore quatuor, ut *Phoca* : alia dentes *inciſores* in utraque maxilla ſex, ut *Canis*, *Felis*, *Lutra*, &c : alia dentes *inciſores* in maxilla ſuperiore ſex, in inferiore octo, ut *Talpa* : alia denique dentes *inciſores* in maxilla ſuperiore decem: in inferiore octo, ut *Philander*.

In decem & octo ordines dividuntur.

deux dents *inciſives* à chaque mâchoire, comme le *Cabiai* : & les autres en ont dix à chaque mâchoire, comme le *Tapir* ou *Manipouris* : d'autres ont quatre doigts *ongulés* à chaque pied, comme l'*Hippopotame* : d'autres enfin ont les doigts *onguiculés* (1). Parmi ceux qui ont les doigts *onguiculés*, les uns n'ont que deux dents *inciſives* à chaque machoire, comme le *Porc-Epic*, *le Lievre*, *le Rat*, &c : d'autres ont quatre dents *inciſives* à chaque machoire, comme le *Singe*, &c : d'autres en ont quatre à la mâchoire ſupérieure, & ſix à l'inferieure, comme le *Maki*, &c : d'autres en ont ſix à la mâchoire ſupérieure, & quatre à l'inferieure, comme le *Phocas* : d'autres en ont ſix à chaque mâchoire, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Loutre*, &c : d'autres en ont ſix à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inferieure, comme la *Taupe* : d'autres enfin en ont dix à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inferieure, comme le *Philandre*.

Je les diviſe en dix-huit Ordres.

(1) *Digiti unguiculati* iſti ſunt, quorum extremitas ungue cooperta eſt in parte ſuperiore, & nuda, aut pilis tantummodò tecta, in parte inferiore.

(1) On appelle *doigts onguiculez* ceux dont l'extrêmité eſt couverte de l'ongle dans la partie ſupérieure, & nue, ou ſeulement couverte de poils dans la partie inferieure.

Dans le premier ſont compris ceux qui n'ont point de dents.

Dans le ſecond, ceux qui n'ont que des dents *molaires.*

Dans le troiſiéme, ceux qui n'ont que des dents *canines*, & des dents *molaires.*

Dans le quatriéme, ceux qui n'ont point de dents *inciſives* à la machoire ſupérieure, & qui en ont ſix à l'inferieure. Tous ceux-là ſont *ruminants*, & ont à chaque pied deux doigts *onguiculés.*

Dans le cinquiéme, ceux qui n'ont point de dents *inciſives* à la mâchoire ſupérieure, & qui en ont huit à l'inferieure. Tous ceux-là ſont *ruminants* & ont le *pied fourchu.*

Dans le ſixiéme, ceux qui ont des detns *inciſives* aux deux mâchoires; & la corne du pied d'*une ſeule piece.*

Dans le ſeptiéme, ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires; & le *pied fourchu.*

Dans le huitiéme, ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires; & trois doigts *ongulés* à chaque pied.

Dans le neuviéme, ceux qui ont deux dents *inciſives* à chaque mâchoire; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Dans le dixiéme, ceux qui

In primo Ordine continentur ea quæ ſunt edentula.

In ſecundo, ea quæ dentes tantùm *molares* habent.

In tertio, ea quæ dentes habent tantummodò *molares* & *caninos.*

In quarto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore nullos, in inferiore ſex: quæ omnia ſunt *ruminantia*, & duobus digitis *unguiculatis* in ſingulis pedibus donantur.

In quinto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore nullos, in inferiore octo. Omnia iſta ſunt *ruminantia*, & pedibus *biſulcis* donantur.

In ſexto, ea quæ dentes *inciſores* in utraque maxilla; & pedes *ſolidungulos* habent.

In ſeptimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla; & pedibus *biſulcis* donantur.

In octavo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla; & digitos tres *ungulatos* in ſingulis pedibus.

In nono, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla duo; & digitos *ungulatos* quatuor in pedibus anticis, & tres in poſticis.

In decimo, ea quæ dentes ha-

TABULA Synoptica QUADRUPEDUM *ſecundùm Ordines, Sectiones & Genera.*

QUADRUPEDA ſunt
- Edentula. . . ORDO I.
  - Corpore piloſo. . . *Myrmecophaga.* 1. . . *Sectio* I.
  - Corpore ſquamoſo. . . *Pholidotus.* 2. . . *Sectio* II.
- Dentata;
  - Dentibus molaribus tantùm. . . ORDO II.
    - Corpore piloſo. . . *Tardigradus.* 3. . . *Sectio* I.
    - Corpore cataphracto. . . *Cataphractus.* 4. . . *Sectio* II.
  - Dentibus molaribus & caninis. . . ORDO III.
    - Duobus dentibus caninis maxillæ ſuperiori affixis, longiſſimis, ſurſùm recurvis; proboſcide longiſſimâ flexibili. . . *Elephas.* 5.
    - Duobus dentibus caninis maxillæ ſuperiori affixis, longiſſimis, deorſùm incurvis; proboſcide nullâ. . . *Odobenus.* 6.
  - Dentibus inciſoribus,
    - In inferiore maxilla tantùm;
      - Sex. . . *Camelus.* 7. . . ORDO IV.
      - Octo. . . ORDO V.
        - Cornibus ſimplicibus. . . *Sectio* I.
          - Surſùm verſis:
            - Femoribus anticis longioribus. . . *Giraffa.* 8.
            - Femoribus æqualibus. . . *Hircus.* 9.
          - Retrorſùm verſis. . . *Aries.* 10.
          - Ad latera verſis. . . *Bos.* 11.
        - Cornibus ramoſis. . . *Cervus.* 12. . . *Sectio* II.
        - Cornibus nullis. . . *Tragulus.* 13. . . *Sectio* III.
    - In utraque maxilla:
      - Pedibus ſolidungulis. . . *Equus.* 14. . . ORDO VI.
      - Pedibus biſulcis. . . *Sus.* 15. . . ORDO VII.
      - Pedibus terungulatis anticè & poſticè. . . *Rhinoceros.* 16. . . ORDO VIII.
      - Pedibus quaterungulatis anticè, terungulatis poſticè: dentibus inciſoribus;
        - Duobus ſuprà, totidem infrà. . . *Hydrochærus.* 17. . . ORDO IX.
        - Decem ſuprà, totidem infrà. . . *Tapirus.* 18. . . ORDO X.
      - Pedibus quaterungulatis anticè & poſticè. . . *Hippopotamus.* 19. . . ORDO XI.
      - Pedibus unguiculatis: dentibus inciſoribus;
        - Duobus ſuprà, totidem infrà. . . ORDO XII.
          - Caninis nullis:
            - Corpore aculeato. . . *Hyſtrix.* 20. . . *Sectio* I.
            - Corpore aculeis deſtituto. . . *Sectio* II.
              - Cauda plana, ſquamoſa. . . *Caſtor.* 21.
              - Cauda breviſſima vel nulla:
                - Auriculis longis. . . *Lepus.* 22.
                - Auriculis brevibus vel nullis. . . *Cuniculus.* 23.
              - Cauda longa, veſtita pilis ita diſpoſitis ut caudam planam efficiant. . . *Sciurus.* 24.
              - Cauda longa, veſtita pilis ita diſpoſitis ut caudam rotundam efficiant. . . *Glis.* 25.
              - Cauda nuda, aut raris pilis obſita. . . *Mus.* 26.
          - Caninis preſentibus:
            - Corpore aculeis deſtituto. . . *Muſaraneus.* 27. . . *Sectio* III.
            - Corpore aculeato. . . *Erinaceus.* 28. . . *Sectio* IV.
        - Quatuor ſuprà, totidem infrà. . . ORDO XIII.
          - Digitis omnibus à ſe invicem ſeparatis. . . *Simia.* 29. . . *Sectio* I.
          - Digitis pedum anteriorum membrana, in alas expanſa, inter ſe connexis. . . *Pteropus.* 30. . . *Sectio* II.
        - Quatuor ſuprà, ſex infrà. . . ORDO XIV.
          - Digitis omnibus à ſe invicem ſeparatis. . . *Proſimia.* 31. . . *Sectio* I.
          - Digitis pedum anteriorum membrana, in alas expanſa, inter ſe connexis. . . *Veſpertilio.* 32. . . *Sectio* II.
        - Sex ſuprà, quatuor infrà. . . *Phoca.* 33. . . ORDO XV.
        - Sex ſuprà, totidem infrà. . . ORDO XVI.
          - Digitis à ſe invicem ſeparatis. . . *Sectio* I.
            - Digitis quatuor antè, quinque poſticè. . . *Hyæna.* 34.
            - Digitis quinque antè, quatuor poſticè. . . *Canis.* 35.
            - Digitis quinque antè, totidem poſticè:
              - Pollice ab aliis digitis remoto. . . *Muſtela.* 36.
              - Pollice aliis digitis proximo . . . *Meles.* 37.
            - Pedibus calcaneis incedentibus. . . *Urſus.* 38.
            - Unguibus hamatis & retractilibus. . . *Felis.* 39.
          - Digitis membranis inter ſe connexis. . . *Lutra.* 40. . . *Sectio* II.
        - Sex ſuprà, octo infrà. . . *Talpa.* 41. . . ORDO XVII.
        - Decem ſuprà, octo infrà. . . *Philander.* 42. . . ORDO XVIII.

TABLE *Méthodique des* Quadrupedes *diviſés en Ordres, Sections & Genres.*

- Les Quadrupedes ou
  - N'ont point de dents. . . Ordre I.
    - Et le corps couvert de poils. . . *Le Fourmiller.* 1. . . *Section.* I.
    - Et le corps couvert d'écailles. . . *Le Pholidote.* 2. . . *Section* II.
  - Ont des dents.
    - Des dents molaires ſeulement. . . Ordre II.
      - Et le corps couvert de poils. . . *Le Pareſſeux.* 3. . . *Section* I.
      - Et le corps couvert d'un teſt oſſeux, & comme cuiraſſé. . . *L'Armadille.* 4. . . *Section* II.
    - Des dents molaires & des dents canines. . . Ordre III.
      - A la mâchoire ſupérieure deux dents canines très longues, & recourbées en enhaut; une trompe très longue & flexible. . . *L'Elephant.* 5.
      - A la mâchoire ſupérieure deux dents canines très longues, & recourbées en enbas; point de trompe. . . *La Vache Marine.* 6.
    - Des dents inciſives,
      - A la mâchoire inférieure ſeulement,
        - Six. . . *Le Chameau.* 7. . . Ordre IV.
        - Huit. . . Ordre V.
          - Des cornes ſimples. . . *Section* I.
            - Tournées en enhaut:
              - Les cuiſſes de devant beaucoup plus longues que celles de derriere. . . *La Giraffe.* 8.
              - Les cuiſſes de devant à peu près de la même longueur que celles de derriere. . . *Le Bouc.* 9.
            - Tournées vers le derriere. . . *Le Bellier.* 10.
            - Tournées vers les côtés. . . *Le Bœuf.* 11.
          - Des cornes branchues. . . *Le Cerf.* 12. . . *Section* II.
          - Point de cornes. . . *Le Chevrotain.* 13. . . *Section* III.
      - Aux deux mâchoires:
        - La corne du pied d'une ſeule piece. . . *Le Cheval.* 14. . . Ordre VI.
        - Le pied fourchu. . . *Le Cochon.* 15. . . Ordre VII.
        - Trois doigts ongulés à chaque pied. . . *Le Rhinoceros.* 16. . . Ordre VIII.
        - Quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere:
          - Deux dents inciſives à chaque mâchoire. . . *Le Cabiai.* 17. . . Ordre IX.
          - Dix dents inciſives à chaque mâchoire. . . *Le Tapir.* 18. . . Ordre X.
        - Quatre doigts ongulés à chaque pied. . . *L'Hippopotame.* 19. . . Ordre XI.
        - Les doigts onguiculés:
          - Deux dents inciſives à chaque mâchoire. . . Ordre XII.
            - Point de dents canines:
              - Des piquants ſur le corps. . . *Le Porc-Epic.* 20. . . *Section* I.
              - Point de piquants ſur le corps. . . *Section* II.
                - La queue platte & écailleuſe. . . *Le Caſtor.* 21.
                - La queue très-courte, ou point de queue:
                  - Les oreilles longues. . . *Le Lievre.* 22.
                  - Les oreilles courtes, ou point d'oreilles. . . *Le Lapin.* 23.
                - La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît platte. . . *L'Ecureuil.* 24.
                - La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît ronde. . . *Le Loir.* 25.
                - La queue nue, ou couverte de poils clair-ſemés. . . *Le Rat.* 26.
            - Des dents canines:
              - Point de piquants ſur le corps. . . *La Muſaraigne.* 27. . . *Section* III.
              - Des piquants ſur le corps. . . *Le Heriſſon.* 28. . . *Section* IV.
          - Quatre dents inciſives à chaque mâchoire. . . Ordre XIII.
            - Tous les doigts ſeparés les uns des autres. . . *Le Singe.* 29. . . *Section* I.
            - Les doigts des pieds de devant joints enſemble par une membrane, étendue en aîles. . . *La Rouſſete.* 30. . . *Section* II.
          - Quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & ſix à l'inférieure. . . Ordre XIV.
            - Tous les doigts ſeparés les uns des autres. . . *Le Maki.* 31. . . *Section* I.
            - Les doigts des pieds de devant joints enſemble par une membrane, étendue en aîles. . . *La Chauve-Souris.* 32. . . *Section* II.
          - Six dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & quatre à l'inférieure. . . *Le Phocas.* 33. . . Ordre XV.
          - Six dents inciſives à chaque mâchoire. . . Ordre XVI.
            - Les doigts ſeparés les uns des autres. . . *Section* I.
              - Quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere. . . *L'Hyene.* 34.
              - Cinq doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere. . . *Le Chien.* 35.
              - Cinq doigts à chaque pied:
                - Le pouce éloigné des autres doigts. . . *La Belette.* 36.
                - Le pouce proche des autres doigts. . . *Le Blaireau.* 37.
              - Les pieds qui s'appuyent ſur le talon en marchant. . . *L'Ours.* 38.
              - Les ongles crochus, & qui peuvent être retirés & entierement cachés. . . *Le Chat.* 39.
            - Les doigts joints enſemble par des membranes. . . *La Loutre.* 40. . . *Section* II.
          - Six dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure. . . *La Taupe.* 41. . . Ordre XVII.
          - Dix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure. . . *Le Philandre.* 42. . . Ordre XVIII.

bent *inciſores* in utraque maxilla decem ; & digitis *ungulatis* quatuor in pedibus anticis, & tribus in poſticis donantur.

In undecimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla ; & digitos *ungulatos* quatuor in ſingulis pedibus.

In duodecimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla duo ; & digitis *unguiculatis* prædita ſunt.

In decimo tertio, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla quatuor, & digitis donantur *unguiculatis*.

In decimo quarto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore quatuor, in inferiore ſex ; & digitis *unguiculatis* donantur.

In decimo quinto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore ſex, in inferiore quatuor ; & digitis *unguiculatis* prædita ſunt.

In decimo ſexto, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla ſex ; & digitis *unguiculatis* donantur.

In decimo ſeptimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore ſex, in inferiore octo ; & digitis donantur *unguiculatis*.

In decimo octavo & ultimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore

ont dix dents *inciſives* à chaque mâchoire ; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Dans le onziéme, ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires ; & quatre doigts *ongulés* à chaque pied.

Dans le douziéme, ceux qui ont deux dents *inciſives* à chaque mâchoire ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le treiziéme, ceux qui ont quatre dents *inciſives* à chaque mâchoire ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le quatorziéme, ceux qui ont quatre dents *inciſives* à la mâchoire ſupérieure, & ſix à l'inferieure ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le quinziéme, ceux qui ont ſix dents *inciſives* à la mâchoire ſupérieure, & quatre à l'inferieure ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le ſeiziéme, ceux qui ont ſix dents *inciſives* à chaque mâchoire ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le dix-ſeptiéme, ceux qui ont ſix dents *inciſives* à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inferieure ; & les doigts *onguiculés*.

Dans le dix-huitiéme & dernier, ceux qui ont dix dents *inciſives* à la mâchoire

ſupérieure, & huit à l'inferieure; & les doigts *onguiculés*.

decem, in inferiore octo; & digitis *unguiculatis* prædita ſunt.

ORDO I.

QUADRUPEDA

Edentula.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia ſunt corpore *pilis* tecto ; alia corpore *ſquamis* magnis, pilis quibuſdam intermixtis tecto. Ratione tegminis dividuntur in duas Sectiones; in unaquaque eſt unicum Genus. Prima continet ea quorum corpus *pilis* tegitur, quæ formicis veſcuntur, quæque ideo *Myrmecophagarum* nomine donantur. Secunda, ea quorum *ſquamæ* magnæ, pilis quibuſdam intermixtis, corpus cooperiunt, quæque ideo *Pholidoti* nomine prædita ſunt.

Obſ. Omnia hujus Ordinis QUADRUPEDA linguâ cilindraceâ, longiſſimâ, quamque, *Picorum avium* modo, longiſſimè extrà orem exſerunt, donantur. Ope hujus linguæ formicas, quibus veſcuntur, arripiunt.

ORDRE I.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents.

PARMI les QUADRUPEDES de cet ordre, les uns ont le corps couvert de *poils*, & les autres l'ont couvert de grandes *écailles*, ſous la plûpart deſquelles ſont quelques poils. Cette différence d'habillement me les fait diviſer en deux Sections, qui contiendront chacune un Genre. Dans la premiere ſont ceux qui ont le corps couvert de *poils*, qui ſe nourriſſent de Fourmis, & qu'on a appellé pour cela *Fourmillers*. La ſeconde contient ceux qui ont le corps couvert d'*écailles*, auxquels je donne le nom de *Pholidote*.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de cet Ordre ont la langue cilindrique & très-longue, & peuvent, comme les *Pics*, la faire ſortir en grande partie hors de la bouche. C'eſt par ſon moyen qu'ils attrapent les fourmis, dont ils ſe nourriſſent.

SECTION I.

Ceux qui ont le corps couvert de poils.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, qui eſt celui des *Fourmillers*.

I.

Le Genre du Fourmiller.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents:
D'avoir le corps couvert de poils.

Obſ. Parmi les QUADRUPÉDES de ce genre les uns ont le muſeau fort allongé; d'autres l'ont beaucoup plus court. Tous ont la bouche petite.

SECTIO I.

Ea quæ ſunt corpore piloſo.

IN illâ Sectione unicum continetur Genus, ſcilicet *Myrmecophagarum*.

I.

Genus Myrmecophagæ.

Hujus character eſt
Dentes nulli:
Corpus piloſum.

Obſ. Hujus generis QUADRUPEDUM alia ſunt roſtro longiſſimo; alia roſtro multò breviori. Omnibus os parvum.

** 1. LE FOURMILLER TAMANOIR.

Myrmecophaga roſtro longiſſimo, pedibus anticis tetradactylis, poſticis pentadactylis, caudâ longiſſimis pilis veſtitâ.... MYRMECOPHAGA TAMANOIR dicta.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 15. ſp. 1.*
Tamandua-Guacu; i. e. Myrmecophaga omnium maxima. *Klein. Quadr. p. 45. n°. 1. Fig. T. 5. (Fig. malâ) peccat in eo quod caput & collum nimis elongata ſunt, & roſtrum informe* (a).
Myrmecophaga, ſive Tamendoa. *Euſ. Nieremb. p.* 190.
Tamandua-guacu Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 241.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 225. (*Fig. bona*).
Charlet. exerci. p. 17.
Tamandua-Guacu. *Jonſt. Quadr. p. 95. Fig. T. 62.* (*Fig. bona*).

(*a*) M. Klein a confondu cette eſpéce avec celle dont Seba a donné la Figure Tom. 1. Pl. 40. Fig. 1. ſous le nom de *Tamandua-Guacu du Bréſil*, qui eſt la troiſiéme eſpéce de ce genre.

(*a*) Dom. Klein, ſpeciem iſtam eamdem eſſe putavit quam Seba delineavit Vol. 1. T. 40. Fig. 1. ſub iſto nomine *Tamandua-Guacu Braſilienſis*, quæ tertia eſt hujus generis ſpecies.

Tamandua-guacu, ſive major. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. pag.* 320. (*Fig. bona*).
Tamandua major cauda panniculata. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 162.
Tamandua. *Joan. de Laet p.* 551.
Urſus Formicarius, Cardani. *Raj.*
Mange-Fourmis, ou Renard Ameriquain. *Des March. T. III. p.* 307.
Cochon de terre. *Kolbe. Tome III. p.* 43.
Les Congois l'appellent UMBULU. *Marcgr. Charlet.*
Les Suédois, MYRBIÕRN. *Linn.*
Les Hollandois, MIEREN-EETER. *Klein.*
Les Anglois, GREAT-ANT-BEAR. *Raj.*
Les François de la Guiane, GROS MANGEUR DE FOURMIS. *Barr.*
Les Guianois, OUARIRI. *Barr.*

Longitudo, ab extremitate caudæ, ad extremitatem oris, 6 ½ pedum, ſcilicet caput ſimul cum promuſcide 14 pollicum; collum 4 pollicum; corpus ad caudæ initium 2 ½ pedum, & cauda totidem. Crura poſteriora unum pedem longa, anteriora paulò longiora, pedes anteriores in 4, poſteriores in 5 digitos, longis unguibus munitos diviſi, duobus mediis anterioribus maximis; roſtrum longiſſimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & ſubrotundæ; oculi parvi; cauda longiſſimis pilis veſtita; omnes pili ejus (quod maximè ſingulare) ſunt plani, longitudine minores in parte corporis anteriore, quam in poſteriore; in collo & capite antrorſum verſi apparent. Omnes ex albo & nigro varii, poſteriùs tamen magis nigreſcentes. Per pectus ad latera in dorſum, uſque ad me-

Il a, depuis l'extrêmité de la queue juſqu'à l'extrêmité de la bouche, environ 6 ½ pieds, ſçavoir la tête & le muſeau 14 pouces, le col 4 pouces, le corps 2 ½ pieds, & la queue autant. Les jambes de derriere ſont longues d'un pied, & celles de devant un peu plus longues; il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts. Les deux du milieu des pieds de devant ſont les plus longs; le muſeau eſt fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la queue garnie de longs poils: mais ce qu'il a de ſingulier, c'eſt que tous ſes poils ſont plats. Ils ſont moins longs à la partie antérieure du corps qu'à la poſtérieure. Ceux du col & de la tête paroiſſent tournés en devant. Ils ſont tous variez de noir & de blanc, plus noirs cependant vers la partie poſtérieure du corps. Une grande bande

noire; qui couvre la poitrine transverſalement, & paſſe ſur les côtés, va ſe terminer ſur le dos vers la moitié de ſa longueur. Les jambes de derriere ſont noires, celles de devant blanches, avec une tache noire vers le pied. C'eſt la plus grande eſpece de Fourmiller. Elle ſe trouve au *Cap de Bonne-Eſperance*, dans la *Guiane*, & dans le *Bréſil*.

diam longitudinem; linea protenditur nigra. Poſteriora crura nigris, anteriora albis pilis veſtiuntur, & in quolibet verſus pedem macula eſt nigra. Myrmecophagarum omnium ſpecies maxima eſt. Habitat in *Capite Bonæ-Spei*, *Guianiâ*, & *Braſiliâ*.

Obſ. Lorſque ſa queue eſt relevée vers le dos, elle lui ſert de paraſol.

Obſ. Caudâ ſuâ, in dorſum reflexâ, ſe tegit & inumbrat.

2. LE FOURMILLER.

Myrmecophaga roſtro longiſſimo, pedibus anticis tetradactylis, poſticis pentadactylis, cauda fere nuda... MYRMECOPHAGA.

Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. *Linn. Siſt. nat. ed. 6. g. 15. ſp. 3.*
Tamandua-I, Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p. 242. Marcgr. Hiſt. Br. p. 225. Fig. p. 226.* (*Figura bona*).
Tamandua Americana minor. *Klein. Quadr. p. 46.*
Tamandua-I. *Jonſt. Quadr. p. 95. Fig. T. 62.* (*Fig. bona*). *Charlet. exerc. p. 17.*
Tamandua-Miri. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p. 321.* (*Fig. bona*).
Tamandua minor cinerea. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 162.*
Tamandua Formicis veſcens Americana minor. *Seb. II. p. 48. Fig. T. 47. Fig. 2.* (*Fig. bona*).
Les Anglois l'appellent, LESSER ANT-BEAR. *Raj.*
Les François de la Guiane, MANGEUR DE FOURMIS. *Barr.*

Il eſt plus de moitié plus petit que le précédent: il a, comme lui, 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; le muſeau fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la tête, les jambes, les pieds, la queue, & toute la par-

Precedentis dimidiam magnitudinem non attingit. Sicut in eo, pedes anteriores 4 digitis, poſteriores 5 donati ſunt; roſtrum longiſſimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & ſubrotundæ; oculi parvi; caput, crura, pedes, cauda, & tota corporis pars

anterior ex albo flaveſcunt; poſterior verò ex ruffo fuſca eſt. Per pectus ad latera in dorſum uſque ad mediam longitudinem protenditur linea etiam ex ruffo fuſca. Cauda ferè nuda eſt; per hoc, ita & per magnitudinem, & pilorum brevitatem à precedente differt. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

tie antérieure de ſon corps ſont couleur de paille; la partie poſtérieure eſt d'un brun roux. Une bande de pareille couleur, qui couvre la poitrine tranſverſalement, & paſſe ſur les côtés, va ſe terminer ſur le dos vers la moitié de ſa longueur. Sa queue eſt preſque raſe: c'eſt par-là, ainſi que par ſa grandeur, & ſes poils courts qu'il differe du précédent. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

3. LE FOURMILLER AUX LONGUES OREILLES.

Myrmecophaga roſtro longiſſimo, pedibus anticis tridactylis, poſticis pentadactylis, auriculis longis, flaccidis... MYRMECOPHAGA MINOR. (*a*).

Tamandua-guacu, Braſilienſis, ſeu Urſa formicaria. *Seb. Vol. 1. p. 65. Fig. T. 40. f. 1.*

Pedes anteriores in 3 digitos, poſteriores in 5 ſunt diviſi. Unguis medius pedum anteriorum aliis multo major; roſtrum longiſſimum; oris rictus parvus; auriculæ longæ flaccidæ; oculi ſat magni; cauda longa & in acumen deſinens, ſupernè dilutè fulva; corpus longis pilis ſupernè dilutè ſpadiceis, infernè verò magis ruffis, veſtitur. Habitat in *Indiâ Occidentali*.

Il a 3 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. L'ongle du milieu des pieds de devant eſt beaucoup plus grand que les autres. Le muſeau eſt fort allongé; l'ouverture de la bouche petite; les oreilles longues & pendantes; les yeux aſſez grands; la queue longue & qui ſe termine en pointe, eſt dans ſa partie ſupérieure d'un fauve clair. Le corps eſt couvert de longs poils d'un chatain clair en deſſus, & d'un brun plus foncé en deſſous. On le trouve dans les *Indes Occidentales*.

(*a*) Dom. Klein, ut ſuprà notavi, hujus generis ſpeciem primam eam eſſe putavit.

(*a*) M. Klein, comme je l'ai dit ci-deſſus, l'a confondu avec le *Fourmiller Tamanoir*.

Séba, *Tom.* 1. *Planc.* 37. *F.* 1. a donné la figure d'un autre, qui ne différe de celui-ci que parce qu'il eſt plus petit, & par ſa couleur, qui eſt incarnat. Je le crois un jeune de cette eſpece. *M. Kelin*, l'a décrit ſous le nom de *Tamandua-J. Braſil.* p. 46. n°. 2.

Seba, *Vol.* 1. *T.* 37. *F.* 1. aliam delineavit quæ ab iſtâ non differt, niſi magnitudine, quâ ei cedit, & colore qui helvus eſt. Iſtius ſpeciei juniorem eam puto. *Klein. Quadr.* p. 46. n°. 2. eam deſcripſit ſub nomine *Tamandua-J. Braſil.*

**4. Le Petit Fourmiller.

Myrmecophaga roſtro brevi, pedibus anticis didactylis, poſticis tetradactylis... Myrmecophaga minima.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis. *Linn. Syſt. Nat. Ed. 6. g.* 15. ſp. 2.
Tamandua alba, altera, ſeu Coati. *Klein. Quadr. p.* 46. *n°.* 3.
Tamandua, ſeu Coati Americana alba altera. *Seb. Vol.* 1. *p.* 60. *Fig. T.* 37. *F.* 3. (*Fig. bona*). *Peccat tamen in eo quod digitus unicus in pedibus anterioribus repreſentetur.*
Tamandua minor flaveſcens. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. p.* 163.
Les François de la Guiane l'appellent Petit mangeur de Fourmis. *Barr.*
Les Guianois, Ouatiriouaou. *Barr.*
Les Ethiopiens de Surinam, Coaty. *Seba.*

Celui-ci eſt la plus petite eſpéce. Depuis le bout du nez juſqu'à l'extrêmité de la queue, il a environ 15 pouces; la queue eſt plus longue que le corps & la tête; le col eſt très court. Il a 2 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere; l'ongle extérieur des pieds de devant eſt très grand. Le muſeau eſt court; l'ouverture de la bouche plus grande que dans les précédens; les oreilles petites; les yeux aſſez grands. Tout ſon corps eſt couvert de poils jaunâtres, mêlez de gris, & qui ſont doux au tou-

Hæc eſt minima ſpecies. Longitudo totius corporis, ab extrêmitate caudæ ad extremitatem oris, circiter 15 pollicum. Cauda corpore ſimul cum capite longior; collum breviſſimum; pedes anteriores in 2 digitos, poſteriores in 4 ſunt diviſi. Unguis exterior pedum anteriorum maximus. Roſtrum brevius; oris rictus amplior, quam in precedentibus; auriculæ parvæ; oculi ſat magni. Color totius corporis ex albo flaveſcit, cum griſeo admixto. Pili om-

nes, ſericei modo, ad tactum molliſſimi ſunt. Habitat in *Guianiâ*.

cher comme de la ſoye. On le trouve dans la *Guiane*.

SECTIO II.

Ea quæ ſunt corpore ſquamoſo.

IN illa Sectione, ſicut in precedenti, unicum eſt genus, ſcilicet *Pholidoti*.

SECTION II.

Ceux qui ont le corps couvert d'écailles.

CEtte ſection, de même que la précédente, ne contient qu'un ſeul genre, qui eſt celui du *Pholidote*.

II.

Genus Pholidoti.

Hujus character eſt
Dentes nulli:
Corpus ſquamoſum.

II.

Le genre du Pholidote.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents:
Et d'avoir le corps couvert d'écailles.

** 1. LE PHOLIDOTE.

Pholidotus pedibus anticis & poſticis pentadactylis, ſquamis ſubrotundis... PHOLIDOTUS.

Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis. *Linn. Syſt. Nat. Ed. 6. g. 16. ſp. 1.*

Tatu Muſtelinus: Armodillus ſquamatus major Ceylanicus, ſeu *Diabolus Tajovanicus* dictus. *Klein. Quadr. p. 47.*

Armodillus, ſquamatus, Major, Ceylanicus, ſeu *Diabolus Tajovanicus* dictus. *Seb. Vol. 1. p. 88. Fig. T. 54. F. 1. Pullus Fig. T. 53 F. 5.* (*Fig. bonis*)

Lacertus Indicus Squamoſus. *Bont. Ind. Ori. Fig. p. 60.* (*Fig. ſat bona*).

Lacertus Squamoſus minor ſetulis aſperſis. *Gaz. Pet. Fig. T. 20. F. 12.* (*Fig. bona*).

Lezard Ecaillé. *Hiſt. de l'Acad.* Tom. 3. *Part.* 3. *p.* 87. *Fig. Plant.* 17. (*Fig. bonne, excepté la tête qui eſt mal faite*).

Les François l'appellent LEZARD ECAILLEUX; DIABLE DE JAVA.

Les Eſpagnols, ARMODILLO. *Seba.*

Les Habitans de Java & les autres Peuples Orientaux, PANGGOELING. *Seba.*

Les Braſiliens, TATOE. *Seba.*

Longitudo totius corporis

Il a environ 3 ou 4 pieds de

long. *Seba* dit qu'il y en a qui ont plus de 6 pieds. Il ne lui paroît point de col, & la queue eſt à peu près de la longueur du corps: il a à chaque pieds 5 doigts armés d'ongles forts; ceux du milieu ſont les plus grands. Sa tête eſt oblongue; le muſeau & l'ouverture de la bouche petite; les oreilles petites. La tête en deſſous & aux côtés, le deſſous du corps, & la partie intérieure des jambes, ſont couverts d'une peau molle ſur laquelle ſont quelques poils. Le deſſus de la tête, le deſſus du corps & des jambes, & la queue deſſus & deſſous ſont couvertes de grandes écailles arondies, ſtriées, rouſſes, ſous leſquelles ſont quelques gros poils de la même couleur. Celles du deſſus de la tête ſont plus petites que les autres. Dans les jeunes les écailles ſont jaunâtres, enſuite elles deviennent rouſſes; cette derniere couleur devient de plus en plus foncée, à meſure que l'Animal vieillit. Il a la faculté de faire de ſon corps une boule, en retirant ſi bien ſa tête & ſa queue vers le ventre, qu'on n'en ſçauroit rien appercevoir. On le trouve au *Bréſil*, & dans les *Iſles de Ceylan*, *Java*, & *Formoſe*.

trium circiter aut 4 pedum. Secundum *Sebam* ſunt qui ultra 6 pedes longi ſunt. Collum non apparet; cauda corporis ſimul cum capite longitudine; in ſingulis pedibus ſunt 5 digiti magnis unguibus muniti, intermediis maximis. Caput oblongum; roſtrum & oris rictus minimus; auriculæ parvæ. Caput infrà & ad latera, corporis infima pars, & crurum pars interior teguntur cute molli pilis quibuſdam prædita. Vertex, pars ſuperior corporis & crurum, & cauda ſupernè & infernè teguntur ſquamis magnis, rotundatis, ſtriatis, ruffis, pilis quibuſdam craſſis, etiam ruffis, intermixtis. Squamæ verticis aliis multò minores ſunt. Juniorum ſquamæ flaveſcunt; adultiòrum rufeſcunt, & tandem in ſenio magis, magiſque ſaturantur. In globoſam quaſi pilam ſe ſe contrahere poteſt, capite & caudâ tantoperè ventrem versùs adductis, ut nihil eorum conſpici queat. Habitat in *Braſiliâ*, & *Inſulis Ceylonenſi*, *Java*, & *Formoſa*.

** 2. Le Pholidote a Longue Queue.

Pholidotus pedibus anticis & poſticis tetradactylis, ſquamis mucronatis, caudâ longiſſima.. Pholidotus longicaudatus.

Lacertus ſquamoſus peregrinus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 274.
Cluſ. Exot. Fig. p. 374. (*Fig. bona*).
Muſ. Beſl. p. 36. *Fig. T.* 11. (*Fig. bona*).
Lacerta Indica Yvannæ congener. *Aldro. Quadr. Dig. Ovi. p.* 668. *Fig. p.* 667. (*Fig. ſat bona*).
Lezard de Cluſius. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 89.
Lezard des Indes Orientales. *Hiſt. de l'Acad. an.* 1703. *p.* 39.
Les Indiens Orientaux, l'appellent Phatagen. *Hiſt. de l'Acad.*
Les Portugais du Bréſil, Bicho Vergonhoso. *Beſl.*
Les Habitans de l'Iſle de Formoſe, Diable de Tajoan. *Beſl.*

Longitudo corporis, ab extremitate oris ad extremitatem caudæ, 3 pedum & 10 pollicum. Cauda 2 ½ pedes longa. Pedes ſinguli in 4 digitos, unguibus prædítos, dividuntur. Unguis ſecundus pedis anterioris aliis multò major; ungues poſteriorum pedum minores: anteriora crura poſterioribus paulò breviora; caput infrà & ad latera, corporis pars infima, anteriora crura, & poſteriorum crurum pars interior teguntur cute molli pilis quibuſdam nigris prædita. Vertex, pars ſuperior corporis & crurum poſteriorum, & cauda ſuprà & infrà teguntur ſquamis magnis, latis, ſtriatis, & mucronatis; ſquamæ verticis aliis multò minores ſunt; & ſquamæ

Il a environ 3 pieds 10 pouces de long, depuis le bout du muſeau, juſqu'à celui de la queue, qui a, elle ſeule, 2 ½ pieds de longueur. Il a à chaque pied 4 doigts, armés d'ongles, dont le ſecond des anterieurs eſt beaucoup plus grand que les autres. Ceux des pieds de derriere ſont les plus petits; les jambes de devant ſont un peu plus courtes que celles de derriere. La tête en deſſous & aux côtés, le deſſous du corps, les jambes de devant, & la partie intérieure de celles de derriere ſont couvertes d'une peau molle, ſur laquelle ſont quelques poils noirs. Le deſſus de la tête, du corps & des jambes de derriere, & la queue deſſus & deſſous ſont couverts de grandes écailles, larges, ſtriées, & terminées par une pointe. Les

écailles du deſſus de la tête ſont plus petites que les autres, & celles de la queue ſont moins grandes à meſure qu'elles approchent de ſon extrémité. On le trouve au *Bréſil*, & à l'*Iſle Formoſe*.

caudæ ſenſim versùs ejus extremum procedendo minuuntur. Habitat in *Inſulâ Formoſâ* & *Braſiliâ*.

ORDO II.

QUADRUPEDA

Dentibus molaribus tantum donata.

IN hoc Ordine, ſicut in precedenti, duo tantum ſunt genera QUADRUPEDUM, quæ ratione tegminis in duas Sectiones dividuntur: alia enim ſunt corpore *piloſo*, alia corpore quaſi Cataphracto, vel tegmine oſſeo tecto. Prima Sectio continet ea quorum corpus *pilis* tegitur, quæque ratione tardi progreſsûs, *Tardigradi* vocantur. Secunda continet ea quorum corpus tegmine oſſeo tegitur, quæque *Cataphracti* nomine donantur.

ORDRE II.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont que des dents molaires.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans le précédent, que deux genres de QUADRUPEDES, qui à raiſon de la couverture de leur corps ſe diviſent en deux Sections. Les uns ont le corps couvert de *poils*, & les autres l'ont comme cuiraſſé ou couvert d'un teſt oſſeux. Dans la premiere Section ſont ceux qui ont le corps couvert de *poils*, & qui à cauſe de leur lenteur à marcher ſont appellés *Pareſſeux*. Dans la ſeconde ſont ceux qui ont le corps couvert d'un teſt oſſeux, & qu'on appelle *Armadilles*.

SECTIO I.

Ea quæ ſunt corpore piloſo.

IN illâ Sectione unicum continetur genus, ſcilicet *Tardigradi*.

SECTION I.

Ceux qui ont le corps couvert de poils.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui du *Pareſſeux*.

III.

Le genre du Pareſſeux.

Son caractere eſt

De n'avoir ni dents inciſives, ni dents canines, mais des dents molaires ſeulement:

D'avoir le corps couvert de poils.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce genre ont les jambes de devant plus longues que celles de derriere, ce qui fait qu'ils marchent très lentement: & c'eſt à cauſe de leur allure lente qu'on les a nommés *Pareſſeux.* Leurs dents molaires, qui ſont les ſeules qu'ils ayent, ne ſont point à lobes comme celles des autres QUADRUPEDES, elles ſont cilindriques, & terminées par un bout arrondi.

III.

Genus Tardigradi.

Hujus character eſt

Dentes nec inciſores, nec canini, ſed molares tantum:

Corpus piloſum.

Obſ. Omnium hujus generis QUADRUPEDUM crura anteriora poſterioribus longiora ſunt: ideò lentiſſimè progrediuntur; ob quam tarditatem greſsûs *Tardigradi* nomine donantur. Dentes illorum molares, quibus ſolis prædita ſunt, nullomodo ſunt lobati, ſicut dentes molares aliorum QUADRUPEDUM, ſed cilindrici, apice rotundato.

** 1. LE PARESSEUX.

Tardigradus pedibus anticis & poſticis tridactylis.... TARDIGRADUS.

Bradypus manibus tridactylis, caudâ brevi. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 3. ſp.* 1.
Ignavus Americanus riſum fletu miſcens. Ignavus Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 43.
Ai, ſive Ignavus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 245.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 221. (*Fig. bona*).
Piſon. Hiſt. nat. p. 321. *Fig. p.* 322. (*Fig. bona*).
Charlet. exer. p. 17.
Ignavus. *Aldrov. Quadr. dig. viv. p.* 262.
Jonſt. Quadr. p. 101. *Fig. T.* 62. (*Fig. bona*) & *T.* 74. (*Fig. mala*).
Cluſ. Exot. p. 372. *Fig. p.* 373. (*Fig. bona*).
Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 154.
Ignavus, ſive Haut Cluſii. *Euſ. Nieremb. bis Fig. p.* 164. (*prima Figura mala, ſecunda bona*).
Ignavus, ſive per antiphraſim agilis. *Cluſ. Exot. p.* 110. *Fig. p.* 111. (*Fig. mala*).
Hay. *Jo. de Laet. Fig. p.* 554. (*Fig. mala*).

Arctopitechus. *Geſn. icon. Quadr. Fig. p. 96.* (*Fig. mala*).
Papio II. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 61.* (*Fig. mala*).
Pigritia, ſive Haut. *Euſ. Nieremb. Fig. p. 163.* (*Fig. mala*).
Ai, ſeu Tardigradus Gracilis Americanus. *Seb. Vol. 1. p. 53. Fig. T. 33. Fig. 2.* (*Fig. optima*).
Unau. *Jo. de Laet. Fig. p. 618.* (*Fig. bona*).
Ai, ou Pareſſeux. *Des March. Tom. III. p. 300.*
Les Eſpagnols & les Portugais l'appellent PEZILLO, & PERICO LIGERO: PRIGUIZA. *Klein. Aldrov. Jonſt. Euſ. Nieremb. Marcgr. Piſon. Seba. Charlet.*
Les Flamands LUIAARDT. *Klein. Seba.*
Les Guianois OUAIKARE'. *Barr.*

Longitudo totius corporis 2 circiter pedum. Crura anteriora poſterioribus ſunt longiora. Cauda breviſſima: in ſingulis pedibus 3 ſunt digiti, longis & incurvis unguibus muniti: totum corpus tegitur pilis denſiſſimis, ex fuſco & albo variis, exceptâ facie, quæ tota alba eſt. Caret auriculis, ſed non caret meatu auditorio. Habitat in *Indiâ Orientali*, *Guianiâ*, & *Braſiliâ*.

Il a environ 2 pieds de longueur. Ses jambes de devant ſont plus longues que celles de derriere. Sa queue eſt très courte; il a à chaque pied 3 doigts armés d'ongles forts, & un peu recourbés. Tout ſon corps eſt couvert de poils très épais, variés de brun & de blanc, ſa face ſeule eſt toute blanche. Il n'a point d'oreilles extérieurement; mais on trouve à leur place des trous par leſquels il entend. On le trouve dans les *Indes Orientales*, dans la *Guiane* & au *Bréſil.*

2. LE PARESSEUX DE CEYLAN

Tardigradus pedibus anticis didactylis, poſticis tridactylis.
TARDIGRADUS CEYLONICUS.

Bradypus manibus didactylis, caudâ nulla. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 3. ſp. 2.*
Silenus: Simia perſonata. *Klein. Quadr. p. 42.*
Tardigradus Ceylanicus. *Seb. Vol. 1. p. 54. Fig. T. 34. F. 1. & T. 33. F. 4.* (*Fig. bonis*).

Pedes anteriores in 2, poſteriores in 3 digitos, unguibus longis & incurvis muni-

Il a 2 doigts aux pieds de devant, & 3 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts & cro-

chus: ſes oreilles, qui ſont plates & appliquées contre la tête, ſont cachées ſous les poils. Il n'a point de queue: tout ſon corps eſt couvert de poils épais, de couleur incarnat foncé par deſſus le dos, & d'un cendré clair par deſſous le ventre: il a le muſeau un peu plus allongé que le précédent.

Je n'ai jamais vû cet Animal, je ne ſuis pas ſûr qu'il ait le caractere de ce genre: *Séba,* qui l'a décrit, n'a point parlé de ſes dents; je crois pourtant qu'on doit le mettre dans ce genre; car il convient aſſez avec le *Pareſſeux* par ſa façon de vivre, par ſon cri, & même par la forme de ſon corps, excepté le muſeau, qui eſt un peu plus allongé. Au reſte jaime mieux, juſqu'à-ce que je ſois plus inſtruit de ſon vrai caractere, le mettre dans ce genre, que dans la famille des *Chameaux*, comme a fait M. *Klein*.

On le trouve dans l'*Iſle de Ceylan*.

tos, diviſi ſunt: auriculæ planæ, quam proximè capiti adpreſſæ ſunt, & capitis crine obteguntur. Caret caudâ: totum corpus tegitur pilis denſiſſimis, coloris ſaturatè helvi per corpus ſupernum, ſubtùs verò dilutè cinerei: roſtrum paulò longius quam in precedente.

Hoc Animal nunquam vidi: neſcio utrum hujus generis characterem habeat. *Seba*, qui primum eum deſcripſit, dentium nullam mentionem fecit: attamen ex hoc genere eum eſſe puto; moribus enim, cantilenâ, & quidem formâ corporis, excepto roſtro paululum longiori, cum *Tardigrado* perfectè convenit. Cæterùm convenientiùs mihi videtur, uſquedum ampliorem illius cognitionem habeamus, eum in hoc genere reponere, quam, cum illuſtriſſimo *Kleinnio*, in familiâ *Camelorum*.

Habitat in *Inſulâ Ceylonenſi*.

SECTION II.

Ceux qui ont le corps couvert d'un teſt oſſeux.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui de l'*Armadille*.

SECTIO II.

Ea quæ ſunt corpore tegmine oſſeo tecto.

IN illâ Sectione unicum eſt genus, ſcilicet *Cataphracti*.

IV.

Genus Cataphracti. Fig. 11

Hujus character eſt

Dentes nec inciſores, nec canini, ſed molares tantum: Fig. 1. a.

Corpus tegmine oſſeo tectum, & cataphractum.

Obſ. Tegmen oſſeum, quod omnium hujus generis ſpecierum corpus cooperit, in plures partes dividitur: anterior & poſterior (*a*) ſunt quaſi duo ſcuta ſupernè convexa, internè concava, inter quæ plurima ſunt cingula, connexa inter ſe cute membranacea, cujus ope ſuprà ſe mutuò gliſcunt; undè corpus ita contrahunt ut globoſum fiat, ſicut *Erinaceus*. Tota pars infima, ſcilicet caput, & collum inferius, & venter, cute craſſa, craſſis rariſque pilis obſita, inveſtitur: ſunt etiam ſuprà corpus pili quidam inter ſquamas tegmen oſſeum tegentes. Dentes omnes hujus generis QUADRUPEDUM, ſicut in genere precedenti, ſunt cilindrici.

IV.

Le genre de l'Armadille. Fig. 11

Son caractere eſt

De n'avoir ni dents inciſives, ni dents canines, mais des dents molaires ſeulement: Fig 1. a.

D'avoir le corps couvert d'un teſt oſſeux, & comme cuiraſſé.

Obſ. Le teſt oſſeux, dont le corps de toutes les eſpéces de ce genre eſt couvert, eſt diviſé en pluſieurs parties: l'antérieure & la poſtérieure (*a*) ſont comme deux eſpéces de boucliers convexes en deſſus, & concaves en deſſous, entre leſquels ſont pluſieurs bandes étroites, jointes enſemble par une peau membraneuſe, qui leur laiſſe la liberté de ſe mouvoir, & de gliſſer les uns ſur les autres: c'eſt ce qui leur permet de ſe mettre en boule, comme le *Hériſſon*. Toute la partie inférieure, ſçavoir le deſſous de la tête & du col, & le ventre, eſt couverte d'une peau épaiſſe, garnie de quelques gros poils: il y a auſſi quelques poils entre les écailles qui couvrent le teſt oſſeux. Toutes leurs dents ſont cilindriques, comme dans le genre précédent.

1. L'ARMADILLE.

Cataphractus ſcuto unico, cingulis octodecim.... ARMADILLO.

Tatu Muſtelinus. *Raj Syn. Quadr. p.* 235.
Daſypus cingulo ſimplici. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 12. *ſp.* 1.
Les Anglois l'appellent WEESLE-HEADED ARMADILLO. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad initium

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ

(*a*) Primæ ſpeciei pars poſterior corporis non ſcuto, ſed cingulis tegitur.

(*a*) La premiere eſpece n'a point de bouclier derriere, mais ſeulement des bandes.

10 pouces. La queue a 7 pouces de long. Chaque pied eſt diviſé en 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de devant ſont beaucoup plus longs que les autres. Son front eſt large & applati; ſes yeux petits; ſes oreilles nues. On diſtingue aiſément cette eſpece des autres, en ce qu'elle n'a point de grand bouclier derriere: mais depuis le bouclier antérieur, juſqu'à la queue, le teſt oſſeux eſt diviſé en 18 bandes jointes enſemble par une peau membraneuſe. Les antérieures, qui ſont les plus grandes, ſont couvertes d'écailles quarrées; les poſtérieures de quarrées & de rondes mêlées enſemble. Les écailles qui couvrent le bouclier antérieur ſont quarrées, ainſi que celles de la queue, qui eſt compoſée de 6 anneaux à ſon origine, & enſuite ſe termine en pointe.

caudæ, 10 circiter pollicum; cauda 7 pollicum; pedes ſinguli dividuntur in 5 digitos, quorum 3 medii anteriores aliis multò ſunt longiores. Frons latus, valdè planus; oculi parvi; auriculæ nudæ. Ab aliis abundè diſtinguitur, in eo quod ſcuto poſteriori careat: ſed, à ſcuto anteriori ad caudam uſque, tegmen dividitur in 18 cingula, totidem membranis intermediis connexa. Anteriora, quæ & majora ſunt, ſquamis quadratis, poſteriora verò quadratis & rotundis intermixtis conſtant. Squamæ, ſcutum anterius tegentes, ſunt quadratæ, ſicut illæ quæ caudam cooperiunt, quæ cauda in exortu 6 annulis cingitur, & deinde in acutum deſinit.

2. L'Armadille Oriental.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis tribus. . . ARMADILLO ORIENTALIS.

Daſypus cingulis tribus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 12. *ſp.* 2.
Tatu Apara, Armadilli tertia ſpecies Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 234.
Tatu Apara. *Jonſt. Quadr. p.* 121. *Fig. T.* 63. (*Fig. bona*).
Marcgr. Hiſt. Bra. Fig. p. 232. [*Fig. bona*].
Tatu porcinus, ſeu Armadillo orientalis, loricâ oſſeâ, toto corpore tectus. *Klein. Quadr. p.* 48.
Tatu ſeu Armodillo Orientalis loricâ oſſeâ toto corpore tectus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 62. *Fig. T.* 38. *F.* 2. & 3. (*Fig. optima*).
Tatu ſeu Armadillo. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 100. (*Fig. bona*).

Armadillo, ſeu Tatou genus alterum. *Cluſ. Exot. Fig. p.* 109. (*Fig. bona*).

Armadillo, genus alterum Cluſii. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 158. [*Fig. ſat bona*].

Tatus Geſneri. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 163.

Longitudo corporis, ab extermitate roſtri ad extremitatem caudæ, circiter unius pedis: pedes ſinguli ſecundum *Marcgravium* & *Rajum*, in 5 digitos, ſecundum *Sebam* & *Kleinnium*, in 4 ſunt diviſi. Inter duo ſcuta tria ſunt cingula ſquamis parallelogramis tecta; ſquamis exagonis ſcuta teguntur; auriculæ nudæ, breves & rotundæ. Cauda utrinque ſuprà & infrà paulùm applanata, breviſſima, ſquamis exagonis tecta, unico tantum articulo conſtat. Habitat in *Indiâ Orientali*, *Braſiliâ* & *Guianiâ*.

Il a, depuis le bout du muſeau, juſqu'au bout de la queue, environ 1 pied; il a à chaque pied, ſelon *Marcgrave* & *Ray*, 5 doigts, & ſelon *Seba* & *Klein*, 4 ſeulement. Entre les deux grands boucliers ſont 3 bandes étroites, dont les écailles repréſentent des parallélogrames: celles qui couvrent les 2 grands boucliers ſont exagones. Les oreilles, qui ſont nues, ſont courtes & rondes. La queue, qui eſt applatie en deſſus & en deſſous, eſt très-courte, composée d'une ſeule articulation & couverte d'écailles exagones. On le trouve dans les *Indes Orientales*, au *Bréſil*, & dans la *Guiane*.

3. L'Armadille des Indes.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis quatuor. ... Armadillo Indicus.

Daſypus cingulis quatuor. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 3.*

Teſtudinatus porcellio, vel Teſtudinatus Echinus, Exoticum Animal. *Columm. aquat. p.* 15. *Fig. p.* 16. [*Fig. & deſcript. bonis*]. *Tegmen oſſeum tantùm deſcripſit & figuravit.*

De iſtâ ſpecie pauca dicam. Nunquam eam vidi, & *Columna* qui ſolus illius mentionem fecit, tegmen oſſeum tantùm deſcripſit & figuravit.

Je ne puis dire que très peu de choſes de cette eſpéce: je ne l'ai pas vûe, & *Columna* qui eſt le ſeul qui en ait parlé, n'en a décrit & figuré que le teſt. Mais

cela ſuffira pour la diſtinguer des autres eſpéces de ſon genre. Ce teſt eſt compoſé de 2 eſpéces de boucliers, dont le poſterieur eſt le plus grand, couverts d'écailles raboteuſes, exagones, pentagones, quarrées, & de quelques autres figures, entre leſquels ſont 4 bandes étroites, jointes enſemble par une peau membraneuſe.

Sed hoc ſufficit ad diſtinguendam iſtam ſpeciem ab aliis ejuſdem generis. Tegmen illud oſſeum duobus componitur ſcutis, quorum poſterius majus eſt, ſquamis exagonis, pentagonis, quadratis, aliiſque quibuſdam paucis figuris tectis illiſque ſquamis tuberculis exaſperatis; inter quæ ſcuta, 4 ſunt cingula, cute membranaceâ inter ſe connexa.

4. L'Armadille du Mexique.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis ſex.. ARMADILLO MEXICANUS.

Daſypus cingulis ſex. *Linn. Syſt. Nat. ed. 6. g. 12. ſp. 5.*
Tatu, ſive Armadillo prima Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 233. n°. 1.*
Tatu, ſeu Echinus Braſilianus. *Jonſt. Quadr. p.* 120.
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 478. *Fig. p.* 480.
Tatu, ſeu Armadillo. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 62.*
Cluſ. Exot. Fig. p. 330.
Muſ. Beſl. p. 40. *Fig. T. 11.*
Charlet. Exer. p. 18.
Tatu & Tatupeba Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 231.
Tatu, ſive Tatou. *Jo. de Laet. Fig. p.* 532.
Tatou. *Bell. obſ. Fig. p.* 204.
Armadillo Cluſii. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 158.
Ayotochtli, ſeu Daſypus cucurbitinus, ab aliis Tatou, vel Armadillo dictus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 314.* [a].
Les Eſpagnols l'appellent ARMADILLO. *Aldro. Hern. Marcg. Beſl.*
Les Portugais ENCUBERTO, *ou* ENCUBERTADO. *Aldr. Hern. Marcg. Beſl.*
Les Italiens, BARDATO. *Beſl. Aldr.*
Les Flamands, SCHILRVERKEN. *Beſl.*
Les Anglois, GREAT STRELL'D HEDGOG. *Beſl.*
Les Habitans de la Nouvelle Eſpagne, CHIRQUINCHUM. *Euſ. Nieremb. Beſl.*

(a) Toutes les figures qu'en ont donné ces Auteurs, excepté celle d'*Aldrovande*, repréſentent plus de 6 bandes entre les 2 grands boucliers; en quoi elles ſont mauvaiſes.

(a) Omnes illorum Authorum figuræ, exceptâ ſolâ *Aldrovandi* figurâ, pluſquam 6 cingula referunt; in quo peccant.

Pedes

Pedes ſinguli in 5 digitos, unguibus ſubrotundis munitos, diviſi ſunt; os acutum; oculi parvi; auriculæ nudæ, breves. Inter duo ſcuta 6 ſunt cingula ſquamis triangularibus tecta. Squamæ ſcuta tegentes irregulares & indeterminatæ. Cauda in exortu craſſa, ſenſim ad finem uſque gracilior fit, & in acutum deſinit. Habitat in *Braſiliâ*, & *Mexico*.

Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles arrondis; il a le muſeau pointu; les yeux petits; les oreilles nues & courtes. Entre ſes 2 grands boucliers ſont 6 bandes étroites, couvertes d'écailles triangulaires. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers ſont de figure irréguliere. La queue eſt groſſe à ſon origine; enſuite elle devient de plus en plus effilée, & ſe termine en pointe. On le trouve au *Bréſil*, & au *Mexique*.

5. L'Armadille du Bresil.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis octò... Armadillo Braſilianus.

Daſypus cingulis ſeptem. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 6.*
Tatu-été Braſilienſibus; Armadilli ſecunda ſpecies Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 233. n°. 2.*
Tatu-été Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. p. 231.*
Tatus Quadrupes peregrina. *Geſn. Icon. Quadr. fig. p. 103.* [*Fig. bona*]. [*a*]
Armadillo, ſeu Aiatochtli. *Jonſt. Quadr. p. 120. fig. T. 74.* [*Fig. bona*]. *Euſ. Nieremb. fig. p. 158.* [*Fig. bona*]. [*a*]
Tatus Major Moſchum redolens. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 163.*
Les Portugais l'appellent Verdadeiro. *Marcgr.*
Les Guianois, Tatou-Kabassou. *Barr.*

In pedibus anterioribus 4 digitos habet, 2 medios æquales, & lateralibus majores; in poſterioribus 5, quorum 3 medios æquales, lateralibus etiam majores. Caput

Il a 4 doigts aux pieds de devant; les 2 du milieu ſont égaux & plus grands que les latéraux; & 5 aux pieds de derriere; les 3 du milieu ſont auſſi égaux, & plus grands que les latéraux. Il

(*a*) Figuræ *Geſn.* & *Euſ. Nieremb.* pluſquam 8 cingula inter duo ſcuta referunt, in quo peccant.

(*a*) Les Figures de *Geſner*, & *d'Euſ. de Nieremb.* repréſentent plus de 8 bandes entre les 2 grands boucliers, en quoi elles péchent.

a la tête petite ; le muſeau pointu ; les oreilles longues & droites ; la queue longue & compoſée d'anneaux dans ſa partie antérieure, & enſuite ſe terminant en pointe. Entre les 2 grands boucliers ſont 8 bandes étroites, (9 jointures ſelon *Ray*, & *Marcgrave*) couvertes d'écailles joliment diſtribuées. On le trouve au *Bréſil* & dans la *Guiane*.

parvum eſt & acutum; auriculæ longæ & erectæ; cauda longa, in parte anteriore annulis compoſita, & deindè in acutum deſinens. Inter 2 ſcuta 8 ſunt cingula (9 juncturæ ſecundùm *Rajum* & *Marcgravium*) ſquamis ordine decenti diſpoſitis tecta. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

** 6. L'ARMADILLE DE CAYENNE.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis novem... ARMADILLO GUIANENSIS.

Daſypus cingulis novem. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 7.*
Tatu Porcinus : Tatu ſimpliciter : Porcellus Cataphractus : Armadillo communiter. *Klein. Quadr. p. 48.*
Tatou, ſeu Armodillo Americanus. *Seb. vol. 1. p. 45. fig. T. 29. f. 1.* [*Fig. optima*].
Armadillo. *Muſ. Worm. p. 335.*

Il a, depuis le bout du muſeau, juſqu'au bout de la queue, environ 2 pieds 10 pouces ; ſçavoir la tête 4 pouces ; le corps 1 ½ pied ; & la queue 1 pied ; il a aux pieds de devant 4 doigts, dont les 2 du milieu ſont égaux & plus grands que les latéraux ; à ceux de derriere 5 doigts, dont celui du milieu eſt le plus grand, les 2 qui le ſuivent un peu plus petits, & les 2 autres très petits : ſon muſeau eſt pointu ; ſes oreilles aſſez longues & couvertes de petites écailles. Sa queue, qui eſt aſſez groſſe à ſon origine,

Longitudo totius corporis, ab extremitate oris ad caudæ apicem, circiter 2 pedum & 10 pollicum; ſcilicet capitis 4 pollicum ; corporis 1 ½ pedis; & caudæ 1 pedis. Pedes anteriores in 4 digitos diviſi, quorum duo medii æquales ſunt, & lateralibus majores ; poſteriores in 5, quorum medius major, 2 ſequentes paulò minores, & 2 laterales minimi. Roſtrum acutum ; auriculæ ſat longæ, parvis ſquamis tectæ. Cauda, quæ in exortu craſſa eſt, & pau-

latim gracilior fit, in parte anteriore 10 aut 12 annulis cingitur, & deindè in acumen deſinit. Inter duo ſcuta 9 ſunt cingula ſquamis triangularibus tecta. Squamæ ſcuta tegentes ſunt ſubrotundæ & magnitudine inæquales. Habitat in *Americâ* : in *Guianiâ* frequens.

& qui diminue enſuite peu à peu, eſt compoſée dans ſa partie antérieure de 10 ou 12 anneaux, & enſuite ſe termine en pointe. Entre les 2 grands boucliers ſont 9 bandes étroites, couvertes d'écailles triangulaires. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers ſont preſque rondes & inégales en grandeur. On le trouve en *Amérique* & ſur-tout dans la *Guiane*.

** 7. L'Armadille d'Afrique.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis duodecim... Armadillo Africanus.

Daſypus tegmine tripartito. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 4.*
Tatu Caninus, capite pedibuſque anomalis : Tatu Apara : Armadillo Nothus. *Klein. Quadr. p. 49.*
Tatu, ſeu Armodilio Africanus. *Seb. vol. 1. p. 47. fig. T. 30. Mas, fig. 3. Fœmina, fig. 4.* [*Fig. bonis*].

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad initium caudæ, 10 circiter pollicum, cauda 7 pollicum. Singuli pedes in 5 digitos, magnis unguibus, tribus intermediis anterioribus maximis, munitos, ſunt diviſi. Auriculæ ſunt longæ, apice ſubrotundo. Inter duo ſcuta 12 ſunt ſtrictiora cingula, cute craſsâ & membranaceâ connexa, ſquamis parallelogramis tecta. Squamæ ſcuta tegentes, ſunt modò tetragonæ, modò pen-

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 10 pouces; ſa queue a 7 pouces de long. Chaque pied a 5 doigts armés d'ongles forts, les 3 du milieu des pieds de devant ſont les plus grands. Ses oreilles, qui ſont aſſez longues, ſont arrondies vers le bout. Entre les 2 grands boucliers ſont 12 bandes étroites, jointes enſemble par une peau épaiſſe & membraneuſe, & couvertes d'écailles parallélogrames. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers,

ſont tantôt à 4, tantôt à 5, tantôt à 6 côtés, mais toujours inégaux. On le trouve en *Afrique*.

tagonæ, modò exagonæ, lateribus ſemper inæqualibus. Habitat in *Africâ*.

ORDO III. ORDRE III.

QUADRUPEDA *LES QUADRUPEDES*

Dentibus inciſoribus nullis, caninis & molaribus preſentibus donata.

Qui n'ont point de dents inciſives, mais qui en ont des canines & des molaires.

IN hoc Ordine duo tantùm QUADRUPEDA continentur, *Elephas* ſcilicet & *Odobenus*, quod unumquodque genus ſuum conſtituit. Dentes canini alterius surſùm incurvantur, alterius verò deorsùm.

CET Ordre ne comprend que deux QUADRUPEDES, ſçavoir l'*Eléphant* & la *Vache-marine*, qui ſont chacun un genre particulier. L'un à ſes dents canines recourbées en enhaut, & l'autre les a recourbées en enbas.

V.

Genus Elephantis.

Hujus character eſt
Dentes inciſores nulli:

Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ ſuperiori affixi, longiſſimi, ſurſùm recurvi:

Proboſcis longiſſima flexibilis.

V.

Le genre de l'Elephant.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives:

D'avoir à la mâchoire ſupérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en enhaut:

Une trompe très longue & flexible.

* 1. L'ELEPHANT.

ELEPHAS.

Elephas. *Raj. Syn. Quadr. p. 131.*

Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 24. ſp. 1.
Klein. Quadr. p. 36.
Aldro. Quadr. ſolid. p. 418. Fig. p. 465. [Fig. malâ].
Geſn. Quadr. p. 409. Fig. p. 410. [Fig. mala].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 61. [Fig. mala].
Jonſt. Quadr. p. 17. Fig. T. 7. 8. 9. (Fig. bonis).
Euſ. Nieremb. p. 191.
Charlet. exerci. p. 4.
Elephas Africanus. *Seb. vol. 1. p. 175. Fœtus Fig. T. 111. f. 1. [Fig. bona].*
Elephant. *Kolbe. Tom. III. p. 9. Fig. p. 10.*
Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 101. Fig. T. 19. (Fig. bonne).
Les Grecs l'appellent Ελεφας.
Les Arabes, CENALFA. *Aldro.*
Les Ethiopiens, YTEMBO. *Aldro.*
Les Sabins, BARRUS. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, SION. *Aldro. Geſn.*
Les Eſpagnols, ELEPHANTE. *Geſn. Aldrov.*
Les Italiens, LEOPHANTE. *Geſn. Aldrov.*
Les Allemands, HELPHANT. *Geſn. Aldro.*
Les Flamands, ELÉPHANT. *Aldrov.*
Les Anglois, ELEPHANT. *Raj.*

La grandeur ſeule de l'Eléphant ſuffit pour le diſtinguer des autres QUADRUPEDES : c'eſt le plus grand de tous : il a juſqu'à 12 pieds de haut : mais les caracteres que nous avons établis le feront encore mieux connoître. Il n'a point de dents inciſives, mais il a à la mâchoire ſupérieure 2 dents canines, longues quelquefois de 5 ou 5 ½ pieds, recourbées en enhaut ; & en outre pluſieurs dents molaires à chaque mâchoire. Entre ſes 2 longues dents canines eſt une trompe plus longue encore & flexible, de laquelle il ſe ſert pour prendre ſa nourriture & la porter à ſa bouche. Cette trompe n'eſt autre choſe que le pro-

Elephas magnitudine, quâ ea antecellit, ab aliis QUADRUPEDIBUS ſatis abundè diſtinguitur. Omnium maximum eſt ; 12 pedum altitudinem attingit ; illius verò notæ caracteriſticæ à quibuſcumque, non ſpecie tantum, ſed & genere differre demonſtrant. Dentibus inciſoribus omninò caret, ſed maxillæ ſuperiori 2 ſunt dentes canini, 5 vel 5 ½ pedum interdum longi, ſursùm recurvi : plures in utrâque maxilla molares. 2 inter dentes longos caninos eſt proboſcis adhuc longior, flexibilis, quâ, velut manu, utitur ad cibos colligendos, & ori admoven-

dos. Proboſcis illa nihil aliud eſt quam naſus productus: auriculæ ampliſſimæ, circumcirca dentatæ, pendulæ: crura, pedeſque craſſi & rudes, *ungulatos* inter & *digitatos* anomali eſſe videntur: pedes enim 5 digitis donantur, quorum phalanges omnes diſſectione deteguntur, quæ verò aliter non apparent, cùm in carne fungoſâ, ſubſtantiâ quaſi corneâ omninò tecta, contineantur: ambitus enim pedum 5 ungulis obtuſis, inter ſe connexis cute ità induratâ, ut ad ſubſtantiæ corneæ naturam accedat, terminatur: plantæ pedum cute pariter induratâ, & quaſi corneâ teguntur. Cutis illa cùm unguibus ipſis ità cohæret, ut & ungues & cutis ſimul eripi poſſint, ſicut *Equi* ungula. Prætereà cutis illa indurata ipſa ſubſtantia cornea dici poſſet: ab ungulis enim non differt, niſi quod ipſis ſit mollior. Cutis corporis craſſa eſt, non prorſus nuda, ſed pilis rarioribus, craſſis & ſatis longis, obſita: cauda pilis quibuſdam etiam craſſis terminatur. Habitat in *Africâ*: in *Aſia* majores.

Vide *D. Georg. Chriſt. Petri ab Hartenfels*, Elephantographiam curioſam.

longement de ſon nez. Ses oreilles ſont grandes & larges, comme dentelées tout autour, & pendantes. Ses jambes & ſes pieds, qui ſont gros & malfaits, ſemblent tenir le milieu entre les *ongulés*, & les *digités*. Ses pieds ont réellement 5 doigts, dont on diſtingue bien toutes les phalanges par la diſſection, mais qui ſans elle ne ſont point viſibles, & qui ſont renfermées dans une chair fongueuſe, laquelle eſt comme entiérement couverte de corne; car la circonférence des pieds eſt terminée par 5 ongles obtus, joints enſemble par une peau tellement endurcie, qu'elle approche de la nature de la corne. La plante des pieds eſt couverte d'une peau ſemblable, & le tout peut être arraché enſemble, comme le ſabot d'un *Cheval*. On pourroit même regarder cette peau endurcie, comme de la corne; car elle ne différe des ongles, qu'en ce qu'elle eſt un peu plus molle qu'eux. Sa peau, qui eſt fort épaiſſe, n'eſt pas tout a fait nue; on y trouve quelques poils gros & aſſez longs, ainſi qu'au bout de la queue. On le trouve en *Afrique*; les plus grands ſont en *Aſie*.

VI. Le genre de la Vache-marine.

Son caractere eſt

De n'avoir point de dents inciſives :

D'avoir à la mâchoire ſupérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en enbas :

Point de trompe.

VI. Genus Odobeni.

Hujus caracter eſt

Dentes inciſores nulli ;

Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ ſuperiori affixi, longiſſimi, deorſùm incurvi :

Proboſcis nulla.

* 1. La Vache-Marine.

Odobenus.

Phoca dentibus exſertis. Odobenus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 9. ſp. 2.*

Equus Marinus & Hippopotamus falsò dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 191.*

Roſmarus. *Klein. Quadr. p. 92. N° III.*

Geſn. Piſc. p. 249. fig. p. 250. (Fig. mala. Peccat in pedibus).

Jonſt. Piſc. p. 160. fig. T. 44, ſub iſto nomine. Roſmarus vetus. [*Fig. bona*].

Vache - Marine. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. T. II. p. 159. fig. p. 168.* [*Fig. bonne*].

Les Danois & Iſlandois l'appellent Rosmarus. *Raj.*

Les Ruſſiens, Morss. *Raj. Klein. Hiſt. d'Iſl.*

Les Hollandois, Walros, Walrus. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*

Les Flamands, Walrus. *Raj.*

Les Anglois, Morse, *ou* Sea-horse. *Raj.* Sea-Kow. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*

Les Angle-Saxons, Hors-Hwal. *Hiſt. d'Iſl. Klein.*

Les François des Côtes de l'Amérique, Vache - Marine, *ou* Beste a la grande dent. *Hiſt. d'Iſl. Klein.*

Cet Animal eſt très grand : il a quelquefois juſqu'à 16 pieds de long, & environ 8 de tour. Il a 4 pieds courts, à chacun deſquels ſont 5 doigts, armés d'ongles, & joints enſemble par la peau. Les poſtérieurs ſont tout-à-fait tournés en arriere, & ſemblent n'être autre choſe

Monſtroſum eſt hoc Animal. Longitudo corporis 16 pedes plerumque attendit ; ambitus verò circiter 8. 4 habet pedes breves, in quibus ſingulis ſunt 5 digiti, unguibus muniti, cute inter ſe connexi. Pedes poſteriores retrorsùm omninò ſpectant,

tant, & nihil aliud, quàm ipſius cauda, apparent. Caput craſſum & in anteriore parte planum: rictus validiſſimis ſetis obſitus eſt. Dentibus inciſoribus omninò caret; in maxillâ verò ſuperiore duobus dentibus caninis, 2 pedum circiter longis, deorſùm incurvis, & in utrâque maxillâ 8 molaribus, 4 utrinque, donatur. Auricularum externarum loco, habet utrinque foramina quibus audit; cutis, quæ pollicis ferè craſſitiem attingit, pilis brevibus, rigidis, ex fuſco ſordidè flavis, tegitur. Habitat in *Regionibus Septentrionalibus.*

que ſa queue. Sa tête eſt groſſe & écraſée ſur le devant. Son muſeau eſt entouré de gros poils roides : il n'a point de dents inciſives ; mais il en a à la mâchoire ſupérieure 2 canines, longues d'environ 2 pieds, recourbées en enbas ; & en outre à chaque mâchoire 8 molaires, 4 de chaque côté : il n'a point d'oreilles extérieures, mais à chaque côté de la tête eſt un trou, par leſquels il entend. Sa peau a près d'un pouce d'épaiſſeur, & eſt couverte d'un poil court & roide, d'un brun jaunâtre. On le trouve dans tout le *Nord.*

2. LE LAMANTIN.

MANATUS.

Manatus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 96. ſp.* 1.
Klein. Quadr. p. 94. *N°. V.*
Manati. *Geſn. Piſc. p.* 253.
Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 323.
Manati, ſeu Vacca-Marina. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 193.
Sloane. Vol. II. p. 329.
Manati Indorum. *Aldro. Piſc. p.* 728. *fig. p.* 729.
Jonſt. Piſc. p. 257.
Manati Phocæ Genus. *Cluſ. exot. p.* 132. *fig. p.* 133.
Trichechus. *Art. Gen. Piſc. g.* 51. *ſp.* 1.
Art. Synon. Piſc. g. 51. *ſp.* 1.
Bœuf-Marin. *Hiſt. de l'Acad. T. III. Part.* 1. *p.* 191.
Les Eſpagnols l'appellent MANATI. *Klein. Art. Raj.*
Les Portugais, PEZZE MOULLER, *ou* MUGER. *Art.*
Les Flamands, SEEKOEGEN. *Art.*
Les Anglois, MANATEE. *Art.*
Les Habitans d'Amboine, DUJUNG, *ou* DOUJONG. *Art.*
Les Habitans des bords de la Riviere des Amazones, PEGE-BUEY. *Art.*

Je n'ai jamais vû le LAMANTIN : je ne ſcais de quel genre il eſt ; car aucun Auteur n'a fait mention de ſes dents. Je le place ici, juſqu'à ce que je ſois plus inſtruit de ſon vrai caractere. Voilà la deſcription qu'en donne le *P. Labat*, dans ſon *voy. aux Iſles de l'Amerique*, *Tome II. p. 201*, où il dit l'avoir vû. » Il avoit 14 pieds 9 pouces de « longueur, depuis le bout du « muffle juſqu'à la naiſſance de « la queue ; il étoit tout rond « juſqu'à cet endroit-là. Sa tête « étoit groſſe, ſa gueule large « avec de grandes babines, & « quelques poils longs & rudes « audeſſus. Ses yeux étoient « très petits par rapport à la tête, « & ſes oreilles ne paroiſſoient « que comme deux petits trous. « Le col eſt fort gros & fort « court..... Les deux nageoires « qu'il a un peu audeſſous du « col, ... reſſemblent aſſez « aux pattes de la Tortue..... Le « Lamantin femelle a deux ma-« melles rondes ; celles du La-« mantin que j'ai meſuré avoient « 7 pouces de diamétre ſur 4 « pouces ou environ d'éléva-« tion..... Ce Poiſſon, qui eſt « tout rond, depuis la tête juſ-« qu'à la naiſſance de la queue, « avoit 8 pieds 2 pouces de cir-« conference. Sa queue étoit de « 19 pouces de long, depuis ſa « naiſſance, juſqu'à ſon extrêmi-

MANATUM nunquam vidi: cujus ſit generis prorsùs ignoro ; Authores enim nulli de illius dentibus locuti ſunt. Poſt *Odobenum* eum repono, uſquedum ampliorem illius cognitionem habeamus. *P. Labat*, in ſuo opere cui Titulus ; *voy. aux Iſles de l'Amérique. Tome II. p. 201*, hoc Animal vidiſſe refert ; ſicque id deſcribit. » Ab extremita-« te roſtri ad caudæ exortum « 14 pedes & 9 pollices lon-« gitudine æquabat. Corpore « erat tereti uſque ad cau-« dam. Caput erat craſſum, « oris rictus latus, labiis craſ-« ſis donatus, quæ labia pilis « quibuſdam longis & rigidis « adornabantur. Oculos ha-« bebat valdè exiguos pro ra-« tione capitis, & auricula-« rum loco duo erant exigua « foramina. Collum valdè « craſſum eſt & breve..... Pin-« næ duæ, paulò infra collum « ſitæ, ... teſtudinis pedes « æmulantur..... Fœmina « duas habet mammas rotun-« das ; diameter earum, quas « menſuravi, 7 pollices æqua-« bat ; craſſities verò 4 aut « circiter pollices... Ambitus « corporis illius Piſcis, qui à « capite ad caudæ exortum « teres eſt, octo pedes & 2 « pollices attingebat. Cauda « ab exortu ad extremitatem

« 19 pollices longa erat; quâ « parte latiſſima, 15 circiter « pollices attingebat: & verſùs extremum craſſities 3 « circiter pollices æquabat..... « Cutis hujus Piſcis corii Bovini duplicem ferè craſſitiem « in dorſo æquat; in ventre « verò multò minus craſſa. « Rugoſa eſt, coloris ex cinereo fuſci, pilis ejuſdem coloris, raris, craſſis, ſatque « longis obſita.

Secundùm Authores omnes duobus tantùm pedibus *Manatus* præditus eſt: attamen tantam habet cum *Quadrupedibus* analogiam, ut ad eorum Claſſem eum pertinere puto; veriſimile enim videtur pedes poſteriores cum cauda connecti, eoſque diſſectione poſſe detegi.

« té; elle avoit environ 15 pouces dans ſa plus grande largeur: ſon épaiſſeur tout au bout « étoit d'environ 3 pouces.... La « peau de ce Poiſſon eſt épaiſſe « ſur le dos, preſque comme « deux cuirs de Bœuf, mais elle « eſt beaucoup plus mince ſous « le ventre. Elle eſt de couleur « d'ardoiſe brune, d'un gros « grain & rude, avec des poils « de même couleur, clairs ſemés, gros, & aſſez longs.

Quoique tous les Auteurs n'accordent que deux pieds à cet Animal, il a tant d'analogie avec les *Quadrupedes*, que je crois qu'il appartient à leur Claſſe: & il y a toute apparence que les pieds de derriere ſont confondus dans la queue, & qu'on les découvriroit par la diſſection.

ORDRE IV.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & qui en ont ſix à l'inférieure.

TOUS les QUADRUPEDES de cet Ordre, comme ceux de l'Ordre ſuivant, ſont ruminants ; ils ont, comme eux, quatre ventricules, mais ils n'ont point de cornes : leurs pieds ſont fendus en deux doigts *onguiculés*, & non pas *ongulés*, comme ceux des *pieds fourchus*. La plante de leurs pieds eſt couverte d'une peau molle & un peu calleuſe. Cet Ordre ne contient qu'un ſeul genre, qui eſt celui des *Chameaux*.

ORDO IV.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore nullis, in inferiore ſex donata.

OMNIA hujus Ordinis QUADRUPEDA, ſicut & ſequentis, ſunt ruminantia. Quatuor ventriculos habent ; non verò ſunt cornigera. Pedes habent in duos digitos, non quidem *ungulatos*, ſicut *biſulca*, ſed tantùm *unguiculatos*, fiſſos. Plantæ pedum cute molli & parumper callosâ teguntur. In hoc Ordine unicum eſt genus, ſcilicet *Camelinum*.

VII.

Le genre du Chameau.

Son caractere eſt

De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir ſix à l'inférieure :

D'avoir à chaque pied deux doigts onguiculés.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce genre ont le col très long.

VII.

Genus Camelinum.

Hujus character eſt

Dentes inciſorii in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore, ſex :

In ſingulis pedibus digiti duo unguiculati.

Obſ Omnia hujus generis QUADRUPEDA collo longiſſimo donantur.

** 1. LE CHAMEAU.

Camelus duobus in dorſo tuberibus..... CAMELUS.

Camelus duobus in dorſo tuberibus, ſeu Bactrianus. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 145. *no.* 2.
Camelus tophis dorſi duobus. Bactrianus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 29. *ſp.* 2.
Camelus, Beſchet, Bactrianus fortiſſimus. *Klein. Quadr. p.* 41.
Camelus vel Camelus Bactriana. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 22. (*Fig. bona*).
Camelus. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 889. *Fig. p.* 907. (*Fig. mala*).
Geſn. Quadr. p. 162. *Fig. p.* 163. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 67. *Fig. T.* 43. *ſub iſto nomine.* Camelus Bactrianus, ſeu Dromedarius. (*Fig. bon.*).
Charlet. Exer. p. 12.
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. *p.* 223. *Fig. T.* 13. (*Fig. bona*).
Les Hébreux l'appellent GAMAL. *Geſn.*
Les Chaldéens, GAMELA. *Geſn.*
Les Arabes, GEMAL. *Geſn.*
Les Grecs, Καμηλος.
Les Sarraſins, SHYMEL. *Geſn.*
Les Perſes, SCHETOR. *Geſn.*
Les Illyriens, VUELBLUD. *Geſn.*
Les Eſpagnols, & les Italiens, CAMELLO. *Geſn.*
Les Allemands, KÆMELTHIER. *Geſn.*
Les Anglois, CAMEL. *Raj. Geſn.*

A vertice ad caudam, 8 circiter pedes longus eſt. Caput, ab extremitate labii ſuperioris ad occipitium, 23 pollices longum: auriculæ 4 pollices; cauda 2 pedes longa. 2 habet in dorſo tubera, quorum poſterius anteriori multò majus eſt. A parte ſuperiore majoris iſtius tuberis ad terram uſque, 7 pedum altus eſt. Labium ſuperius ut in *lepore* fiſſum: pili ipſius longiſſimi ſunt in tuberibus, in dorſo, ſuprà caput, & ad collum;

Il a, depuis le ſommet de la tête, juſqu'à la queue, environ 8 pieds. Sa tête a, depuis l'extrêmité de la lévre ſupérieure, juſqu'à l'occiput, 23 pouces; les oreilles 4 pouces; la queue 2 pieds de long. Il a ſur le dos 2 boſſes, dont la poſtérieure eſt beaucoup plus conſidérable que l'antérieure. Depuis la partie ſupérieure de cette groſſe boſſe juſqu'à terre, il a 7 pieds de haut. Sa lévre ſupérieure eſt fendue, comme celle d'un *liévre*: il a des poils très longs ſur

ſes boſſes, ſur le dos, ſur la tête, & au col: le reſte du corps eſt couvert de poils courts. Ses pieds ſont fendus en deſſus ſeulement, & terminés par deux petits ongles. La plante des pieds eſt large, plate, très charnue, & couverte d'une peau molle, épaiſſe, & un peu calleuſe. Il a 6 callosités aux jointures des jambes, ſçavoir 2 à chacune des jambes de devant; la premiere & la plus haute étant en arriere à la jointure qui fait proprement le coude, & la deuxiéme endevant & plus bas à la jointure qui représente le pli du poignet. Chaque jambe de derriere en a auſſi une à la premiere & plus haute jointure, qui eſt celle de devant & le véritable genou: outre ces 6 callosités, il en a une ſeptieme beaucoup plus conſidérable placée au-bas de la poitrine, fermement attachée au ſternon. Le prépuce eſt fort long & regarde en arriere. Il n'a point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure; il en a 6 à l'inférieure, & 3 dents canines de grandeur inégale de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, & 2 à peu près ſemblables de chaque côté à la mâchoire inférieure. Le nombre des dents molaires varie. On le trouve dans la *partie orientale* de l'*Aſie*.

in reliquo corpore breves. Pedes in parte ſuperiore tantùm ſunt fiſſi, ſinguli duobus parvis unguibus in extremo donati: planta pedum lata, plana, admodum carnoſa, cute molli, craſſâ, & parumper callosâ, tegitur. Articulorum crurum calli 6 ſunt numero; nimirùm ad ſingulos crurum anteriorum articulos ſinguli; prior & ſuperior retrorsùm ad partem *cubitum* propriè dictam; alter & inférior antorsùm ad partem quæ carpo humano reſpondet. In ſingulis poſterioribus cruribus unus etiam eſt callus ad primum & ſupremum articulum, qui antrorsùm flectitur, & verum genu eſt. Præter prædictos, ſeptimus eſt callus, aliis multò major, ad imum thoracem, ſterno firmiter adnexus. Preputium longiſſimum eſt & retrò verſum. Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore nullis, in inferiore 6 donatur, & præthereà dentibus caninis magnitudine inæqualibus 3 utrinque in maxillâ ſuperiore, & 2 ſimilibus utrinque in maxillâ inferiore. Dentium molarium variat numerus. Habitat in *partibus Aſiæ orientalibus*.

** 2. Le Dromadaire.

Camelus unico in dorſo tubere..... Dromedarius.

Camelus unico in dorſo gibbo, ſeu Dromedarius. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 145. *n°.* 1.
Camelus topho dorſi unico. Dromedarius. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. g. 29. *ſp.* 1.
Camelus minimus. Dromedarius. *Klein. Quadr. p.* 42.
Camelus Arabica, vel Camelus Dromas. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 23. (*Fig. bona*).
Camelus Dromas. *Geſn. Quadr. p.* 171. *Fig. p.* 172. (*Fig. bona*).
Dromas. *Proſp. Alp. Ægypt. p.* 223. *Fig. T.* 12. (*Fig. bona, exceptis pedibus qui ungulati apparent*).
Dromedarius. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 909. *Fig. p.* 908. (*Fig. mala*).
Jonſt. Quadr. p. 69. *Fig. T.* 43. *ſub iſto nomine* Camelus (*Fig. bona, exceptis pedibus qui ungulati apparent*).
Charlet. Exer. p. 15.
Chameau. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 1. *p.* 71. *Fig. Pl.* 7. (*Fig. très bone*).
Les Chaldéens l'appellent Hogenain. *Geſn.*
Les Grecs, Δρομας.
Les Ethiopiens, Raguahil, *ou* Ebamari. *Klein.*
Les Maures, Egin. *Proſp. Alp.*
Les Italiens, Dromedario. *Geſn.*
Les Allemands, Dromedary. *Geſn.*
Les Anglois, Camel, *ou* Dromedary. *Raj.*

A precedente differt magnitudine, quâ ei cedit, & numero tuberum, quod ei unicum eſt in dorſo. In aliis precedenti ſimilis eſt. Sicut ille, labium habet ſuperius fiſſum; pili ipſius longiores in tubere & ad collum ſiti ſunt. Pedes pedibus precedentis ſimiles habet, eoſdemque in cruribus & thorace callos. Habitat in *partibus Aſiæ occidentalibus*; in *Syriâ* & *Arabiâ frequens*.

Il eſt plus petit que le précédent. Il en différe auſſi, parce qu'il n'a qu'une ſeule boſſe ſur le dos. D'ailleurs il lui reſſemble aſſez : il a, comme lui, la levre ſupérieure fendue ; ſes plus longs poils ſont ſur ſa boſſe & au col. Ses pieds ſont conformés de même que ceux du précédent ; il a aux jambes & à la poitrine les mêmes calloſités. On le trouve le plus communément aux *parties Occidentales de l'Aſie*, ſçavoir dans la *Syrie* & l'*Arabie*.

3. Le Chameau du Perou.

Camelus pilis breviſſimis veſtitus..... Camelus Peruanus.

Camelus Peruanus Glama dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 145. *n°.* 3.
Camelus dorſo levi, pectore gibboſo. Glama. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 29. *ſp.* 3.
Camelus ſpurius Peruanus, Glama dictus. *Klein. Quadr. p.* 42.
Ovis Peruana. *Jonſt. Quadr. p.* 45. *Fig. T.* 46. (*Fig. bona*).
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 243. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 9.
Pelon Ichiatl Oquitli. Ovis Peruana. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 660. [*Fig. malâ*].
Pervichcatl. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 11.
Les François l'appellent Mouton de Perou.
Les Eſpagnols du Perou, Glama, *ou* Lhama. *Raj.*

Il a depuis le ſommet de la tête, juſqu'à la queue, 6 pieds; depuis la partie ſupérieure du dos, juſqu'à la plante des pieds, 4 pieds: le col long de 2 pieds depuis les épaules juſqu'au ſommet de la tête; les oreilles aſſez longues; la tête allongée; la levre ſupérieure fendue; les yeux aſſez grands; le ventre large; le derriere plus élevé que le devant. Audeſſous de la poitrine eſt un eſpece de tumeur ſemblable à un abſcès de laquelle il ſemble qu'il découle continuellement un peu de pus. Les individus de cette eſpéce varient en couleur comme nos brebis: les

Longitudo corporis à cervice ad caudam 6 pedum eſt: altitudo à dorſo ad pedis plantam, 4 tantùm; colli longitudo, à ſcapulis ad cervicem, 2 pedum. Auriculæ longæ; caput oblongum; labium ſuperius fiſſum; oculi ſat magni; cauda brevis; venter latus; clunes anteriore parte alteriores. Sub pectore, ubi thorax ventri connectitur, eſt tuber vomicæ ſimilis, è quò aliquid excrementi ſenſim manare videtur. Colore variat hæc ſpecies, ſicut oves noſtræ. Modò eſt alba, modò nigra,

gra, modó fuſca, modò ex his coloribus variegata: hæc ultima ab incolis *Moromoro* (*a*) vocatur. Habitat in *Peruvio*.

uns ſont blancs, d'autres noirs, d'autres bruns, & d'autres variés de toutes ces couleurs: les Habitans du pays appellent ces derniers *Moromoro* (*a*). On le trouve au *Perou*.

4. La Vigogne.

Camelus pilis prolixis toto corpore veſtitus.

Camelus ſeu Camelo congener Peruvianum, lanigerum, *Pacos* dictum: Ovis Indica, ſeu Peruviana vulgò. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 147.
Camelus gibbis nullis. Pacos. *Linn. ſyſt nat. ed. 6. g.* 29. *ſp.* 4.
Camelus laniger, Peruanus; Pacos; vulgò Ovis Peruviana. *Klein. Quadr. p.* 42.
Ovis Chilenſis. *Jonſt. Quadr. p.* 46. *Fig. T.* 23. *ſub illo nomine*, Vervex alius peregrinus. (*Fig. bona, exceptis pedibus anticis, qui in quatuor digitos diviſi ſunt, cum in duos tantùm dividi debeant*).
Charlet. Exer. p. 9.
Ovis Peruana, Paco dicta. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 244. (*Fig. Bona*). *Peccat tamen in pedibus anticis, ſicut Jonſtoni figura.*
Ovis Peruanæ alia ſpecies ab incolis *Pacos* dicta. *Hernand. Hiſt. Mex. p.* 663.

Precedente minor eſt; caput & auriculas, ſervatâ corporis proportione, multò minores habet. Clunes anteriore parte non ſunt altiores. Totum corpus pilis longiſſimis & molliſſimis tegitur. Colore variat hæc ſpecies, ſicut præcedens: modò eſt nigra, modò alba, modò ſubruffa, modò

Elle eſt plus petite que le précédent: elle a la tête & les oreilles beaucoup plus petites à proportion de la grandeur du corps. Son derriere n'eſt pas plus élevé que le devant; tout ſon corps eſt couvert de poils très longs & très fins: elle varie en couleur, comme le précédent. Il y en a de noires, d'autres blanches, d'au-

(*a*) Vide Euſ. de Nieremb. p. 182. *Moromoro* in eâ figuratur.

(*a*) Euſ. Nieremb. p. 182, a donné la figure du *Moromoro*.

tres rouſsâtres, & d'autres variées de toutes ces couleurs. On la trouve au *Perou*, dans le *Chili*, & dans la *nouvelle Eſpagne*.

ex his coloribus variegata. Habitat in *Peruvio*, in *Chile*, & in *novâ Hiſpaniâ*.

ORDO V.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore nullis, in inferiore octo, & pede biſulco donata.

IN hoc Ordine continentur omnia QUADRUPEDA ruminantia, biſulca; quæ, ſicut QUADRUPEDA præcedentis Ordinis, quatuor ventriculis prædita ſunt. In tres Sectiones dividuntur. Prima continet ea quorum cornua ſunt ſimplicia, ut *Hircus*, *Aries*, &c. Secunda ea quæ cornibus ramoſis donantur, ſicut *Cervus*. Tertia verò ea quæ non ſunt cornigera, ſicut *Tragulus*.

ORDRE V.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & qui en ont huit à l'inférieure, & le pied fourchu.

DANS cet Ordre ſont compris tous les QUADRUPEDES ruminants à pied fourchu: ils ont, comme ceux de l'Ordre précédent, quatre ventricules. Ils ſe diviſent en trois Sections. Dans la premiere ſont ceux qui ont des cornes ſimples, comme le *Bouc*, le *Belier*, &c. Dans la ſeconde ſont ceux qui ont des cornes branchues, comme le *Cerf*; & dans la troiſiéme ceux qui n'ont point de cornes, comme le *Chevrotain*.

SECTIO I.

Ea quorum cornua ſunt ſimplicia.

HUJUS Sectionis QUADRUPEDA in quatuor Genera dividuntur. Alia ſunt cornibus ſursùm verſis, inter

SECTION I.

Ceux qui ont des cornes ſimples.

LES QUADRUPEDES de cette Section ſe diviſent en quatre Genres. Les uns ont les cornes tournées en enhaut: & ceux-

là ou ont les cuiſſes de devant beaucoup plus longues que celles de derriere, comme la *Giraffe*, ou les ont à peu près d'égale longueur, comme *le Bouc*, *le Chamois*, &c. D'autres ont les cornes tournées vers le derriere, comme *le Bellier*; d'autres enfin les ont tournées vers les côtés, comme *le Bœuf*. Ces différentes directions de cornes ſerviront à diſtinguer ces Genres les uns des autres.

quæ alia femoribus anticis longiſſimis donantur, ut *Giraffa*, ſeu *Camelopardalis*; alia femoribus æqualibus, ut *Hircus*, *Rupicapra*, &c. Alia ſunt cornibus retrorsùm verſis, ſicut *Aries*; alia tandem cornibus ad latera verſis, ut *Bos*. Diverſis illis cornuum directionibus Genera iſta ſatis abundè à ſe invicem differunt.

Obſ. 1°. Lorſque je dis que les cornes ſont tournées en enhaut, vers le derriere, ou vers les côtés, je ne veux parler que de l'origine de la corne; c'eſt-à-dire, que la partie par laquelle elle tient à la tête, ſe dirige vers le haut, ou le derriere, ou les côtés: toutes les autres courbures ſont comptées pour rien, parcequ'elles varient très ſouvent.

Obſ. 2°. Toutes les femelles de cette Section portent des cornes, ainſi que leurs mâles.

Obſ. 1°. Cum dicuntur cornua ſursùm, retrorsùm, aut ad latera verſa, de ipſorum origine tantummodò loquitur; id eſt, pars cornuum quâ capiti adhærent; ſursùm, retrorsùm, aut ad latera vertitur. Ad alios autem cornuum inflexus nullo modo attendi debet, quia ſæpiſſimè variant.

Obſ. 2°. Omnes hujus Sectionis fœminæ ſunt cornigeræ, ſicut & mares.

VIII.

Le Genre de la Giraffe.

Son caractère eſt

De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure; d'en avoir huit à l'inférieure:

D'avoir le pied fourchu:

Des cornes ſimples,

Tournées en enhaut:

Les cuiſſes de devant beaucoup plus longues que celles de derriere.

VIII.

Genus Giraffæ.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo:

Pes biſulcus:

Cornua ſimplicia;

Sursùm verſa:

Femora anteriora poſterioribus multò longiora.

1. La Giraffe.

Giraffa. Camelopardalis.

Cervus cornibus ſimpliciſſimis; pedibus anticis longiſſimis. Camelopardalis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 31. ſp. 1.*
Tragus biſulcorum mixtus: Giraffa; Camelopardalis. *Klein. Quadr. p. 22.*
Camelopardalis, Giraffa recentioribus dicta. *Raj. ſyn. Quadr. p. 90.*
Camelopardalis. *Aldrov. Quadr. Biſ. p. 927. Fig. p. 931. [Fig. ſat bona].*
Geſn. Quadr. Fig. p. 160. (Fig. ſat bona).
Geſn. Icon. Quadr. p. 41. Fig. p. 42. (Fig. ſat bona).
Jonſt. Quadr. p. 69. Fig. T. 39 & 45. (Fig. ſat bonis). & T. 40. ſub illo nomine, Camelus Indicus. (*Fig. ſat bona, ſi maculas præberet*).
Proſp. Alp. Ægypt. p. 236. Fig. T. 14. f. 4. (Fig. ſat bona).
Camelopardalus. *Charlet. Exer. p. 13.*
Gyraffa quam Arabes *Zurnapa*, Græci & Latini *Camelopardalin* nominant. *Bell. Obſ. p. 118. Fig. p. 119. (Fig. ſat bona).*
Graffa. *Euſ. Nieremb. p. 191.*
Les Hébreux l'appellent ZAMER. *Geſn.*
Les Chaldéens, DEBA: *Geſn.*
Les Arabes, ZURNAPA. *Raj. Bell. Proſp. Alp.* SERAPHAH. *Geſn.*
Les Perſes, SERAPHAH, GIRNAFFA. *Geſn.*
Les Ethiopiens, NABIN *Geſn. Klein.* NABUDA. *Jonſt. Klein.*
Les Allemands, GIRAFF. *Geſn.*

Longitudo corporis, à vertice ad caudam, 18 pedum eſt. Collum 7 pedum longum. Ad 16 pedes caput à terrâ efferre poteſt: femora (non verò crura) anteriora poſterioribus multò longiora ſunt: quare non niſi latè diductis cruribus anterioribus, cibum ex terrâ capere poteſt. Duo cornicula ex fronte eminent circiter 6 digitorum longitudine, ad apicem parumper incurva. Auriculæ ſat magnæ ſunt. A capitis vertice ad dorſum, jubam habet ut

Elle a depuis le ſommet de la la tête juſqu'à la queue, 18 pieds. Son col eſt long de 7 pieds: elle peut élever la tête à 16 pieds de haut: ſes cuiſſes (& non pas les jambes) de devant ſont beaucoup plus longues que celles de derriere: ce qui fait qu'elle ne peut prendre ſa nourriture par terre, à moins qu'elle n'écarte beaucoup les jambes de devant l'une de l'autre. Elle a 2 petites cornes, longues d'environ 6 doigts, un peu courbées vers le bout; les oreilles aſſez grandes; une criniere comme un *Cheval*, de-

puis le ſommet de la tête juſqu'au dos. (Il y en a qui n'ont point de criniere, c'eſt peut-être ce qui diſtingue les ſéxes.) Sa queue eſt courte & menue, & terminée par un bouquet de poils. Tout ſon corps eſt marqué de taches, dont les unes ſont rondes, & les autres quarrées. On la trouve en *Afrique*, & ſur tout en *Ethiopie*.

Equus. (Sunt qui jubâ carent, per quod fortè ſexus diſtinguntur.) Cauda tenuis eſt & exigua, in acumine piloſa. Totum corpus maculis conſpergitur, non quidem omnibus rotundis, ſed aut obquadratis, aut rotundis. Habitat in *Africâ*, & præſertim *Æthiopiâ*.

I X.

Le Genre du Bouc.

Son caractere eſt

De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :

D'avoir le pied fourchu :

Les cornes ſimples,

Tournées en enhaut :

Les cuiſſes de devant égales en longueur à celles de derriere.

I X.

Genus Hircinum.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo :

Pes biſulcus :

Cornua ſimplicia,

Sursùm verſa :

Femora anteriora poſterioribus longitudine æqualia.

** 1. Le Bouc, la Chevre Domestique.

Hircus cornibus interiùs cultratis, exteriùs rotundatis, infrà carinatis, arcuatis... Hircus et Capra Domestica.

Capra cornibus carinatis, arcuatis. Caper. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 1.*
Faun: Suec. Linn. no. 42.
Capra Domeſtica. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 77. *n°.* 1.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Capra. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 270. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 17. (*Fig. bona*).
Hircus. *Geſn. Quadr. p.* 301. *Fig. p.* 302. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 16. (*Fig. bona*).
Capra & Hircus. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 619. *Fig. p.* 635. [*Fig. ſat bona*].
Capra & Hircus Domeſticus. *Jonſt. Quadr. p.* 46. *Fig. T.* 26. *&* 27. [*Fig. bonis*].

Caper. Capra. *Rzac. Hiſt. nat. pol. p.* 239.
Rzac. Auct. p. 331.
Hircus Domeſticus. *Charlet. Exer. p.* 9.
Tragus Domeſticus. Hircus, Capra, Caper ſi caſtratus. *Klein. Quadr. p.* 15.
Hœdus. *Geſn. Quadr. p.* 314.
Chévre privée ou Domeſtique. *Kolbe. Tom. III. p.* 35.
Les François appellent le mâle Bouc; *la femelle*, Chevre; *le jeune*, Chevreau.
Les Latins, le mâle, Hircus; *lorſqu'il eſt châtré*, Caper; *la femelle*, Capra; *le jeune*, Hædus.
Les Chaldéens, le mâle, Ize; *la femelle*, Eza. *Geſn.*
Les Grecs, le mâle, Τράγος; *la femelle*, Αἴξ.
Les Arabes, le mâle, Maez; *la femelle*, Schaah. *Geſn.*
Les Sarraſins, Anse. *Geſn.*
Les Perſes, le mâle, Busan; *la femelle*, Buz. *Geſn.*
Les Eſpagnols, le mâle, Cabron; *la femelle*, Cabra; *le jeune*, Cabrito. *Geſn.*
Les Italiens, le mâle, Beccho; *la femelle*, Cabra; *le jeune*, Cavretto. *Geſn.*
Les Allemands, le mâle, Bock; *la femelle*, Geisz; *le jeune*, Gitse *ou* Titslein. *Geſn.*
Les Illyriens, le mâle, Kozel; *la femelle*, Koza. *Geſn.*
Les Polonois, Koziel. *Rzac.*
Les Suédois, Get. *Linn.*
Les Anglois, le mâle, Gote-Bucke; *la femelle*, Goat; *le jeune*, Kydd. *Raj. Geſn.*

Capra animal eſt ita notum ut deſcriptione non indigeat. Obſervabo tantùm cornua eſſe interiùs cultrata, exteriùs rotundata, infrà carinata, arcuata; barbam, ſive aruncum ex mento dependere, & Hircum odorem gravem ſpirare. Habitat domeſtica in omnibus ferè locis cultis, & fera in montibus.

La Chevre eſt un animal trop connu, pour qu'il ſoit néceſſaire d'en faire la deſcription. J'obſerverai ſeulement que ſes cornes ſont tranchantes à leur côté intérieur, arrondies à l'extérieur, concaves endeſſous, & un peu courbées en arc: elle a une barbe aſſez longue qui lui pend ſous le menton. Le mâle répand une odeur forte. On la trouve domeſtique dans preſque tous les lieux habités, & ſauvage ſur les montagnes.

* 2. La Chevre d'Angora.

Hircus pilis longiſſimis criſpis toto corpore veſtitus... Capra Angorensis.

Chevre d'Angora. *Voy. du Lev. Tom. II. Fig. p.* 465. (*Fig. très bonne*).

Elle differe de la *Chevre domeſtique* par la beauté de ſon poil, qui a 8 ou 9 pouces de long, qui eſt d'une blancheur ébllouiſſante, fin & doux comme de la ſoye, & naturellement friſé. On la trouve à *Angora*.

A *Caprâ domeſticâ* differt pilis 8 aut 9 pollices longis, candidiſſimis, ſplendentibus, ſericei modo molliſſimis & tenuiſſimis, criſpis. Habitat in *Angorâ*.

* 3. Le Bouc-Estain.

Hircus cornibus ſuprà nodoſis, infrà rotundatis, in dorſum reclinatis... Ibex.

Capra cornibus nodoſis in dorſum reclinatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 32. *ſp.* 6.
Ibex. *Raj. Syn. Quadr. p.* 77. *n°.* 2.
Aldro. Quadr. Biſ. p. 730. *Fig. p.* 732. (*Fig. mala*).
Geſn. Quadr. p. 331. *Fig. p.* 1099. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 53. *Fig. T.* 28. (*Fig. bona*).
Charlet. Exerc. p. 10.
Ibex, nonnullis Capricornus. *Klein. Quadr. p.* 16.
Ibex, vel Capricornus apud recentiores: Capra fera Varroni. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 35. (*Fig. bona*).
Hircus Ferus, quoddam genus Cretæ familiare, quod galli *Bouc-Eſtain* appellant. *Bell. Obſ. Fig. p.* 20. (*Fig. ſat bona*).
Caper Montanus Alberti. *Aldro. Klein.*
Les Chaldéens l'appellent Jaela. *Geſn.*
Les Grecs, Τράγος ἄγριος.
Les Perſes, Kotzcohi. *Geſn.*
Lee Italiens & les Allemands, Steinboch. *Aldro. Geſn. Jonſt. Raj.*
Les Suiſſes des montagnes, Ybsch. *Aldro. Geſn.*
Les Illyriens, Kozoroziecz. *Aldro. Geſn.*
Les Flamands, Wildgheit. *Aldrov.*

Il eſt un peu plus grand que le *Bouc domeſtique*. Il a la tête

Hirco domeſtico paulò major eſt. Caput habet pro mole

corporis

corporis parvum; cornua vaſta, ſuprà nodoſa, infrà rotundata, parumper arcuata, & in dorſum reclinata: crura gracilia ſunt; cauda brevis; pilus ut in *Hirco* longus, fulvus. Mas prolixam nigricantem barbam gerit: fœmina mare minor eſt. Habitat in *Alpibus*, *Helvetiâ*, & Archiepiſcopatu *Saltzburgenſi.*

petite à proportion de la grandeur de ſon corps: ſes cornes ſont très grandes, garnies de nœuds en deſſus, arrondies en deſſous, un peu courbées en arc, & couchées ſur le dos: ſes jambes ſont menues; ſa queue courte; ſon poil eſt long, comme celui d'un *Bouc*, & de couleur fauve. Le mâle porte une grande barbe noirâtre: la femelle eſt un peu plus petite que lui. On le trouve dans les *Alpes*, en *Suiſſe*, & dans l'Archevêché de *Saltzbourg.*

4. La Petite Chevre d'Amerique.

Hircus cornibus depreſſis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus... Capra parva Americana.

Capra cornibus depreſſis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 2. & ed. 4. g. 30. ſp. 2.*

Magnitudo *Hædi:* pili longi, uti in precedente (*Capra domeſtica*); cornua lunulata, vix digitum longa, craſſa, cranio adpreſſa, ut cutem ferè perforent. *Huc uſque Linnæus.* Habitat in *Americâ.*

Elle eſt de la grandeur d'un *Chevreau.* Ses poils ſont longs, comme ceux de la *Chevre*; ſes cornes, qui ſont à peine de la longueur du doigt, ſont groſſes, courbées en croiſſant, & ſi bien appliquées à la tête, qu'elles percent preſque la peau. On la trouve en *Amérique.*

5. Le Petit Chamois d'Amerique.

Hircus cornibus erectis, apice recurvis... Ibex parvus Americanus.

Capra cornibus erectis, apice recurvis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 3. & ed. 4. g. 30. ſp. 3.*

Il eſt de la grandeur d'un *Chevreau* d'un an. Ses poils ſont courts, comme ceux du *Cerf*; ſes cornes, qui ſont à peine de la longueur du doigt, ſont élevées & courbées vers le bout. On le trouve en *Amérique*.

Magnitudo *Hædi* unius anni; pili breves, uti in cervino genere; cornua vix digitum longa. *Huc uſque Linnæus*. Habitat in *Americâ*.

** 6. Le Chamois, ou l'Yzard.

Hircus cornibus teretibus erectis, rugoſis, ad apicem levibus & uncinatis... Rupicapra.

Capra cornibus erectis, uncinatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 5.*
Rupicapra. *Raj. Syn. Quadr. p. 78. No. 3.*
Geſn. Quadr. p. 321. Fig. p. 319. (Fig. ſat bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 36. (Fig. ſat bona).
Jonſt. Quadr. p. 52. Fig. T. 27. (Fig. mala). & T. 32. (Fig. non æquè mala).
Bell. Obſ. Fig. p. 57. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 9.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 223.
Rzac. auct. p. 319.
Tragus Dorcas; Rupicapra; Caprea. *Klein. Quadr. p. 17.*
Dorcas, ſive Rupicapra. *Aldro. Quadr. Biſ. p. 725. Fig. p. 727. (Fig. mala).*
Chamois. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 203. Fig. Pl. 29. (Fig. bonne).*
Kolbe. Tom. III. p. 38.
Les Hebreux l'appellent Zebi. *Aldro.*
Les Chaldéens, Thabia. *Aldro.*
Les Arabes, Thabiu. *Aldro.*
Les Perſes, Ahu. *Aldro.*
Lss Eſpagnols, Capra Montés. *Aldro. Geſn.*
Les Italiens, Camuza, *ou* Camorcia. *Geſn.*
Les Griſons, Camuza. *Aldro. Geſn.*
Les Peuples circonvoiſins de Trente, Comozza. *Charlet.*
Les Allemands, Gemss, *ou* Gamss. *Aldro. Geſn. Raj. Rzac.*
Les Bohémiens, Korytansky; Kozlik. *Aldro. Geſn.*
Les Polonois, Dzyka-Koza. *Aldro. Geſn. Rzac.* Kosa Skalna *Rzac.*
Les Anglois, Wild Goote. *Aldro. Geſn.*

Il eſt de la groſſeur d'une *Chévre*; mais il a les jambes plus longues, & le poil plus court. Ses

Capræ domeſticæ craſſitiem attingit; ſed crura ipſius longiora ſunt, & pilus brevior;

Cornua 8 circiter pollices longa, nigra, teretia, erecta, rugoſa, ad apicem levia & uncinata. Labium ſuperius parumper, ut in *lepore*, fiſſum. Auriculæ 5 pollices longæ, cauda 3 pollices. Pilus ſuprà fuſcus eſt aut ruffus, infrà verò ex ſordidè albo rufeſcit. Cauda nigricat, & quidem utrinque, nec ſubtùs alba eſt, ut in aliis. Habitat in *Alpibus Helveticis*, ſed *Rhæticis* præcipuè frequens.

cornes ont environ 8 pouces de long; elles ſont noires, rondes, droites & élevées, garnies de rides, comme autant de petits anneaux; mais liſſes vers leur bout, qui eſt crochu. Sa lévre ſupérieure eſt un peu fendue, comme celle du *Liévre*. Ses oreilles ſont longues de 5 pouces; ſa queue de 3 pouces. La couleur de ſon poil eſt ordinairement brune ou rouſſe en deſſus; & en deſſous d'un blanc ſale & rouſſâtre. Sa queue eſt noirâtre deſſus & deſſous. On le trouve dans les *Alpes Suiſſes*, mais ſur tout chez les *Griſons*.

* 7. La Gazelle des Indes.

Hircus cornibus teretibus, longiſſimis, rectis, baſi tantùm annulatis... Gazella Indica.

Capra cornibus teretibus rectiſſimis, longiſſimis, baſi annulatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 8.*
Gazella Indica cornibus rectis, longiſſimis, nigris, propè caput tantùm annulatis. *Raj. Syn. Quadr. p. 79. No. 5.*
Klein. Quadr. p. 18.
Gazella. *Proſp. Alp. Ægypt. p. 232. Fig. T. 14. F. 1. (Fig. mala).*
Elan. *Kolbe. Tom. III. p. 32. Fig. p. 34. (Fig. bonne).*

Ipſius altitudo, à parte ſuperiore dorſi uſque ad terram, circiter 2 ½ pedum. Cornua, 3 propemodum pedes longa, nigra ſunt, recta, ad baſim tantùm annulis eminentibus cincta, in reliquâ longitudine levia. Cauda 1 pedis ferè longitudinem æquat. Pilus ei cinereus eſt. Habitat in *Indiâ*.

Elle a environ 2 ½ pieds de haut, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre. Ses cornes, qui ont près de 3 pieds de long, ſont noires, droites, comme garnies d'anneaux ſeulement à la baſe; tout le reſte de leur longueur eſt liſſe. Sa queue eſt longue de près d'un pied. Tout ſon poil eſt gris. On la trouve dans l'*Inde*.

* 8. La Gazelle.

Hircus cornibus teretibus, dimidiato annulatis, bis arcuatis. Gazella.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis, arcuatis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 32. *ſp.* 7.
Gazella Africana, Strepſiceros Plinii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 79. *No.* 4.
Tragus ſtrepſiceros, Gazella. *Klein. Quadr. p.* 18.
Capra ſtrepſiceros. *Aldro. Quadr. Bis. p.* 740. *ibi caput Fig.* (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 54. *Fig. T.* 24. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 10.
Strepſiceros Jo. Caii. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 38. *ibi caput Fig.* (*Fig. bona*).
Strepſiceros. *Geſn. Quadr. p.* 323.
Muſ. Worm. p. 339.
Gazelle. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 1. *p.* 95. *Fig. Pl.* 11. (*Fig. très bonne*).
Les Arabes l'appellent Algazel. *Klein. Hiſt. de l'Acad.*
Les Grecs, Στρεψικερως.

Elle a à peu-près la forme & la grandeur d'un *Chevreuil*. Son poil eſt court, fauve par deſſus le corps, & blanc ſous le ventre & l'eſtomach. Ses jambes ſont longues & menues ; ſa queue longue environ d'un pied, & noirâtre ; ſes oreilles très grandes, ayant intérieurement quelques rayes d'un poil très blanc. Ses cornes, qui ont 15 pouces de long, ſont noires, comme garnies d'anneaux juſqu'à la moitié de leur longueur ; le reſte eſt liſſe : elles ne ſont pas exactement droites, elles ſont un peu courbées en dehors vers le milieu, & elles ſe rapprochent enſuite en dedans comme les branches d'une lyre. Ces cornes ont à leur racine une touffe de poil plus long que celui du reſte du corps. On la trouve en *Afrique*.

Ad *Capreoli* formam & magnitudinem accedit. Pili breves ſunt, ſuprà fulvi, in ventre & thorace albi ; crura longa & gracilia ; cauda 1 pede circiter longa, nigricans ; auriculæ maximæ, intùs lineis pilorum albis ſtriatæ. Cornua, 15 pollices longa, nigra ſunt, tranſversìm annulata uſque ad dimidiam partem, alterâ parte levi : non ſunt exactè recta, ſed circà mediam partem extrorsùm flexa, deinde introrsùm incurvata, ità ut lyram veterum figurâ ſuâ imitentur. Ad baſim cornuum ſunt pili, quàm in reliquo corpore longiores. Habitat in *Africâ*.

9. La Gazelle du Bezoar.

Hircus cornibus teretibus, rectis, ab imo ad ſummum ferè annulatis, apice tantummodò levi... Gazella Bezoartica.

Animal Bezoarticum Orientale. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80.
Tragus Bezaarticus. *Klein. Quadr. p.* 19.
Capra ſive Hircus Bezoarticus. *Aldro. Quadr. Bis. p.* 755. *Fig. p.* 756. (*Fig. ſat bona*).
Capra ſive Hircus Bezaarticus, vel potiùs Pazaharticus. *Jonſt. Quadr. p.* 56.
Hircus Bezoarticus. *Charlet. Exer. p.* 11.
Capricerva. *Kæmpf. p.* 398. *Fig. p.* 407. *F.* 1. (*Fig. ſat bona*).
Les Perſes l'appellent Pasan. *Aldro. Jonſt. Klein.* Pasen. *Kæmpf.*

Capram domeſticam (aliqui *Cervum*) magnitudine adæquat. Pilis brevibus ex cinereo ruffis veſtitur. Barbam gerit ut *Capra*. Cornua ipſi teretia ſunt, recta, ſat longa, ab imo ad ſummum ferè annulata, apice tantummodò levi. Cornua fœminis multò breviora quàm maribus. Habitat præcipuè in *Perſidis* provinciâ *Laar*.

Elle eſt de la grandeur de la *Chévre domeſtique*, (quelques Auteurs diſent du *Cerf*). Son poil eſt court, & d'un gris mêlé de roux. Elle a une barbe ſous le menton, comme la *Chévre*. Ses cornes ſont rondes, aſſez longues, droites, comme garnies d'anneaux preſque du haut au bas; il n'y a que le bout qui ſoit liſſe. Les femelles ont les cornes beaucoup plus courtes que les mâles. On la trouve dans la province de *Laar* en *Perſe*.

** 10. La Gazelle d'Afrique.

Hircus cornibus teretibus, arcuatis, ab imo ad ſummum ferè annulatis, apice tantummodò levi... Gazella Africana.

Capra cornibus teretibus perfectè annulatis arcuatis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 32. *ſp.* 9.
Gazella Africana cornibus brevibus ab imo ad ſummum ferè annulatis, & circà medium inflexis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80. *No.* 6.
Klein. Quadr. p. 18.
Algazel ex Aphricâ. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 893. (*Fig. bona*).

Elle eſt de la grandeur d'un *Chevreuil.* Son poil eſt court, doux au toucher, fauve ſur le dos, & blanc ſous le ventre & aux côtés. Sa queue eſt aſſez longue & noirâtre : ſon col eſt épais ; ſes jambes très déliées : les poſtérieures ſont plus longues que les antérieures. Ses oreilles ſont longues, larges & ouvertes, garnies intérieurement de bandes de poils blanchâtres. Ses cornes ſortent du milieu du front entre les deux yeux : elles ſont longues d'un pied, rondes, comme garnies d'anneaux preſque du haut au bas, n'ayant que la pointe de liſſe, & courbées en arc. Leur couleur eſt un maron foncé. On la trouve en *Afrique*, & en la *Nouvelle Eſpagne.*

Capreoli magnitudinem attingit. Pilo eſt brevi, levi, in dorſo fulvo, in ventre & lateribus candicante ; caudâ ſat longâ nigricante. Collum habet craſſum ; crura admodum gracilia ; poſteriora anterioribus longiora ; auriculas longas, magnas, patulas, intùs ſtriis piloſis candicantibus ornatas. Cornua è frontis medio inter oculos oriuntur ; uno pede longa ſunt, teretia, ab imo ad ſummum ferè annulata, apice tantummodò levi, arcuata : colore ſunt ex caſtaneo nigricante. Habitat in *Africâ* & *Novâ Hiſpaniâ.*

11. La Gazelle de la Nouvelle Espagne.

Hircus cornibus teretibus, circà medium inflexis, ab origine ad flexuram ſpiraliter canaliculatis, à flexurâ ad apicem levibus... Gazella Novæ Hispaniæ.

Tragulus Temamaçama. *Klein. Quadr. p.* 21.
Cervus Temamaçama, ſive Macatlchichiltic dictus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 69. *Fig. T.* 42. *F.* 4. (*Fig. bona*).
Tamamaçame. *Jonſt. Quadr. p.* 63.
Temamaçame. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 325. (*Fig. mala*).

Elle eſt à peu-près de la grandeur d'un *Faon* de *Biche.* Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un châtain clair, & court : ceux de ſa queue ſont plus longs : ſes oreilles ſont grandes : ſes cornes ſont d'un beau noir, rondes,

Hinnuli magnitudinem circiter æquat. Corpus undique veſtitur pilis dilutè ſpadiceis, & brevibus : cauda verò pilis longioribus obſita eſt ; auriculæ magnæ : cornua dilutè nigra ſunt, teretia, circà me-

dium inflexa, ab origine ad flexuram ſpiraliter canaliculata, à flexurâ verò ad apicem levia. Habitat in rupibus & altis montibus *Novæ Hiſpaniæ.*

courbées vers le milieu, cannelées en ſpirale depuis leur origine juſqu'à la courbure, & liſſes dans le reſte de leur longueur. On la trouve ſur les rochers & les hautes montagnes de la *Nouvelle Eſpagne.*

* 12. La Chevre du Levant.

Hircus cornibus ſuprà rotundatis, infrà planis, ſemicirculum referentibus... Capra Orientalis.

Tragelaphus Bellonii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 82. *N*o. 11.
Geſn. Icon. Quadr. p. 38. *Fig. p.* 39. (*Fig. bona*).
Tragelaphus. *Bell. Obſ. Fig. p.* 57. (*Fig. bona*).

Arietis magnitudinem circiter adæquat. Pilus ei longus eſt & fulvus. Crura albicant. Os album eſt, ut etiam tota ventris pars inferior, & femora ſub caudâ; nares verò & cauda nigræ. Colli pars prona & ſupina, ſicut & pectus, villis ità longis obſita ſunt, ut barbata videatur. Pili etiam ſcapularum longi ſunt ac nigri: utrinque ad latera macula eſt cinerea. Ore, fronte, & auriculis *ovem* refert. Cornua ipſius ſuprà ſunt rotundata, infrà plana, & ſemicirculum quodammodo referunt.

Elle eſt à peu-près de la grandeur d'un *Bellier*. Son poil eſt long & fauve: ſes jambes ſont blanchâtres: ſon muſeau eſt blanc, ainſi que toute la partie inférieure du ventre, & les cuiſſes vers la queue. Les narines & la queue ſont noires. Elle a le col couvert deſſus & deſſous, ainſi que la poitrine, de poils ſi longs, qu'elle paroît avoir une barbe. Les poils qui couvrent les épaules ſont auſſi longs & noirs. Elle a de chaque côté vers les flancs une tache griſe. Son muſeau, ſon front, & ſes oreilles ſont ſemblables à celles d'un *Bellier*. Ses cornes ſont arrondies en deſſus, applaties en deſſous, & repréſentent en quelque façon un demi cercle.

13. La Chevre de Sirie.

Hircus cornibus minimis, erectis, parumper retrorsùm incurvis, auriculis longiſſimis, pendulis... Capra Syriaca.

Capra auribus pendulis longiſſimis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp.* 11.
Capra Mambrina, ſeu Syriaca Geſneri, auribus ad terram ferè demiſſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 81. *No.* 8.
Capra auribus demiſſis. *Jonſt. Quadr. p.* 57. *Fig. T.* 26. *ſub illo nomine.* Capra Mambrina. (*Fig. bona*).
Capra Mambrina. *Geſn. Quadr. p.* 271.
Capra Indica, aut Mambrina, aut Syriaca potiùs. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 1098. (*Fig. bona*).
Capra Indica à recentioribus quibuſdam *Mambrina* cognominata. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 18. (*Fig. bona*).

Elle eſt un peu plus grande que la *Chevre domeſtique.* Sa couleur eſt un fauve clair : ſes cornes ſont noires, longues de 2 ½ doigts, élevées, & un peu recourbées en arriere ; mais on la diſtingue très aiſément de toutes les autres eſpeces de ſon genre par ſes grandes & longues oreilles qui pendent juſqu'à terre. On la trouve ſur la montagne de *Mambre* en *Syrie.*

Capram domeſticam magnitudine antecellit. Pilo dilutè fulvo veſtitur. Cornua nigra ſunt, 2 ½ digitorum longa, erecta, & parumper retrorsùm incurva. In eo autem ab omnibus aliis ſui generis ſpeciebus maximè differt, quòd auriculas longiſſimas, uſque ad terram pendulas, habeat. Habitat in *Mambre, Syriæ* monte.

14. La Chevre de la Nouvelle Espagne.

Hircus cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis... Capra Novæ Hispaniæ.

Tragulus Mazame, ſeu Cervus cornutus, ex Novâ Hiſpaniâ. *Klein. Quadr. p.* 21.
Mazame ſeu Cervus cornutus ex Novâ Hiſpaniâ. *Seb. vol.* 1. *p.* 69. *Fig. T.* 42. *F.* 3. (*Fig. optima*).
Mazame ſeu Cervus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 324. (*Fig. mala*). *Cornua ramoſa, quod malè.*
Maçame. *Jonſt. Quadr. p.* 63.

Pilus

Pilus totius corporis ſubruffus eſt, paulò tamen dilutior in capite & ventre. Caput habet & collum brevia & craſſia; auriculas magnas, & flaccidas; caudam craſſam & obtuſam. Cornua gerit teretia, erecta, parumper arcuata, ab imo ad ſummum ſpiraliter intorta. Habitat in *novâ Hiſpaniâ.*

Tout ſon corps eſt couvert d'un poil rouſſâtre : celui qui couvre la tête & le ventre eſt d'un roux moins foncé. Elle a la tête & le col gros & courts; les oreilles grandes & pendantes; la queue groſſe & obtuſe. Ses cornes ſont rondes, élevées, un peu courbées en arc, & cannelées en ſpirale du haut au bas. On la trouve dans la *nouvelle Eſpagne.*

15. La Chevre de Créte

Hircus laniger, cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis... Capra Cretensis.

Ovis cornibus erectis ſpiralibus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 33. ſp. 2.*
Aries ſtrepſiceros cornibus erectis, & in ambitu canaliculatis, Cretenſis. *Klein. Quadr. p.* 14.
Ovis ſtrepſiceros Cretica Bellonii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 75. *N°.* 3.
Cretenſis aries ſtrepſiceros nominatus. *Bell. Obſ. p.* 20. *Fig. p.* 21. [*Fig. bona*].
Strepſiceros Bellonii. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 37. [*Fig. bona*].
Aries Cretenſis. *Aldrov. Quadr. Bis. p.* 406. *Fig. p.* 407. (*Fig. bona*).
Ovis Cretenſis. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 45. [*Fig. bona*].

Ovis domeſticæ magnitudinem adæquat, eique ſimillima eſt in omnibus, exceptis cornibus, quæ non, ut *Ovibus*, reflexa ſunt, ſed teretia, recta, erecta, & ab imo ad ſummum ſpiraliter intorta. Habitat in *Creta*, & præſertim in *Monte Ida.*

Elle eſt de la grandeur de la *Brebis domeſtique*, & elle lui reſſemble en tout, excepté en ſes cornes, qui au lieu d'être contournées, comme dans les *Brebis*, ſont rondes, droites & cannelées en ſpirale du haut au bas. On la trouve en *Créte*, & ſur tout ſur le *Mont Ida.*

X.

Genus Arietis.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ

X.

Le Genre du Bellier.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſi-

ves à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure: ſuperiore nulli, in inferiore octo:

D'avoir le pied fourchu: Pes biſulcus:

Des cornes ſimples, Cornua ſimplicia;

Tournées en arriere. Retrorsùm verſa.

Obſ. Le grand nombre de nos Brebis domeſtiques, ſur-tout les femelles, n'ont point de cornes; mais ces Animaux nous ſont trop familiers, pour que, malgré le défaut de ce caractere générique, nous puiſſions nous y méprendre.

Obſ. Pleræque Oves domeſticæ, præſertim fœminæ, carent cornibus; ſed nobis nimis nota ſunt hæc Animalia, ùt hujus characteris generici defectus nos in errorem inducat.

** 1. La Brebis domestique.

Aries laniger, caudâ rotundâ, brevi... Ovis domestica.

Ovis cornibus compreſſis lunatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 33. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 43.

Ovis domeſtica, cujus mas Aries dicitur, fœtus Agnus. *Raj. Syn. Quadr. p. 73. No. 1.*
Sloane. vol. II. p. 328.

Aries, Ovis, Vervex, Agnus. *Klein. Quadr. p. 13.*

Ovis. *Aldro. Quadr. Bis. p. 370.*
Geſn. Quadr. p. 872. Fig. p. 873. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 14. [Fig. bona].
Jonſt. Quadr. p. 38.
Charlet. Exer. p. 8.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 242.
Rzac. Auct. p. 332.

Aries. *Geſn. Quadr. p. 912.*
Jonſt. Quadr. Fig. T. 22. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 9.

Vervex. *Geſn. Quadr. p. 925.*
Jonſt. Quadr. Fig. T. 22. [Fig. bona].
Charlet. Exer. p. 9.

Agnus. *Geſn. Quadr. p. 927.*
Jonſt. Quadr. Fig T. 22. (Fig. bona).
Charlet. Exer p. 9.

Les François appellent le mâle Bellier; *lorſqu'il eſt châtré*, Mouton; *la femelle*, Brebis; *le jeune*, Agneau.

Les Latins le mâle, Aries; *lorſqu'il eſt châtré*, Vervex; *la femelle*, Ovis; *le jeune*, Agnus.

Les Hebreux le mâle, Ail, & Eel; *la femelle*, Zon, Zoneh; *le jeune*, Kebes, *Geſn. Aldro.*

Les Chaldéens le mâle, DIKERIN; *la femelle*, ANA; *le jeune*, IMAR. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs le mâle, Κριὸς; *la femelle*, Οἶς.
Les Arabes le mâle, KABSA; *la femelle*, GENAS; *le jeune*, ELG. *Geſn. Aldro.*
Les Sarraſins, GANEME. *Geſn. Aldro.*
Les Perſes le mâle, NERAMEISCH; *la femelle*, GOSPAND; *le jeune*, BARAH. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols le mâle, CARNÉRO; *la femelle*, OVEIA; *le jeune*, CORDERO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens le mâle, MONTONE, *ou* ARIETE; *la femelle*, PECORA; *le jeune*, AGNA, AGNO, AGNELLO. *Geſn. Aldro.*
Les Suiſſes le mâle, HERMAN. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens OWCZE, *ou* SKOP. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, OWCA. *Rzac.*
Les Allemands le mâle, WIDER; *la femelle*, SCHAAFF; *le jeune*, LAMB; LEMBLIN. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Flamands le mâle, WIDER; *la femelle*, SCHAEP; *le jeune*, LAM. *Aldro.*
Les Suedois, FOAR. *Linn.*
Les Anglois le mâle, RAM, *ou* TUP; *la femelle*, SHEEPE; *le jeune*, LAMBE, *ou* HOGG. *Geſn. Aldro.*
Les Ecoſſois, HEIRTH. *Aldro.*
Les Habitans de Madagaſcar, AGARONE. *Aldro.*

Ovis eſt animal ita notum, ut deſcriptione non indigeat. Habitat in omnibus ferè locis cultis.

La Brebis eſt trop connue, pour qu'il ſoit néceſſaire d'en faire la deſcription. On la trouve dans preſque tous les lieux habités.

** 2. LA BREBIS A LARGE QUEUE.

Aries laniger, caudâ latiſſimâ... OVIS LATICAUDA.

Ovis cornibus compreſſis, lunatis. Ovis laticauda. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 33. *ſp.* 1.
Ovis laticauda Arabica. *Raj. Syn. Quadr. p.* 74. *N°.* 2.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [*Fig. bona, exceptâ caudâ*].
Aldro. Quadr. Biſ. p. 404.
Ovis Arabica. *Jonſt. Quadr. p.* 44. *Fig. T.* 23. [*Fig. bona*].
Aries ſive Ovis Orientalis. *Klein. Quadr. p.* 14.
Ovis Turcica. *Charlet. Exer. p.* 9.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 243.
Les Italiens l'appellent PECORA D'ARABIA CON LA CODA LARGA. *Geſn.*
Les Allemands, SCHAAFFUSZ ARABIA MIT EINEM BREITEN SCHWANTZ. *Geſn.*

Elle eſt un peu plus grande que la precédente: elle en différe encore par ſa queue très épaiſſe & extrêmement large. J'en ai vû qui avoient 1 pied de large & 3 pouces d'épaiſſeur: elles avoient à peu près la figure d'un couſſin. On la trouve en *Afrique*, en *Syrie*, & en *Arabie*.

A precedente differt magnitudine, quâ eam paulùm antecellit, & caudâ craſſiſſimâ & latiſſimâ. Hujuſmodi caudas vidi 1 pede latas, & 3 pollicum craſſas. Cubital figurâ ſuâ ſat benè imitabantur. Habitat in *Africâ*, *Syriâ*, & *Arabiâ*.

3. La Brebis a longue queue.

Aries laniger, caudâ longiſſimâ... Ovis longicauda.

Ovis Arabica altera. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 74.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [*Fig. bona*].
Ovis Arabiæ longicauda. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 404. *Fig. p.* 405. [*Fig. mala*].
Ovis Arabica. *Jonſt. Quadr. p.* 44. *Fig. T.* 23. [*Fig. bona*].
Les Italiens l'appellent Pecora d'Arabia, con la coda longa. *Geſn.*
Les Allemands, Anderley Schaaffusz Arabia, mit einem langen Schwantz. *Geſn.*

Celle-ci ne différe de la *Brebis domeſtique* que par la longueur de ſa queue, qui a quelquefois juſqu'à 3 pieds de long. On la trouve en *Arabie*.

Hæc ab *Ove domeſticâ* differt tantùm longitudine inſolitâ caudæ, quæ interdùm 3 pedes longa eſt. Habitat in *Arabiâ*.

4. La Brebis d'Afrique.

Aries piloſus, pilis brevibus veſtitus... Ovis Africana.

Ovis Africana pro vellere lanoſo pilis brevibus hirtis veſtita. *Raj. Syn. Quadr. p.* 75. *N°.* 4.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Ovis Æthiopica. *Charlet. Exer. p.* 9.

Elle reſſemble à la *Brebis domeſtique* par la forme extérieure du corps; mais au lieu d'avoir, comme elle, le corps couvert de laine, elle l'a couvert de poils courts. On la trouve en *Afrique*.

Quoad formam corporis externam *Ovibus domeſticis* perſimilis eſt; ſed loco lanæ, corpus pilis brevibus veſtitur. Habitat in *Africâ*.

5. La Brebis de Guinée.

Aries piloſus, pilis brevibus veſtitus, jubâ longiſſimâ, auriculis longis pendulis... Ovis Guineensis.

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 33. ſp. 3.*
Ovis Guineenſis ſive Angolenſis Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 75. *N°.* 5.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Aries Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 14.
Jonſt. Quadr. Fig. T. 46. [*Fig. bona*].
Barr. Hiſt. Fr. Eq. p. 149.
Aries Guineenſis, ſive Angolenſis. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 234. (*Fig. bona*).
Aries albus Judæorum. *Klein.*
Caper Mambrinus. *Charlet. Exer. p.* 10.
Les Congois l'appellent Memeriam Bacala. *Marcgr.*

Ovis domeſticæ magnitudinem æquat. Sicut illa, colore variat. Occipitium magis prominet: auriculæ longæ ſunt & pendulæ; caput craſſum; cornua parva, deorsùm, uſque ad oculos, incurvata, & quaſi torta. Cauda uſque ad ſuffragines. Lanâ caret; ſed pilis brevibus univerſum corpus, excepto collo inferiore longiſſimis pilis obſito, veſtitur. Habitat in *Guinea* & *Braſilia*.

Elle eſt de la grandeur de nôtre *Brebis domeſtique*. Elle varie en couleur, comme elle. Le derriere de ſa tête eſt plus élevé: ſes oreilles ſont longues & pendantes; ſa tête groſſe; ſes cornes petites, recourbées en arriere, comme tortillées, & revenant juſqu'aux yeux. Sa queue lui deſcend juſqu'aux jarrêts. Elle n'a point de laine: tout ſon corps eſt couvert de poils très courts, excepté la partie inférieure du col, qui eſt couverte de poils très longs. On la trouve en *Guinée* & au *Bréſil*.

X I.

Genus Bovinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ

X I.

Le Genre des Bœufs.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inci-

ſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure:

ſuperiore nulli, in inferiore octo:

D'avoir le pied fourchu:

Des cornes ſimples,

Tournées vers les côtés.

Pes biſulcus:

Cornua ſimplicia,

Ad latera verſa.

** 1. Le Bœuf domestique.

Bos cornibus levibus, teretibus, ſursùm reflexis... Bos domesticus.

Bos cornibus teretibus flexis. Taurus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 34. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 44.
Bos domeſticus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 70. N°. 1.*
Jonſt. Quadr. p. 26. Fig. T. 13. 14. 15. (Fig. bonis).
Sloane. Vol. II. p. 327.
Charlet. Exer. p. 8.
Bos. *Aldrov. Quadr. Biſ. p. 13. Fig. p. 36. (Fig. bona).*
Geſn. Quadr. Fig. p. 24. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 12. (Fig. bona).
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 237.
Rzac. Auct. p. 329.
Taurus domeſticus cum Vacca. *Klein. Quadr. p. 10.*
Taurus. *Geſn. Quadr. Fig. p. 103. [Fig. bona].*
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 10. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 8.
Vacca. *Geſn. Quadr. Fig. p. 25. (Fig. bona).*
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 11. [Fig. bona].
Charlet. Exer. p. 8.
Vitulus. *Genſ. Quadr. p. 124.*
Taureau. *Hiſt. Nat. Gen. & Part. ed. in-quarto. Tom. IV. p. 474. Fig. Pl. XIV. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 138. Fig. Pl. IV. [Fig. tres bonnes.]*
Les François appellent le mâle Taureau; *lorſqu'il eſt châtré*, Bœuf; *la femelle*, Vache; *le jeune*, Veau.
Les Latins le mâle, Taurus; *lorſqu'il eſt châtré*, Bos; *la femelle*, Vacca; *le jeune*, Vitulus.
Les Hébreux le mâle, Schor; *lorſqu'il eſt châtré*, Aleph; *la femelle*, Bakar; *le jeune*, Egel. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens le mâle, Thor, *ou* Tora; *la femelle*, Torata; *le jeune*, Egela. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes le mâle, Taur; *le jeune*, Egela. *Geſn.*
Les Grecs, Βοῦς.

Les Eſpagnols le mâle, TORO BUYREZIO ; *lorſqu'il eſt châtré*, BUEY ; *la femelle*, VACA ; *le jeune*, TERNERA. *Geſn. Aldro.*

Les Italiens le male, TORO ; *lorſqu'il eſt châtré*, BUE ; *la femelle* VACCA ; *le jeune*, VITELLO. *Geſn. Aldro.*

Les Illyriens, WUL. *Geſn. Aldro.*

Les Polonois, WOL. *Rzac.*

Les Allemands le mâle, STIER ; *lorſqu'il eſt châtré*, OCHSS, *ou* RIND ; *la femelle*, KŮ, *ou* KŮHE ; *le jeune*, KALB. *Geſn. Aldro.*

Les Flamands le mâle, STIER ; *lorſqu'il eſt châtré*, OS ; *la femelle*, KOE ; *le jeune*, CALF. *Aldro.*

Les Suédois, KO ; NŎT. *Linn.*

Les Anglois le mâle, BULL ; *lorſqu'il eſt châtré*, OX ; *la femelle*, COW ; *le jeune*, CALF. *Raj. Geſn. Aldro.*

Bos eſt Animal ità notum, ut deſcriptione non indigeat. A reliquis ſui generis differt cornibus ſuis levibus & minimè rugoſis, ſursùm reflexis. Habitat ubique in locis cultis. Ampliſſimè deſcribitur in libro cui titulus : *Hiſtoire Nat. Gén. & Part.* Ed. *in-4°. Vol. IV. p.* 474. *& ſeq.* & Ed. *in-12. Vol. VIII. p.* 138. *& ſeq.*

Le Bœuf eſt un Animal ſi connu, qu'il n'eſt pas néceſſaire d'en faire la deſcription. On le diſtingue aiſément de ceux de ſon genre par ſes cornes liſſes, & recourbées en enhaut. On le trouve dans tous les lieux habités. On le trouvera amplement décrit dans l'*Hiſt. Nat. Gén. & Part.* Ed. *in-4°. Tom. IV. p.* 474. *& ſuiv.* & Ed. *in-12. Tom. VIII. p.* 138. *& ſuiv.*

2. LE BUFFLE D'AFRIQUE.

Bos cornibus teretibus, ſursùm reflexis, in ſeſe recurvis... BUBALUS AFRICANUS.

Bos Africanus Bellonii, quem pro Bubalo veterum habet. *Raj. Syn. Quadr. p.* 73. *N°.* 6.

Exiguus Africanus Bos. *Klein. Quadr. p.* 11.

Elegans & parvus Africanus Bos, quem veteres Græci *Bubalum* appellarunt. *Bell. Obſ. Fig. p.* 119. (*Fig. bona*).

Bubalus. *Geſn. Quadr. p.* 330.

Bubalus Africanus. *Charlet. Exer. p.* 8.

Bubalus Africanus Bellonii. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 33. [*Fig. bona*].

Bubalus veterum. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 363. *Fig. p.* 364. (*Fig. bona*). *Jonſt. Quadr. p.* 37. *Fig. T.* 18. *ſub iſto nomine*, Bubalus Africanus. [*Fig. ſat bona*].

Silveſtris Juvenca. *Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p.* 233. *Fig. T.* 14. *Fig.* 2. (*Fig. bona*).

Les Hébreux l'appellent JACHMUR. *Geſn.*

Les Perſes, MOSKANDAZ. *Geſn.*

Sa grandeur tient le milieu entre celles du *Cerf* & du *Chevreuil*. Il a le col court & épais ; la peau qui y pend eſt courte : ſes épaules ſont larges & épaiſſes ; ſes jambes courtes : ſa queue, qui lui deſcend juſqu'aux jarrêts, eſt couverte de poils noirs, une fois plus gros que le crin des Chevaux ; ſes cornes ſont noires, rondes, courbées en enhaut en forme de croiſſant, & leurs deux pointes ſe touchent preſque. Ses poils ſont jaunes, liſſes, & luiſans ; ſon ventre eſt cependant d'un roux jaunâtre ; & ſon dos approche du brun. On le trouve en *Afrique*.

Corpore minor eſt *Cervo* ; ſed *Capreolo* major. Collum habet craſſum & breve, exiguis præditum palearibus ; armos elatos & plenos ; crura brevia ; caudam ad poplites uſque promiſſam, nigris pilis obſitam, duplo quàm Equini craſſioribus ; cornua nigra, teretia, ſursùm lunæ creſcentis in modum reflexa, in ſeſe recurva. Pili ejus flavi ſunt, ſplendentes & leves : venter ex ruffo flaveſcit ; dorſum verò ad fuſcum accedit. Habitat in *Africa*.

3. L'AUROCHS.

Bos cornibus craſſis, brevibus, ſursùm reflexis, fronte criſpâ... URUS.

Bos cornibus teretibus flexis. Urus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 1.
Urus, Biſon. *Klein. Quadr. p.* 11.
Urus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 70. *N°.* 2.
Aldro. Quadr. Biſ. p. 346. *Fig. p.* 348. [*Fig. mala*], & *p.* 349. (*Fig. ſat bona*).
Geſn. Quadr. Fig. p. 157. [*Fig. mala*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 29. [*Fig. ſat bona*]. & *p.* 30. [*Fig. mala*].
Jonſt. Quadr. p. 36. *Fig. T.* 20. [*Fig. ſat bona*].
Charlet. Exerc. p. 8.
Rzaç. Hiſt. Nat. Pol. p. 228.
Rzac. Auct. p. 323.
Les Allemands l'appellent UROCHS, *ou* AUROCHS. *Raj. Geſn. Aldro.* AVER-OCHS. *Rzac.*
Les Illyriens, ZUBR. *Geſn. Aldro.*

Les

Les Polonois & les Lithuaniens, THUR. *Klein. Geſn. Aldro.* TUR; WOTDZIKI. *Rzac.*
Les Flamands, UROS. *Aldro.*
Les Anglois, BULGES, *ou* BUFFES. *Geſn. Aldro.*

Quoad formam corporis externam & colorem, *Bovi domeſtico* ſimilis eſt; ab eo autem differt magnitudine, quæ ad Elephantinam accedit; cornuum brevitate, craſſitie, & validitate; & fronte criſpâ. Habitat in *Polonia*, *Boruſſia*, *Livonia*, & *Moſcovia*.

Il reſſemble au *Bœuf domeſtique* par la forme extérieure du corps & la couleur; mais il en différe par ſa grandeur, qui approche de celle de l'Elephant; par ſes cornes courtes, groſſes, & fortes; & par un bouquet de poils friſés qu'il a ſur le front. On le trouve en *Pologne*, en *Pruſſe*, dans la *Livonie*, & dans la *Moſcovie*.

** 4. LE BUFFLE.

Bos cornibus compreſſis, ſursùm reflexis, reſupinatis, fronte criſpâ... BUBALUS.

Bos cornibus vaſtis, intortis, reſupinatis. Bubalus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 34. ſp. 4.*
Bubalus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 72. No. 5.
Geſn. Quadr. Fig. p. 139. (*Fig. mala*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 13. (*Fig. mala*).
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 228.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 239.
Buffelus. *Klein. Quadr. p.* 10.
Charlet. Exer. p. 8.
Buffelus, ſive Bubalus vulgaris. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 365. *Fig. p.* 366. (*Fig. peſſima*).
Jonſt. Quadr. p. 38. *Fig. T.* 20. (*Fig. bona*).
Buffle. *Kolbe. Tom. III. p.* 25. *Fig. p.* 54. *f.* 3. (*Fig. tres bonne*).
Les Grecs l'appellent Βούβαλος.
Les Eſpagnols, BUFANO. *Klein. Geſn. Aldro.*
Les Italiens, BUFALO. *Raj. Geſn.*
Les Allemands, BUFFEL. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, BAUWOL. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, BAWOL. *Rzac.*
Les Anglois, BUGILL. *Geſn. Aldro.*

Il eſt plus grand que le *Bœuf domeſtique* ; il a le corps plus épais, & plus fort ; la peau très dure ; la tête petite, à proportion du corps. Il porte ſur le front un bouquet de poils friſés. Tout ſon corps eſt couvert de poils noirs, ou noirâtres ; ſes cornes ſont noires, groſſes, un peu applaties, recourbées en enhaut, & un peu couchées ſur le dos. On le trouve en *Italie* dans l'*Etat Eccléſiaſtique*, & dans le Royaume de *Naples*.

Bove domeſtico major eſt; corpore craſſiore & robuſtiore; cute duriſſimâ ; capite parvo, reſpectu corporis ; fronte criſpâ. Pilus totius corporis eſt niger, aut nigricans, ſicut & cornua, quæ craſſa ſunt, paululùm compreſſa, ſursùm reflexa, & parumper reſupinata. Habitat in *Italia* in *Statu Eccleſiaſtico*, & Regno *Neapolitano*.

5. Le Bison blanc.

Bos cornibus ſursùm reflexis, jubâ longiſſimâ... Bison albus.

Biſon albus Scoticus, vel Calydonius. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 122. *Fig. p.* 123.
Aldro. Quadr. Biſ. p. 357.
Biſon Scoticus. *Jonſt. Quadr. p.* 37.

Il ne differe du *Bœuf domeſtique*, que parce qu'il eſt tout blanc, & qu'il a le col garni de poils très longs. On le trouve en *Ecoſſe*, dans la partie de la forêt de *Calydoine*, appellée *Cummirland*.

A *Bove domeſtico* differt colore, qui per univerſum corpus albus eſt, & jubâ in collo longiſſimâ. Habitat in *Scotiâ*, in eâ parte *Calydoniæ* ſylvæ, quæ *Cummirland* appellatur.

6. Le Bison.

Bos cornibus ſursùm reflexis, dorſo gibboſo, jubâ, barbâque longiſſimis... Bison.

Bos jubâ longiſſimâ dorſo gibboſo. Biſon. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 3.
Taurus Ferus. *Klein. Quadr. p.* 11.
Biſon. *Raj. Syn. Quadr. p.* 71. *N°.* 3.
Geſn. Quadr. p. 143.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 31. (*Fig. bona*).

Aldro. Quadr. Biſ. p. 353. *Fig. p.* 355. [*Fig. bona*].
Jonſt. Quadr. p. 36. *Fig. T.* 17. *ſub illo nomine*, Biſon jubatus. [*Fig. bona*].
Charlet. Exer. p. 8.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 214.
Les Grecs l'appellent Βίσων.
Les Allemands, Wisent. *Raj. Geſn. Aldro. Jonſt.*
Les Polonois, Zuber. *Geſn. Rzac.*
Les Lithuaniens, Suber. *Geſn.*

Bovem domeſticum magnitudine circiter æquat : ab illo autem differt cornuum amplitudine, barbâ longiſſimâ, collo ad armos uſque jubis horrido, & dorſo in gibbum aſſurgente. Habitat in *Germaniâ*.

Il eſt à peu près de la grandeur du *Bœuf domeſtique* : il en différe par la grandeur de ſes cornes, par ſa grande barbe, par les longs poils dont ſon col eſt couvert juſqu'aux épaules, & par la boſſe qu'il a ſur le dos. On le trouve en *Allemagne*.

7. Le Bison d'Amerique.

Bos cornibus ſursùm reflexis, dorſo gibboſo, capite pilis longiſſimis obſito... Bison Americanus.

Bos jubâ longiſſimâ, dorſo gibboſo. Taurus Mexicanus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 3.
Biſon Indicus. *Klein. Quadr. p.* 13.
Taurus Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 587. (*Fig. bona*).
Taurus Quiviræ regionis. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 10.
Taurus Quiviræ Provinciæ. *Jo. de Laet. p.* 303.
Taurus Quivirenſis. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 181. (*Fig. bona*).
Biſon Ameriquain. *Cat. App. Fig. p.* 20. (*Fig. tres bonne*).
Buffle. *Cat. Rec. des Bêtes. p.* 27.

Bovis domeſtici altitudinem non attingit. Femora & crura habet brevia & craſſa; caput amplum, ſicut & pectus, corporis poſteriore parte multò ſtrictiore ; caudam 1 pede longam, per totam longitudinem nudam, extremitate tantùm pilis longis obſitam;

Il eſt moins haut que le *Bœuf domeſtique*. Ses cuiſſes & ſes jambes ſont courtes & groſſes ; ſa tête large, ainſi que ſa poitrine; & la partie poſtérieure de ſon corps étroite : ſa queue, qui a un pied de long, n'a de poils qu'une touffe de longs crins à ſon extrémité : ſes cornes ſont groſſes à leur ra-

cine, recourbées en enhaut, & rentrantes en dedans. Il a ſur le dos une boſſe très groſſe & très élevée. La couleur de ſon poil eſt un brun noirâtre : tout ſon corps eſt couvert, en hyver ſeulement, d'un poil long & rude, qui tombe en été, & laiſſe voir une peau noire & ridée : il n'y a que la tête qui demeure velue toute l'année. Le poil qui eſt ſur le front du mâle, eſt long d'un pied, épais, & friſé. On le trouve en *Amérique*. Il ſe tient éloigné des endroits habités, & près des montagnes.

cornua in exortu craſſa, ſurſùm reflexa, introrsùm recurva ; gibbum in dorſo craſſum & elatum. Pilorum color ex fuſco nigreſcit : per hiemem tantùm corpus univerſum veſtitur pilis longiſſimis, rigidis, quos æſtate amittit, unde cutis nigra, rugoſa, detecta remanet ; caput verò per totum annum pilis longis obſitum eſt. Frons maris pilis uno pede longis, denſis, & criſpis donatur. Habitat in *Americâ* longè à locis cultis, & propè montes.

8. LE BŒUF SAUVAGE.

Bos cornibus deorsùm inflexis, jubâ ſuprà collum longiſſimâ. BONASUS.

Bos jubâ longiſſimâ, cornibus in ſe flexis. Bonaſus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 34. ſp. 2.*

Bonaſus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 71. *N°.* 4.

Geſn. Quadr. p. 145. (*caput in ea Fig. ſed cornua malè contorquentur*).

Geſn. Icon. Quadr. p. 32. [*ibi ineſt eadem capitis figura, ut ſuprà ; ſed cranium & cornua benè figurantur*].

Aldro. Quadr. Biſ. p. 358. *Fig. p.* 361. (*eædem ſunt figuræ ac in Geſn. Iconibus p.* 32.)

Jonſt. Quadr. p. 37. *Fig. T.* 18. (*Fig. bona, ſi jubam haberet*) ; *& T.* 19. (*in T.* 18 *juba caret, quod malè ; in* 19 *verò cornua malè contorquentur*).

Charlet. Exer. p. 8.

Les Grecs l'appellent Βόνασος.

Les Allemands, WILDE BUFFEL. *Geſn.*

Les Bohémiens, LONI. *Geſn.*

Les Péoniens, MONOPS. *Geſn.*

Il eſt de la grandeur du *Bœuf domeſtique* ; mais il eſt plus court, & plus large. La partie ſupérieu-

Bovis domeſtici magnitudine eſt ; ſed latior & brevior. Colli pars ſuperior, à cervi-

ce ad armos uſque, jubata eſt, ut *Equi*. Capronæ ad oculos uſque propendent. Cornua pulchrè & ſplendidè nigra ſunt, & deorsùm inflexa. Cauda brevis eſt. Color toto ferè corpore flavus. Habitat in *Pæoniâ*, monte *Meſſapo*.

re de ſon col eſt garnie, depuis la tête juſqu'aux épaules, de poils très longs : ceux du devant de la tête lui deſcendent juſqu'aux yeux. Ses cornes, qui ſont d'un beau noir, ſont recourbées en enbas. Sa queue eſt courte. Son poil eſt jaune preſque partout le corps. On le trouve en *Péonie* ſur le mont *Meſſapus*.

SECTIO II.

Ea quorum cornua ſunt ramoſa.

IN illâ Sectione unicum eſt Genus, ſcilicet *Cervinum*.

XII.

Genus Cervinum.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo :

Pes biſulcus :

Cornua ramoſa.

Obſ. In hoc Genere Ruminantium mares omnes cornua ramoſa gerunt; fœminæ verò ſunt acornes, ſi duas excipias, ſcilicet *Rangiferam fœminam*, & *Cervam Groenlandicam*.

SECTION II.

Ceux dont les cornes ſont branchues.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, qui eſt celui des *Cerfs*.

XII.

Le Genre des Cerfs.

Son caractere eſt

De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :

D'avoir le pied fourchu :

Des cornes branchues.

Obſ. Dans ce Genre de Ruminants, tous les mâles ont des cornes branchues; les femelles au contraire, ſi l'on en excepte celles du *Rhenne* & du *Cerf de Groenland*, n'ont point du tout de cornes.

** 1. Le Cerf.

Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis... Cervus.

Cervus cornibus ramoſis, teretibus, incurvis. Cervus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 31. ſp. 3.*
Faun. ſuec. Linn. No. 38.
Cervus nobilis. *Klein. Quadr. p. 23.*
Cervus. *Raj. Syn. Quadr. p. 84. No. 1.*
Aldro. Quadr. Biſ. p. 769. Fig. p. 774. (Fig. bona).
Geſn. Quadr. Fig. p. 354. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. p. 43. Fig. p. 44. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 58. Fig. T. 32. & 35. (Fig. ſat bonis).
Muſ. Worm. p. 338.
Charlet. Exer. p. 11.
Rzac. Hiſt. nat. Pol. p. 216.
Rzac. Auct. p. 308.

Les François appellent le mâle Cerf; *la femelle*, Biche; *& le jeune*, Faon.
Les Latins le mâle, Cervus; *la femelle*, Cerva; *le jeune*, Hinnulus.
Les Hébreux le mâle, Aial; *la femelle*, Aial; Aiala; aielet; *le jeune*, Ofer. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, Aiela. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes, Aial. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Ελαφος.
Les Perſes, Gevazen. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols le mâle, Ciervo; *la femelle*, Cierva. *Geſn. Aldrov.*
Les Italiens le mâle, Cervo; *la femelle*, Cerva. *Geſn. Aldrov.*
Les Allemands le mâle, Hirts, *ou* Hirs, *ou* Hirsch; *la femelle*, Hinde, *ou* Hindin; *le jeune*, Hinde Kalb. *Geſn. Aldrov. Rzac.*
Les Illyriens, Gelen. *Geſn.*
Les Polonois le mâle, Jelijenii; *la femelle*, Lanii. *Geſn. Aldro.* Jelen. *Rzac.*
Les Suédois, Hiort; Kronhiort. *Linn.*
Les Anglois, Reddéer: *ils appellent le mâle* Stagg, *ou* Hart; *la femelle*, Hind; *le jeune*, Calf. *Raj. Geſn.*

Le Cerf eſt un animal ſi connu, qu'il n'eſt pas beſoin d'en faire une ample deſcription. Il a depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, environ 3 ½ pieds, & depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 6 pieds. Ses cornes ont environ 2 ½ pieds

Cervus eſt animal ita notum, ut amplâ deſcriptione non indigeat. A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 3 ½ pedum altus eſt; ab extremitate verò oris ad caudam, 6 pedes longus. Cornua ipſius 2 ½ pedes circiter longa

ſunt, parumper ad latera incurvantur, ſuntque teretia & ramoſa, & quiſque ramus in acutum deſinit. Caput habet oblongum ; oculos & auriculas ſat magnas ; collum longum & gracile ; caudam brevem ; crura maximè gracilia. Pilus ei mollis, in dorſo ex ruffo flaveſcit ; in ventre parumper candicat. Dorſi color in fœminis, præſertim in *Hinnulis*, plerumque maculis albis variegatur. Habitat in ſylvis.

de long ; elles ſont un peu courbées ſur les côtés, & ſont rondes & branchues ; & chaque branche ſe termine en pointe. Sa tête eſt longue ; ſes yeux & ſes oreilles aſſez grandes : ſon col eſt long & effilé ; ſa queue courte ; ſes jambes très menues. Son poil eſt doux au toucher, & eſt d'un roux jaunâtre ſur le dos, & blanchit un peu ſous le ventre. La couleur du dos eſt le plus ſouvent variée de taches blanches dans les femelles, & ſur tout dans les jeunes. On le trouve dans les forêts.

2. LE CERF D'ALLEMAGNE.

Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis, collo infrà jubato.... CERVUS GERMANICUS.

Tragelaphus. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 857. *Fig. p.* 858.
Jonſt. Quadr. p. 63.
Charlet. Exer. p. 12.
Tragelaphus, ideſt, Hirco-Cervus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 1101.
Tragelaphus quorumdam. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 46. *Fig. p.* 47.
Hippelaphus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 35.
Les Allemands l'appellent BRANDHIRTS. *Geſn. Charlet.*

Præcedente major eſt. Præterea ab eo differt, quòd habeat collum pilis longis veſtitum ; & colore, qui in ſupremâ dorſi parte cinereus eſt, & in ventre nonnihil nigreſcens. Habitat in *Miſenæ* ſaltibus, *Boëmiæ* vicinis.

Il eſt plus grand que le précédent. Il en différe en outre parce qu'il a le col garni de longs poils, & par ſa couleur, qui eſt griſe ſur le dos, & un peu noire ſous le ventre. On le trouve dans les forêts de *Miſene*, proche la *Bohëme*.

3. Le Cerf de Canada.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad ſummum cute piloſâ tectis... Cervus Canadensis.

Cervus Canadenſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 84.
Klein. Quadr. p. 23.
Cerf de Canada. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 67. *Fig. Pl.* 45. (*Fig. bonne*).

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, 4 pieds. Ses cornes ſont longues de 3 pieds : elles ſont rondes & branchues, & couvertes d'un bout à l'autre d'une peau fort dure & garnie d'un poil épais & court, de même couleur que celui du corps, qui eſt d'un fauve un peu obſcur. Du reſte il reſſemble aſſez à notre Cerf. On le trouve dans le *Canada*.

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 4 pedes altus eſt. Cornua 3 pedes longa, teretia ſunt, ramoſa, ab imo ad ſummum tecta cute undique obſita pilis brevibus & denſis, ejuſdem coloris ac pili corporis, qui ſunt obſcurè fulvi. In reliquis Cervo noſtrati ſimilis eſt. Habitat in *Canada*.

4. Le Cerf de Groenland.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad ſummum cute piloſa tectis, naſo piloſo... Cervus Groenlandicus.

Caprea Goenlandica. *Raj. Syn. Quadr. p.* 90. *No.* 8.
Daim de Groenlande. *Edwards. Part.* 1. *Fig. p.* 51. (*Fig. bonne*).

Il eſt beaucoup plus épais que ne le ſont tous les Animaux de ce genre. Par la proportion de toutes ſes parties, il reſſemble plus à un *Veau*, qu'à un *Cerf*. Il a, depuis le haut des épaules juſqu'à terre, environ 3 pieds. Son col eſt beaucoup plus court, & ſes jambes plus groſſes qu'elles ne ſont ordinairement dans le genre des *Cerfs* : ſa queue eſt courte;

Multò craſſior eſt quàm alia omnia hujus generis Quadrupeda. Craſſitie ſuorum omnium partium, *Vitulo* magis ſimilis eſt, quàm *Cervo*. A parte ſuperiore humerum uſque ad terram, 3 circiter pedes altus eſt. Collum multò brevius, & crura craſſiora, quàm in Cervino genere eſſe ſolent. Cauda brevis ; oculi

ſat

ſat magni ; cornua 1 ½ pede circiter longa, teretia ſunt, ramoſa, & ſicut in precedente, tecta ab imo ad ſummum cute pilis fulvis undique obſitâ ; & (quod ei maximè ſingulare) naſus pilis undique tectus eſt, in ea etiam parte, quæ in aliis hujus generis cute nudâ & humidâ tegitur. In æſtu pili ei breves ſunt, molles & dilutè cinerei ; in hieme verò, inter hos primos proveniunt alii pili longi & rigidi, ex fulvo, fuſco, & albo variegati. Hujus ſpeciei fœmina cornigera eſt ſicut & mas. Habitat in *Groenlandiâ*.

ſes yeux aſſez grands : ſes cornes ſont longues d'environ 1 ½ pied ; elles ſont rondes & branchues, & couvertes, comme dans le précédent, d'un bout à l'autre d'une peau garnie de poils fauves. Mais ce qu'il y a de plus ſingulier, c'eſt ſon nez qui eſt tout-à-fait garni de poils, même dans cette partie qui, dans les autres n'eſt qu'une peau nue, & humide. Il eſt couvert en été d'un poil doux & court, d'un joli petit gris ; & en hyver, il ſort du fond de ce premier poil, d'autres poils longs & rudes, variés de fauve, de brun, & de blanc. La femelle de cette eſpece a des cornes comme le mâle. On le trouve dans le *Groenland*.

** 5. LE CHEVREUIL.

Cervus cornibus teretibus erectis... CAPREOLUS.

Cervus cornibus ramoſis teretibus erectis. Capreolus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 31. ſp. 6.*
Faun. Suec. Linn. N°. 41.
Cervus Minimus, Capreolus: Cervulus. Caprea. *Klein. Quadr. p.* 24.
Caprea Plinii, Capreolus vulgò. *Raj. Syn. Quadr. p.* 89. *N°.* 6.
Caprea Plinii, ſive Capreolus. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 378.
Caprea, ſive Capreolus, ſive Dorcas. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 324. & 1098. (*Fig. ſat bonis*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 48. *Fig. p.* 49. (*Fig. ſat bona*).
Caprea Plinii. *Jonſt. Quadr. p.* 54. *Fig. T.* 33. *ſub iſto nomine*, Capreolus Marinus. (*Fig. ſat bona*).
Capreolus ; Dorcas. *Muſ. Worm. p.* 339.
Dorcas. *Charlet. Exer. p.* 12.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 217.
Rzac. Auct. p. 309.
Chevreuil. *Kolbe. Tom. III. p.* 34. *Fig. p.* 4. *F.* 5.

Les Hébreux appellent le mâle ZEBI; *la femelle*, ZEBIAH; *le jeune*, OPHEN. *Geſn.*
Les Chaldéens, THABIA. *Geſn.*
Les Arabes, THABIU. *Geſn.*
Les Grecs, Δορκάδιον.
Les Perſes, AHU. *Geſn.*
Les Eſpagnols, ZORLITO, *ou* CABRONZILLO MONTES. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens le mâle, CAPRIOLO, *ou* CAVRIOLO; & *la femelle*, CAPRIOLA, *ou* CAVRIOLA. *Geſn.*
Les Allemands, REECH; *ils appellent le mâle* REECHBOCK; & *la femelle*, REECHGEISS. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, SRNA, *ou* SARNA. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, SARN; SARNA; KOZA LESNA. *Rzac.*
Les Danois, RAADIUR. *Worm.*
Les Suédois, RÅDIUR. *Linn.*
Les Anglois, ROE-DEER. *Raj.*

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, 2 pieds de haut; & depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 3 ½ pieds; ſes cornes ont 8 pouces de long; elles ſont droites, rondes & branchues; & chaque petite branche ſe termine en pointe: ſes oreilles ſont longues de 4 ½ pouces: ſa queue eſt courte. La couleur de ſes poils eſt variée de brun, de gris & de blanc ſale. Le brun domine un peu ſur le dos; & le ventre eſt tout d'un blanc ſale. On le trouve dans les forêts.

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 2 pedum altus eſt; ab extremitate oris ad caudam, 3 ½ pedum circiter longus. Cornua, 8 pollices longa, erecta ſunt, teretia & ramoſa; & unuſquiſque ramus in acumen deſinit; auriculæ 4 ½ pollices longæ; cauda brevis. Pilorum color ex fuſco, cinereo, & ſordidè candido variegatur. In dorſo magis fuſcus eſt: in ventre verò ſordidè albicat. Habitat in Sylvis.

Obſ. Les Chevreuils du Bréſil, décrits par *Marcgrave*, *Hiſt. Br. p.* 235. & *Piſon*, *Hiſt. Nat. p.* 97. ſous les noms de *Cuguacu-Eté* & *Cuguacu-Apara*, ne me paroiſſent être qu'une variété de cette eſpece, ainſi que les deux petits Cerfs citez par *Barrere*, *Hiſt. Fr. Eq. p.* 151. l'un ſous le nom de *Biche des bois*, & l'autre ſous celui de *Biche des Paletuviers*.

Obſ. Capreoli Braſiliani à *Marcgravio*, *Hiſt. Br. p.* 235. & *Piſone*, *Hiſt. Nat. p.* 97. deſcripti, ſub iſtis nominibus, *Cuguacu-Ete*, & *Cuguacu-Apara*, hujus ſpeciei varietates mihi videntur, ſicut & duo cervi à *Barrerâ*, *Hiſt. Fr. Eq. p.* 151. citati, unus ſub titulo, *Cervus major corniculis breviſſimis*; alter ſub iſto, *Cervus minor paluſtris corniculis breviſſimis*.

* 6. Le Karibou.

Cervus cornibus rectis, ad baſim ramo unico antrorsùm verſo.

Cervus Burgundicus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 35. (*Fig. ſat bona*).

Nullibi deſcriptionem ipſius inveni; caput tantummodo vidi; 14 circiter pollices longum eſt; auriculæ 4 pollices. Cornua recta 10 pollices longa, ad baſim ramo unico 2 $\frac{1}{2}$ pollices longo, antrorsùm verso donantur. Pili breves, ex fulvo fuſci, caput obtegunt. Habitat in *Canadâ*.

Je ne l'ai trouvé décrit nulle part. Je n'en ai jamais vû que la tête, qui a environ 14 pouces de long; les oreilles 4 pouces. Les cornes ſont droites, & longues de 10 pouces; elles ont à leur baſe une petite branche longue de 2 $\frac{1}{2}$ pouces, tournée vers le devant. La tête eſt couverte d'un poil court, d'un fauve rembruni. On le trouve en *Canada*.

* 7. Le Daim.

Cervus cornuum unica & altiore ſummitate palmata... Dama vulgaris.

Cervus cornibus ramoſis, compreſſis, ſummitatibus palmatis. Dama. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 31. *ſp.* 5.
*Faun. Suec. Linn. N*o. 40.
Cervus Platyceros, vel Platyceros ſimpliciter dictus; Dama vulgò. *Raj. Syn. Quadr. p.* 85. *N*°. 2.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Cervus palmatus, Dama; Dama-Cervus. *Klein. Quadr. p.* 25.
Dama. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 217.
Dama vulgaris. *Aldro. Quadr. Biſ. Fig. p.* 741. (*Fig. mala*).
Jonſt. Quadr. p. 55. *Fig. T.* 31. *ſub iſto nomine*, Dama-Cervus. (*Fig. ſat bona*).
Dama recentiorum. *Rzac. auct. p.* 308.
Dama vulgaris, ſive recentiorum. *Geſn. Quadr. p.* 335. *Fig. p.* 1100. (*Fig. bona*).
Platyceros. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 50. *Fig. p.* 51. (*Fig. bona*).
Daim. *Kolbe. Tom. III. p.* 39.
Les Eſpagnols l'appellent Gamo, *ou* Corza. *Aldrov. Geſn.*
Les Italiens, Daino, *ou* Danio. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Allemands, Damhirsch. *Raj. Jonſt. Rzac.* Dam, *ou* Damlin, *ou* Damhirts. *Geſn. Aldro.*

Les Polonois, LANII. *Geſn. Aldro.* DANIEL. *Rzac.*
Les Suédois, DOF; DOFHIORT. *Linn.*
Les Anglois, FALLOW-DÉER. *Ils appellent le mâle* BUCK; *la femelle*, DOE; *le jeune*, FAWN. *Raj.*

Il eſt beaucoup plus petit que notre *Cerf*: il en différe encore par ſes cornes, dont la plus haute branche eſt en palme, & par ſa couleur, qui eſt d'un gris jaunâtre ſur le dos, & blanche ſous le ventre; & quelquefois cette couleur griſe, ſur tout dans les jeunes, eſt variée de taches blanches.

Obſ. Cette eſpéce varie beaucoup. Les *Daims* de *Virginie* ſont plus grands & plus forts que les nôtres. Ceux d'*Eſpagne* ſont de la grandeur des *Cerfs*, mais ils ſont d'une couleur plus foncée. Il y en a d'autres qui ſont variés de différentes couleurs.

Multò minor eſt *Cervo* noſtrate, à quo etiam differt cornibus, quorum ramus excelſior palmatus eſt, & colore ex cinereo flavicante in dorſo, in ventre albo: qui color cinereus interdum, præſertim in junioribus, maculis albis variegatur.

Obſ. Hujus ſpeciei multæ ſunt varietates. *Virginianæ Damæ* majores ſunt & validiores noſtratibus. *Hiſpanicæ Cervorum* magnitudinem adæquant, & coloris ſunt obſcurioris. Dantur aliæ variis coloribus variæ.

* 8. LE RHENNE.

Cervus cornuum ſummitatibus omnibus palmatis... RANGIFER.

Cervus cornibus ramoſis, teretibus, ſummitatibus palmatis. Rangifer. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 31. ſp. 4.*
Faun. Suec. Linn. No. 39.
Cervus Rangifer. *Raj. Syn. Quadr. p. 88. N°. 4.*
Klein. Quadr. p. 23.
Cervus palmatus. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 37. (Fig. ſat bona).*
Aldro. Quadr. Biſ. Fig. p. 857. (Fig. ſat bona).
Cervus mirabilis. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 36. (Fig. ſat bona).*
Rangifer. *Aldrov. Quadr. Biſ. Fig. p. 863. (Fig. peſſima).*
Geſn. Quadr. Fig. p. 950. (Fig. peſſima).
Jonſt. Quadr. p. 64. Fig. T. 37. (Fig. peſſima).
Muſ. Worm. p. 337.
Charlet. Exer. p. 12.
Tarandus. *Aldro. Quadr. Biſ. p. 859. Fig. p. 861. (Fig. ſat bona).*
Geſn. Icon. Quadr. p. 57. Fig. p. 58. (Fig. ſat bona). & p. 59. (Fig. peſſima).
Charlet. Exer. p. 12.

Tarandus Agricolæ, & Eliotæ. *Raj.*
Machlis Plinio. *Raj.*
Les Grecs l'appellent Ιππέλαφος.
Les Allemands, REIN, *ou* REEN, *ou* REYNER, *ou* RAINGER, *ou* REINSSTHIER. *Geſn.*
Les Polonois, RENSCHERON. *Geſn.*
Les Suédois, RHEN. *Linn.*
Les Norvégeois, REINEN, *ou* REINSDIUR. *Worm.*
Les Lapons, REEN. *Geſn.*
Les Anglois, RAIN-DEER. *Raj.*

Ad magnitudinem & figuram *Cervi* quàm proximè accedit : membra tamen ipſius graciliora ſunt. Cornua magna, ramoſa, juxtà caput teretia, omnibus extremitatibus palmatis, mucronibus in extremo palmarum extantibus. Pilorum color griſeus, qui tamen ſecundùm anni tempus mutat. Hujus ſpeciei fœminæ cornigeræ ſunt, ſicut & mares ; ſed cornibus minoribus. Habitat in *Septentrionalibus regionibus.*

Il eſt à peu près de la grandeur & de la figure d'un *Cerf* : mais tous ſes membres ſont plus déliés. Ses cornes ſont grandes, branchues, rondes proche de la tête, & toutes leurs extrémités ſont en palmes terminées par des pointes. La couleur de ſon poil eſt griſe ; elle change cependant ſelon les ſaiſons. Les femelles de cette eſpece ont des cornes, mais plus petites que celles des mâles. On le trouve dans tous les pays du *Nord.*

** 9. L'ELAN.

Cervus cornibus ab imo ad ſummum palmatis... ALCES.

Cervus cornibus acaulibus palmatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 31. ſp. 2. Faun. Suec. Linn. N. 37.*
Cervus palmatus. Alce, vera & legitima. Magnum animal vulgò. *Klein. Quadr. p. 24.*
Alce. *Raj. Syn. Quadr. p. 86. No. 3.*
Aldro. Quadr. Biſ. p. 866. Fig. p. 869. & 870. (Fig. peſſimæ).
Geſn. Quadr. Fig. p. 1. (Fig. ſat bona).
Geſn. Icon. Quadr. p. 52. Fig. p. 53. (Fig. ſat bona).
Jonſt. Quadr. p. 65. Fig. T. 30. & 31. (Fig. ſat bonæ) ; in eo tamen peccant figuræ Geſneri & Jonſtoni, quod pilis ſuprà collum longiſſimis ; & carunculâ ſub mento donentur.
Muſ. Worm. p. 336.
Alces. *Charlet. Exer. p. 12.*

Alce, ſive Alces. *Rzac. auct. p.* 304.
Alce, ſeu Alces. Equicervus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 212.
Elant. *Hiſt. de l'Acad. T. III. Part. I. p.* 179. *Fig. Pl.* 25. (*Fig. tres bonne*).
Les Grecs l'appellent Αλκη.
Les Italiens, GRANBESTIA. *Rzac.*
Les Allemands, ELK, *ou* ELLEND. *Raj. Geſn. Worm. Charlet. Aldrov. Rzac.*
Les Illyriens, LOS, *ou* GELM. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, LOS. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Moſcovites, LOS. *Geſn.* LOZZOS. *Aldro.*
Les Suédois, ÆLG. *Linn.*
Les Danois, ELSDIUR. *Worm.*
Les Anglois, ELK. *Raj. Charlet.*
Les Septentrionaux, ANIMAL MAGNUM. *Hiſt. de l'Acad.*
Les Canadiens, ORIGNAL.

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cheval*. Il a la tête longue; le col court; les lévres, & ſur-tout la ſupérieure, grandes & épaiſſes; l'ouverture de la bouche grande; les oreilles longues & ſemblables à celles d'un *Ane*; la queue très courte; le derriére un peu plus élevé que les épaules; les poils très gros, & longs de 3 pouces. La couleur de tout ſon corps eſt griſe. Ses cornes ſont en palme du haut au bas, & garnies de pointes à leur côté extérieur. On le trouve dans la *Lithuanie*, la *Scandinavie*, la *Moſcovie* & le *Canada*.

Equi magnitudinem ferè attingit. Caput habet longum; collum breve; labia, præſertim ſuperiùs, magna & craſſa; oris rictum magnum; auriculas longas *Aſininis* ſimiles; caudam breviſſimam; clunes humeris parumper altiores; pilos craſſos, 3 pollices longos, cinereos. Cornua ab imo ad ſummum palmata ſunt, mucronibus aliquot in ambitu exteriori extantibus. Habitat in *Lithuaniâ*, *Scandinaviâ*, *Moſcoviâ*, & *Canadâ*.

SECTION III.

Ceux qui n'ont point de cornes.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui des QUADRUPEDES ruminants à pied fourchu, auxquels j'ai donné le nom de *Chevrotains*.

SECTIO III.

Ea quæ ſunt acornia.

IN illa Sectione unicum eſt genus, ſcilicet QUADRUPEDUM ruminantium pede biſulco, quibus *Traguli* nomen impoſui.

XIII.

Genus Traguli.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo:
Pes biſulcus:
Cornua nulla.

XIII.

Le Genre du Chevrotain.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure:
D'avoir le pied fourchu:
Point de cornes.

** 1. LE CHEVROTAIN DES INDES.

Tragulus pilis brevibus ſuprà fulvis, infrà albicantibus... TRAGULUS INDICUS.

Capra pedibus digito humano anguſtioribus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 4.*
Tragulus; Cervula parvula Africana ex Guineâ acornis. *Klein. Quadr. p. 22.*
Tragulus, ſive Hinnulus; aut Cervus juvencus pergracilis Africanus, cujus pedes auro circumcluduntur. *Klein. Quadr. p. 22.*
Cerva parvula Africana ex Guineâ, rubida, ſine cornibus. *Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. Fig. 1. (Fig. bona).*
Hinnulus, ſeu Cervus juvencus, pergracilis, Africanus. *Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. F. 2. (Fig. bona).*
Cervus juvencus, perpuſillus Guineenſis. *Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. F. 3. (Fig. bona).*
Chevre de Congo. *Kolbe. Tom. III. p. 39.*

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 7 pollicum altus eſt; à vertice ad caudam, 1 circiter pede longus. Caput 3 pollices longum; auriculæ 1 circiter pollice; cauda brevis, pilis longis diſperſiſque, ex ruffo & albo variegatis, veſtita. Diameter crurum in parte ſtrictiore 2 tantùm linearum eſt. Pilus ei brevis & fulvus in parte ſuperiore capitis,

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, 7 pouces de haut; depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, environ 1 pied. Sa tête a 3 pouces de long; ſes oreilles environ 1 pouce. Sa queue eſt courte, & garnie de poils longs & clair-ſemés, variés de roux & de blanc. Ses jambes dans l'endroit le plus menu, n'ont que 2 lignes de diamètre. Son

poil eſt court & fauve, mêlé d'un peu de brun dans la partie ſuperieure de la tête, du col & du dos. La gorge, le ventre, & l'intérieur des cuiſſes ſont blancs. Il a en tout 26 dents; ſçavoir, à la mâchoire inférieure 8 dents inciſives, dont les 2 du milieu ſont en forme de ſpatule, & les autres ſont étroites dans toute leur longueur; & 8 molaires, 4 de chaque côté: & à la mâchoire ſupérieure pareil nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côté. On le trouve en *Guinée*, & dans l'*Inde*.

colli & dorſi, ex fuſco admixtus. Guttur, venter, & femorum pars interior albeſcunt. Dentes habet 26, ſcilicet in maxilla inferiore 8 inciſores, quorum duo intermedii ſpatæformes ſunt, cæteri verò per totam longitudinem ſtrictiores; & 8 molares, 4 utrinque: in ſuperiore verò maxillâ molarium parem numerum, & inſuper caninos 2, utrinque unum. Habitat in *Guineâ* & *Indiâ*.

2. Le Chevrotain de Guinée.

Tragulus pilis longiſſimis obſcurè fulvis... Tragulus Guineensis.

Tragulus Guineenſis pilo rubro longiore. *Klein. Quadr. p.* 22.
Cervus Africanus pilo rubro. *Seb. Vol. I. p.* 73. *Fig. T.* 45. *F.* 1. (*Fig. bona*).

Il eſt de la grandeur du précédent; il en différe par ſes jambes, qui ſont plus longues; & par ſon poil, qui eſt plus long, & d'une couleur fauve beaucoup plus foncée. On le trouve vers les confins de la *Guinée*.

Præcedentis magnitudinem æquat: ab eo tamen differt cruribus longioribus; & pilo longiori, coloris fulvi longè obſcurioris. Habitat in oris *Guineæ*.

3. Le Chevrotain de Surinam.

Tragulus ex ruffo luteus, maculis albis variegatus... Tragulus Surinamensis.

Tragulus Surinamenſis ſubrubra: Cervula albis maculis notata. *Klein. Quadr. p.* 22.

Cervula

Cervula Surinamenſis ſubrubra, albis maculis notata. *Seb. vol. I. p.* 71. *Fig. T.* 44. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Præcedentes magnitudine circiter æquat. Auriculæ magnæ ſunt & longæ; cauda brevis & obtuſa. Pilus ex ruffo luteus, in dorſo & parte colli ſuperiore maculis albis variegatur. Habitat in *Surinamenſi Inſulâ.*

Il eſt à peu près de la grandeur des précedens. Ses oreilles ſont grandes; ſa queue courte & obtuſe. Son poil eſt d'un roux jaunâtre, tacheté de blanc ſur le dos & la partie ſupérieure du col. On le trouve à *Surinam.*

4. Le Chevrotain d'Afrique.

Tragulus in medio capite faſciculum piloſum erectum gerens. Tragulus Africanus.

Capra capite faſciculo tophoſo, cavitate infrà oculos. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 32. *ſp.* 10.
Capra Sylveſtris Africana Grimmii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80. *No.* 7.
Tragus, Capra Sylveſtris Africana Grimmii. *Klein. Quadr. p.* 19.

Colore eſt obſcurè cinereo. In medio capite faſciculum piloſum erectum gerit. In utroque latere, naſum inter & oculos, duas cavitates exhibet, quæ pinguem & oleoſum flavum liquorem continent, qui in nigram materiam coagulatur, odoreque inter caſtoreum & moſchum medio pollet. Habitat in *Africâ.*

La couleur de ſon poil eſt un gris foncé. Il porte au milieu du front un bouquet de poils élevé. Entre le nez & les yeux, il a de chaque côté une cavité, qui contient une liqueur jaune, graſſe & huileuſe, qui devient noire en ſe coagulant, & qui a à peu près l'odeur du muſc. On le trouve en *Afrique.*

5 Le Musc.

Tragulus ad umbilicum folliculum moſchiferum gerens. Moschus.

Animal Moſchiferum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 127.
Euſ. Nieremb. p. 184.
Tragus Moſchiferus. Moſchus. *Klein. Quadr. p.* 18.
Moſchus. *Linn. ſyſt. Nat. ed.* 6. *g.* 30. *ſp.* 1.

Moſchi Capreolus. *Geſn. Quadr. p.* 786.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 52. (*Fig. ſat bona*).
Capra Moſchi. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 743. *Fig. p.* 744 (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 55. *Fig. T.* 29. *ſub illo nomine*, Capreolus Moſchi. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 10.
Cervus odoratus aliis. *Charlet.*
Hiam, Animal Muſci. *Flor. Sin. Fig. p. Z.* (*Fig. ſat bona*).
Les Chinois l'appellent Hiam. *Boym.*
Les Italiens, Capriolo del Musco. *Geſn.*
Les Allemands, Bisemthier, *ou* Bisemreech. *Geſn.*

Il a, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, 3 pieds de long. La tête a plus d'un demi-pied; le front 3 pouces de large; les oreilles, qui reſſemblent à celles de nos *Lapins*, ſont longues de 4 pouces; les jambes de devant de 14 pouces; la queue de 2 pouces au plus. Le muſeau eſt pointu. Toute la partie ſupérieure du corps eſt couverte de poils variés, depuis leur origine juſqu'à leur extrémité, de jaune, de maron, & de blanc. La tête & les jambes ſont brunes; le ventre & le deſſous de la queue blancs. Auprès du nombril eſt une eſpece de petite bourſe, qui contient le muſc, qui a 3 pouces de long, & 2 pouces de large, & s'éléve au-deſſus du ventre d'environ 1 pouce. Elle eſt garnie de poils extérieurement, & intérieurement d'une pellicule, qui renferme le muſc, & qui eſt garnie de glandes, qui, ſelon les apparences, ſervent à en faire la ſécrétion. Il a en tout 26 dents; ſçavoir, à la mâchoi-

A vertice ad caudam, 3 pedes longus eſt. Caput ſemi pedem longitudine ſuperat. Frons 3 pollicum latus. Auriculæ *Cuniculorum* noſtratium ſimiles, 4 pollices longæ, & erectæ. Crura anteriora 14 pollices longa. Cauda 2 pollices non excedit. Os valde acutum. Corporis pars ſuperior undique tecta eſt pilis è luteis, caſtaneis, & albis portiunculis alternis, à radice ad apicem uſque, variis. Pili in capite & cruribus fuſci, ſeu brunnei, in ventre verò & ſub caudâ albi ſunt. Ad umbilicum folliculus eſt moscho continendo inſerviens, 3 pollices longus, 2 latus, à ventre ad unius circiter pollicis ſpatium protuberans. Extùs piloſus eſt; in interiore verò ſuperficie ſpecialem habet pelliculam moſchum cingentem, in quâ plures glandulæ, ad moſchi procul dubio ſecretionem inſervientes, reperiuntur. Den-

tes habet 26 ; ſcilicet in maxillâ inferiore inciſores octo, & molares totidem, 4 utrinque ; in ſuperiore verò molarium parem numerum, & inſuper caninos duos, unum utrinque. Habitat in *Sinenſi* regione.

re inférieure 8 dents inciſives, & 8 molaires, 4 de chaque côté ; & à la mâchoire ſupérieure même nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côte. On le trouve à la *Chine*.

ORDRE VI.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents inciſives aux deux mâchoires, & la corne du pied d'une ſeule piéce.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul Genre, qui eſt celui du *Cheval*.

XIV.

Le Genre du Cheval.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
La corne du pied d'une ſeule piéce.

ORDO VI.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utraque maxilla & pede ſolidungulo donata.

GENUS *Equinum* unicum eſt ad hunc Ordinem conſtituendum.

XIV.

Genus Equinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex:
Pes ſolidungulus.

**** 1. LE CHEVAL.**

Equus auriculis brevibus erectis, juba longa... EQUUS.

Equus caudâ undique ſetoſa. Equus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 1. Faun. Suec. Linn.* No. 34.
Equus domeſticus, cicuratus. *Klein. Quadr. p.* 4.
Equus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 62. No. 1.
Aldro. Quadr. Solid. p. 12. *Fig. p.* 21. (*Fig. bona*).
Geſn. Quadr. p. 442. *Fig. p.* 443. (*Fig. bona*),
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 19. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 1. *Fig. T.* 1, 2, 3, & 4. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 3.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 240.
Rzac. Auct. p. 332.
Sloane. Vol. II. p. 327.
Cheval. *Hiſt. Nat. gen. & part. ed. in-4°. Tom. IV. p.* 258. *Fig. Pl. I*; &

ed. in-12. Tom. VII. p. 372. Fig. Pl. I. [*Fig. tres bonnes*].

Les François appellent le mâle CHEVAL; *lorſqu'il eſt coupé*, CHEVAL ONGRE; *la femelle*, JUMENT; *le jeune*, POULAIN.

Les Hébreux, le mâle, SUS; *la femelle*, SUSAH. *Aldro. Geſn.*

Les Chaldéens, SUSUATHA. *Aldro. Geſn.*

Les Grecs, Ἵππος.

Les Arabes, BAIEL. *Geſn.*

Les Perſes, ASBECHA. *Geſn.*

Les Eſpagnols, & les Italiens, CAVALLO. *Aldro. Geſn.*

Les Allemands, ROSS. *Aldro. Geſn.*

Les Bohémiens, KUN. *Aldro. Geſn.*

Les Illyriens, KOBYLA. *Aldro.*

Les Polonois, KON. *Aldro. Geſn. Rzac.*

Les Suédois, HÅST. *Linn.*

Les Flamands le mâle, PEERT, *ou* HEINST; *lorſqu'il eſt coupé*, RUYN; *la femelle*, MERRI. *Aldro.*

Les Anglois, HORSE. *Aldro. Geſn.*

Equus eſt animal ità notum, ut deſcriptione non indigeat. Ampliſſimè deſcribitur in Libro cui titulus, *Hiſtoire Naturelle, Générale & Particuliere, avec la Deſcription du Cabinet du Roi, &c.* Ed. *in*-4°. *Vol. IV. p. 258. & ſeq.* & Ed. *in*-12. *Vol. VII. p. 372 & ſeq.* Habitat ubique terrarum.

Le Cheval eſt un animal ſi connu, qu'il n'a pas beſoin de deſcription. On le trouvera amplement décrit dans l'*Hiſtoire Naturelle, Générale & Particuliére, avec la Deſcription du Cabinet du Roi, &c.* Ed. *in*-4°. *Tom. IV. p. 258 & ſuiv.* & Ed. *in*-12. *Tom. VII. p. 372 & ſuiv.* On le trouve partout.

** 2. LE ZÉBRE, OU L'ANE RAYÉ.

Equus auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis tranſverſis verſicolor... ZÉBRA.

Equus lineis tranſverſis verſicolor. Zébra. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 3.*

Equus ferus genere ſuo. Zébra. *Klein. Quadr. p. 5. B.*

Zébra. *Raj. Syn. Quadr. p. 64. N°. 4.*

Euſ. Nieremb. p. 168.

Zébra Indica. *Aldro. Quadr. Solid. p. 416. Fig. p. 417.* (*Fig. ſat bona*).

Jonſt. Quadr. p. 17. Fig. T. 5. (*Fig. bona*).

Charlet. Exer. p. 4.

Ane Sauvage. *Kolbe. Tom. III. Fig. p. 22.* [*Fig. bonne*].

Les Portugais l'appellent BURRO DO MATTO. *Klein.*

Il eſt à peu près de la grandeur d'un petit *Cheval*. Ses oreilles ſont un peu plus longues que celles du *Cheval ;* ſa criniere eſt courte. Tout ſon corps eſt rayé de rayes tranſverſales, alternativement noires & jaunes dans le mâle, & alternativement noires & blanches dans la femelle. On le trouve en *Afrique*, & ſur tout au *Cap de Bonne Eſpérance*.

Equum mediocrem magnitudine circiter adæquat. Auriculas habet auriculis *Equinis* paulò longiores; jubam multò breviorem. Per totum corpus lineis tranſverſis, alternatim nigris & flavis in mare, & alternatim nigris & albicantibus in fœminâ, variegatur. Habitat in *Africâ*, & præſertim in *Cap. B. Sp.*.

** 3. L'Ane.

Equus auriculis longis, flaccidis, jubâ brevi... Asinus.

Equus caudâ extremo ſetoſâ. Aſinus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 35.
Aſinus. *Raj. Syn. Quadr. p. 63. N°. 2.*
Klein. Quadr. p. 6. A.
Aldro. Quadr. Solid. p. 295.
Geſn. Quadr. p. 3. Fig. p. 4. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 20. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 12. Fig. T. 6. [Fig. bona].
Sloane. Vol. II. p 327.
Aſinus domeſticus. *Charlet. Exer. p. 4.*
Ane. *Hiſt. nat. gen. & part. ed. in-4°. Tom. IV. p. 404. Fig. Pl. XI. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 40. Fig. Pl. I. [Fig. tres bonnes].*
Les Hébreux l'appellent Chamor. *Aldro. Geſn.*
Les Grecs, Ὄνος.
Les Perſes, Care. *Aldro. Geſn.*
Les Eſpagnols, Asno. *Aldro. Geſn.*
Les *Italiens*, Lasino. *Geſn.*
Les Allemands, Esel. *Aldro. Geſn.*
Les Illyriens, Osel. *Aldro. Geſn.*
Les Suédois, Åsna. *Linn.*
Les Anglois, Asse. *Aldrov. Geſn.*

Il eſt plus petit qu'un *Cheval* d'une taille ordinaire; il a les oreilles beaucoup plus longues, plus larges, & ordinairement pendantes : ſa criniere eſt très

Minor eſt *Equo* magnitudinis vulgaris; auriculas habet multò longiores, latiores, & flaccidas ; jubam brevem ; caudam caudâ *Equinâ* longio-

rem, in extremitate tantùm ſetoſam. Aſini color vulgaris ex cinereo griſeus eſt. Dantur etiam albi, ruffi, fuſci & nigri. Per dorſi longitudinem extenditur linea nigra, alterâ lineâ tranſversâ etiam nigrâ per ſcapulas ductâ. Hæ 2 lineæ ſimul crucem efformant. Habitat ubique, exceptis locis frigidiſſimis. Ampliſſimè deſcribitur in Libro cui titulus, *Hiſtoire Naturelle, Générale & Particuliére, &c.* Ed. *in*-4°. *Vol. IV. p.* 404 *& ſeq.* & Ed. *in*-12. *Vol. VIII. p.* 40 *& ſeq.*

courte : ſa queue eſt plus longue que celle du *Cheval*, & n'eſt garnie de crins qu'à ſon extrémité. Sa couleur la plus ordinaire eſt un gris cendré : il y en a de roux, de bruns, de blancs, & de noirs. Il a une raye ordinairement noire, qui s'étend ſur toute la longueur du dos, & qui eſt coupée tranſverſalement par une ſeconde, qui deſcend ſur les deux épaules. Ces 2 rayes enſemble forment une croix. On le trouve par tout, excepté dans les Pays froids. On le trouvera amplement décrit dans l'*Hiſtoire Naturelle, Générale & Particuliére, &c.* Ed. *in*-4°. *T. IV. p.* 404 *& ſuiv.* & Ed. *in*-12. *Tom. VIII. p.* 40 *& ſuiv.*

** 4. Le Mulet.

Equus auriculis longis, erectis, jubâ brevi... Mulus.

Equus caudâ extremo ſetoſâ. Mulus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 27. *ſp.* 2, *b.*
Faun. Suec. Linn. N°. 35. *a.*
Aſinus biformis hybridus. Mulus. *Klein. Quadr. p.* 6. *B.*
Mulus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 64.
Aldro. Quadr. Solid. p. 358.
Geſn. Quadr. p. 794. *Fig. p.* 793. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 21. [*Fig. bona*].
Jonſt. Quadr. p. 15. *Fig. T.* 6. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 4.
Sloane. Vol. II. p. 327.
Les François appellent le mâle Mulet ; *la femelle*, Mule.
Les Hébreux le mâle, Pered ; *la femelle*, Pirdah. *Geſn. Aldrov.*
Les Chaldéens, Cudana. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Ἡμίονος.
Les Arabes, Beal. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, & les Italiens le mâle, Mulo ; *la femelle*, Mula. *Geſn.*
Les Allemands, Multhier, *ou* Muleſel. *Geſn.*

Les Illyriens, MEZECK. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, MULÅSNA. *Linn.*
Les Anglois, MULE. *Geſn.*

Le Mulet n'eſt pas une eſpece certaine & conſtante qui puiſſe ſe reproduire, mais plutôt une bâtarde, qui provient d'un *Ane* & d'une *Jument*. Il reſſemble beaucoup au pere par la forme du corps, la longueur des oreilles, & la briéveté de la criniére; mais il reſſemble plus à la mere par la grandeur. Comme l'*Ane*, il a la queue longue, & qui n'a des crins qu'à ſon extrémité. Sa couleur la plus ordinaire eſt noire, ou d'un brun noir: il a, comme l'*Ane*, ſur le dos une croix d'une couleur plus foncée.

Mulus non eſt certa & conſtans animalis ſpecies; ſed hybrida, & ſpuria ab *Aſino Equam* ineunte genita, quæ ſibi ſimilem procreare nequit. Quoad formam corporis externam, auricularum longitudinem, jubæ brevitatem patri, quoad magnitudinem matri ſimilis eſt. Sicut *Aſinus* caudam habet longam, in extremitate tantùm ſetoſam. Color ipſius vulgaris eſt niger, vel ex fuſco nigreſcens. Crucem ſaturatioris coloris, ſicut *Aſinus*, in dorſo gerit.

5. L'ANE SAUVAGE.

Equus auriculis longis, jubâ brevi, pelle tuberculis parvis ſcabra... ONAGER.

Equus caudâ extremo ſetoſâ. Onager. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 2. a.*
Aſinus ſylveſtris; Aſiniferus; Onager. *Klein. Quadr. p. 7. C.*
Onagrus, ſive Aſinus ſylveſtris. *Geſn. Quadr. p. 19.*
Onager. *Raj. Syn. Quadr. p. 63. No. 3.*
Aldro. Quadr. Solid. p. 352.
Jonſt. Quadr. p. 14. Fig. T. 12. [*Fig. cornuta, quod malè*].
Charlet. Exer. p. 4.
Les Grecs l'appellent ὄναγρος.
Les Allemands, WALD EZEL. *Geſn.*
Les Anglois, WILD ASS. *Raj.*

Il reſſemble beaucoup à l'*Ane domeſtique;* il n'en différe que par les petits tubercules dont ſa peau eſt couverte. C'eſt avec cette peau que l'on fait ce que nous appellons en François le *Chagrin*.

Aſino domeſtico perquàm ſimilis eſt; in eo tantùm ab illo differt, quòd pellis ejus tuberculis parvis ſit ſcabra, quâ pelle efficitur quod Gallicè *Chagrin* vocatur.

ORDO VII.

ORDO VII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ, & pede biſulco donata.

IN hoc Ordine unicum continetur Genus, ſcilicet *Suillum* : in quo Genere dentium inciſorum numerus ſæpiſſimè variat. Hujus enim Generis QUADRUPEDA dentibus inciſoribus, maxillæ ſuperiori, modò 4, modò 5, modò 6; maxillæ verò inferiori modò 4, modò 6, modò 8 donantur. Quæ varietas in numero dentium in errorem inducere nequit, quoniam Genus iſtud unicum eſt quod *dentibus inciſoribus* in utrâque maxillâ, & ſimul *pede biſulco* donetur.

XV.

Genus Suillum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ:
Pes biſulcus.

ORDRE VII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents inciſives aux deux mâchoires, & le pied fourchu.

LE Genre des *Cochons* eſt le ſeul qui compoſe cet Ordre. Il eſt auſſi le ſeul dont le nombre des dents inciſives varie. Les QUADRUPEDES de ce genre ont à la mâchoire ſupérieure tantôt 4, tantôt 5, tantôt 6 dents inciſives; & à la mâchoire inférieure, tantôt 4, tantôt 6, & tantôt 8. Cette variété ne peut point induire en erreur, parce que ce genre eſt le ſeul qui ait des *dents inciſives* aux deux mâchoires, & en même tems le *pied fourchu.*

XV.

Le Genre du Cochon.

Son caractere eſt
D'avoir des dents inciſives aux deux mâchoires:
Le pied fourchu.

O

Obſ. 1°. Lorſque le nombre des dents inciſives eſt égal dans les deux mâchoires, il eſt de 4 ou de 6 en chacune.

Obſ. 2°. Lorſqu'il eſt inégal, le plus grand nombre eſt toujours à la mâchoire inférieure.

Obſ. 3°. Le plus grand nombre de dents inciſives n'excéde jamais l'autre que de 2 au plus, ſçavoir une de chaque côté.

Obſ. 4°. Cette variété n'eſt point propre à faire diſtinguer les unes des autres les différentes eſpéces de ce Genre; puiſque dans les individus de la même eſpéce le nombre des dents inciſives varie. J'avois cru dabord qu'elle pourroit indiquer au moins le ſexe; mais il n'en eſt rien; car j'ai obſervé pluſieurs *Cochons domeſtiques* mâles & femelles, & j'ai trouvé dans les deux ſexes indifféremment toutes ces variétés.

Obſ. 5°. Les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure ſont convergentes; & celles de la mâchoire inférieure, au moins les intermédiaires, ſont couchées obliquement, & avancent en avant.

Obſ. 6°. Tous les QUADRUPEDES de ce Genre ont le muſeau allongé, & terminé par un plan arrondi, dans lequel ſont les narines.

Obſ. 1°. Si dentium inciſorum numerus ſit æqualis in duobus maxillis, 4 ſunt vel 6 dentes in utraque.

Obſ. 2°. Si verò ſit inæqualis, maxilla inferior ſemper majore numero donatur.

Obſ. 3°. Major ille numerus dentium inciſorum minorem duobus dentibus tantùm excedit, utrinque uno.

Obſ. 4°. Varius ille dentium inciſorum numerus ad diſtinguendas inter ſe hujus generis ſpecies varias inſervire nequit: in diverſis enim ejuſdem ſpeciei individuis variat ille numerus. Ad ſexûs etiam diſtinctionem nequaquam aptus eſt; plures enim *Porcos domeſticos* mares & fœminas obſervavi, in quibus in utroque ſexu indifferenter omnes illas varietates reperi.

Obſ. 5°. Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſunt convergentes; in inferiore verò, ſaltem intermedii, obliquè inclinati & prominentes.

Obſ. 6°. Omnia hujus Generis QUADRUPEDA roſtrum habent oblongum, in planum rotundum terminatum, in quo ſunt nares.

** 1. LE COCHON DOMESTIQUE.

Sus caudatus, auriculis oblongis, acutis, caudâ piloſâ... SUS DOMESTICUS.

Sus dorſo anticè ſetoſo, caudâ piloſâ. Sus, ſeu Porcus domeſticus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp. 1. a.*
Faun. Suec. Linn. N°. 36.
Sus ſeu Porcus domeſticus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 92. N°. 1.*
Sloane. Vol. II. p. 328.

Porcus : Sus : Scropha : Verres. *Klein. Quadr. p.* 25.
Sus. *Geſn. Quadr. p.* 982. *Fig. p.* 983. [*Fig. bonis*].
Aldro. Quadr. Biſ. p. 937. *Fig. p.* 1006. [*Fig. bona*].
Sus, vel Scropha : Verres. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 24. [*Fig. bonis*].
Sus, Porcus, Scropha, Verres, & Majalis. *Jonſt. Quadr. p.* 70. *Fig. T.* 47. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 13.
Porcus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 243.
Rzac. Auct. p. 333.
Les Fançois l'appellent PORC. *Ils appellent le mâle* VERRAT ; *lorſqu'il eſt châtré*, COCHON ; *& la femelle*, TRUYE.
Les Latins, SUS. *Ils appellent le mâle* VERRES ; *lorſqu'il eſt châtré*, MAJALIS ; *la femelle*, SCROPHA ; *le jeune*, PORCELLUS.
Les Hébreux, CHASIR. *Geſn.*
Les Chaldéens, CHASIRA. *Geſn.*
Les Arabes, KANISIR. *Geſn.*
Les Grecs, Ὗς, *ou* Χοῖρος.
Les Perſes, MAR, *ou* BUK. *Geſn.*
Les Eſpagnols, PUERCO. *Geſn.*
Les Italiens, PORCO ; *le mâle*, VERRO ; *lorſqu'il eſt châtré*, PORCO CASTRATO, *ou* MAJALE ; *la femelle*, SCROPHA, *ou* TROIATA. *Geſn.*
Les Allemands, SAW, *ou* SUW ; SU ; SCHWYN, *ou* SCHWEIN. *Ils appellent le mâle*, ÆBER ; *lorſqu'il eſt châtré*, BARG ; *la femelle*, MOS, *ou* LOOSS ; *lorſqu'elle eſt châtrée*, GALTS ; *le jeune*, FÅRLE ; SEUWLE ; *lorſqu'il tette encore*, SPAN FÅRLE. *Geſn.*
Les Polonois, WIEPRZ. *Rzac.*
Les Anglois, HOG ; *le mâle*, BOAR ; *la femelle*, SOW ; *le jeune*, PIG. *Raj. Geſn.*

Sus domeſticus eſt animal ſatis notum, ut longâ deſcriptione non indigeat. Pilis rigidis, *ſetæ* vocatis, toto corpore veſtitur. Oculi ſunt exigui ; auriculæ oblongæ & acutæ. Color vulgaris albicans, interdum ex nigro variegatus.

Le Cochon eſt un animal aſſez commun, pour qu'il n'ait pas beſoin d'une longue deſcription. Tout ſon corps eſt couvert de poils roides que nous appellons *ſoyes*. Ses yeux ſont petits ; ſes oreilles oblongues & pointues. Sa couleur eſt ordinairement blanchâtre, quelquefois variée de noir.

** 2. Le Cochon de la Chine.

Sus caudatus, ventre ad terram uſque propendente, caudâ piloſâ.... Sus Sinensis.

Sus dorſo anticè ſetoſo, caudâ pilosâ. Sus Chinenſis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g* 28. *ſp.* 1. *d.*

Il eſt plus petit que le précédent; il en différe auſſi par ſes jambes courtes, & parce que ſon ventre pend preſque juſqu'à terre. Il varie en couleur. Il y en a qui ſont variés de noir & de blanc; d'autres ſont de la couleur du *Sanglier*, c'eſt-à-dire, noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre.

Præcedente minor eſt; ab illo etiam differt crurum brevitate, & ventre ferè ad terram uſque propendente. Colore variat. Dantur ex albo & nigro variegati; dantur etiam colore *Apri*, ſcilicet è nigro paululùm caneſcentes.

** 3. Le Sanglier.

Sus caudatus, auriculis brevibus, ſubrotundis, caudâ piloſâ.... Aper.

Sus dorſo anticè ſetoſo, caudâ pilosâ. Sus Agreſtis, ſive Aper. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 28. *ſp.* 1. *e.*
Faun. Suec. Linn. N°. 36.
Sus Agreſtis, ſive Aper. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 96. *N°.* 2.
Aper, Porcus ſylveſtris. *Klein. Quadr. p.* 25.
Aper ſimpliciter, vel Aper Agreſtis: Sus ferus vel ſylvaticus. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 81. *Fig. p.* 82. (*Fig. bona*).
Aper. *Geſn. Quadr. p.* 1039. *Fig. p.* 1040. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. Biſ. p. 1013. *Fig. p.* 1025. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 74. *Fig. T.* 47. & 48. [*Fig. bonis*].
Charlet. Exer. p. 13.
Aper, ſeu Verres ſylvaticus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 213.
Aper, ſeu Sus ſylvaticus. *Rzac. auct. p.* 305.
Les François appellent le mâle Sanglier; *la femelle*, Laye; *le jeune*, Marcassin.
Les Grecs l'appellent Κάπρος, *ou* Χοῖρος ἄγριος.
Les Eſpagnols, Puerco sylvestre, *ou* Puerco montes, *ou* Javali. *Geſn.*
Les Italiens, Porco Sylvatico, *ou* Cinghiale, *ou* Cinghiare. *Geſn.*
Les Allemands, Wild Schwein. *Geſn. Rzac.*
Les Illyriens, Weprz. *Geſn.*

Les Polonois, Wieprz Lesny. *Rzac.*
Les Suédois, Will-Swin. *Linn.*
Les Anglois, Wild Boar, *ou* Wild Swine. *Raj.* Bore. *Geſn.*

Suem domeſticum magnitudine circiter adæquat. Dentes habet caninos, (Gallicè *Défenſes*) multò longiores; auriculas breviores, ſubrotundas, & nigras; cujus etiam coloris ſunt & cauda & pedes. Per totum corpus veſtitur pilis rigidis, è nigro paulùm caneſcentibus. Habitat in ſylvis.

Il eſt à peu près de la grandeur du *Cochon domeſtique*. Il a les dents canines, (appellées en François, *Défenſes*) beaucoup plus longues; les oreilles plus courtes, arrondies & noires, ainſi que les pieds & la queue: tout le reſte de ſon corps eſt couvert de poils roides & noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre. On le trouve dans les forêts.

4. Le Cochon de Guinée.

Sus caudatus, auriculis longis & acuminatis, caudâ nudâ.
Sus Guineensis.

Sus dorſo ponè ſetoſo, caudâ nudâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp. 2.*
Porcus Guineenſis Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 96. No. 3.*
Porcus Guineenſis. *Klein. Quadr. p. 26.*
Jonſt. Quadr. p. 73. Fig. T. 46. [*Fig. bona*].
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 230. [*Fig. bona*].

Figurâ eſt ut noſtrates *domeſtici Sues*: ab eis tamen differt, quòd habeat auriculas longas, planè acutas, & prolongatis acuminibus; & caudam longam uſque ad talos propendentem, pilorum expertem. Setis omninò caret; ſed totum corpus tegitur pilis brevibus, ruffis ſplendentibus. Attamen versùs caudam in dorſo, & circà collum paulò longiores habet pilos. Habitat in *Guineâ*, & *Braſiliâ*.

Il a la figure de nos *Cochons domeſtiques*: Il en différe par ſes oreilles, qui ſont très longues, & terminées par une pointe longue & aiguë; & par ſa queue, qui lui deſcend juſqu'aux talons, & qui eſt tout à fait dénuée de poils. Il n'a point du tout de ſoyes; mais tout ſon corps eſt couvert de poils courts, d'un roux brillant. Il a auſſi quelques poils plus longs ſur le dos vers la queue, & vers le col. On le trouve en *Guinée*, & au *Bréſil*.

5. Le Sanglier des Indes Orientales.

Sus caudatus, dentibus caninis ſuperioribus ab origine ſursùm verſis, arcuatis, caudâ floccosâ... Aper Orientalis.

Sus dentibus duobus fronti innatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp.* 4.
Porcus Indicus, Babyrouſſa dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 96. No.* 4.
Porcus Babyrouſſa. *Klein. Quadr. p.* 25.
Babyrouſſa, ſeu Porcus Indicus. *Charlet. Exer. p.* 14.
Babyrouſſa. *Bont. Ind. Ori. Fig. p.* 61. [*Fig. mala*].
Aper Indicus orientalis, Babi Roeſa dictus. *ſeb. Vol. I. p.* 80. *Fig. T.* 50. *F.* 2. (*Fig. optimâ*).
Les Habitans de l'Iſle de Boëro l'appellent Babi-Roesa. *Seba.*

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cerf*, & il reſſemble aſſez au *Cochon* par ſa figure. Sa tête eſt oblongue & étroite; ſon muſeau long; ſes oreilles petites & pointues; ſes yeux petits; ſes jambes longues & déliées; ſa queue longue, friſée, & terminée par un bouquet de poils. Son corps eſt couvert de poils courts, laineux, & très doux au toucher: ceux qui garniſſent le dos ſont ſoyeux, & plus rudes. Sa couleur eſt ou blanchâtre, ou d'un brun mêlé de gris. Ses dents canines ſupérieures ſont ſingulieres: elles tendent vers le haut dès leur origine, & enſuite ſont courbées en arc. Lorſque l'animal eſt vieux, elles vont lui percer la peau au deſſous des yeux. Ses dents canines inférieures ſont très longues & reſſemblent aux *défenſes* des *Sangliers*. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

Cervum magnitudine circiter adæquat, & *Porcum* formâ corporis ſat benè imitatur. Caput habet oblongum & anguſtum; roſtrum prolixum; auriculas parvas, & acutas; oculos parvos; crura longa & gracilia; caudam prolixam, criſpatam, & in floccum deſinentem. Pili breves, quaſi lanei, & molliſſimi totum ejus corpus obtegunt: rigidiores tamen & magis ſetoſi ſunt qui dorſum veſtiunt. Color eſt albicans, aut fuſcus & griſeus. Dentes habet caninos ſuperiores maximè ſingulares: ab origine ſursùm vertuntur, & deindè arcuantur. Cùm ſeneſcit animal, ipſi infrà oculos cutem perforant. Canini inferiores ſunt longiſſimi, & *Aprorum* caninis (Gallicè *défenſes* dictis) ſimiles. Habitat in *Indiâ Orientali*.

6. Le Sanglier du Méxique.

Sus ecaudatus, folliculum ichoroſum in dorſo gerens... Aper Mexicanus.

Sus dorſo Cyſtifero, caudâ nullâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp. 3.*
Porcus Moſchiferus umbilicum in dorſo habens. *Klein. Quadr. p. 25.*
Sus umbilicum in dorſo habens. *Aldro. Quadr. Biſ. p. 939.*
Sus minor umbilico in dorſo. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. p. 161.*
Tajacu, ſeu Aper Mexicanus Moſchiferus. *Raj. Syn. Quadr. p. 97.*
Tajacu. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p. 98.* [*Fig. bona, ſi caudam non haberet*].
Tajacu; Caaigoara Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 229.* (*Fig. eadem, ut ſuprà*].
Porcus Americanus. *Charlet. Exer. p. 14.*
Zainus. *Jonſt. Quadr. p. 75. Fig. T. 46. ſub iſto nomine*, Zainus, S. Tajacu, Porcus Sylveſter. [*Fig. ut ſuprà*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 170. (*Fig. eadem*).
Aper Indicus, Zainus; aliis Coja-Metl. *Muſ. Worm. p. 340.*
Quauhtla Coymatl. Quapizotl. Aper Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 637.* [*Fig. bona*].
Coyametl, ſeu Quauhcoyametl. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p. 8.*
Sanglier appellé *Pecaris. Des March. Tom. III. p. 312.*
Les François de la Guiane l'appellent Cochon noir. *Barr.*
Les Mexiquains, Musk-Hog. *Klein.*

Porco domeſtico magnitudine cedit. Collum habet breve & craſſum; auriculas erectas, & acuminatas, 3 circiter pollices longas; oculos parvos; caudam nullam. Corpus undique obſitum eſt ſetis *porcinis* craſſioribus, è nigro caneſcentibus, vel è nigro & incano variegatis; quæ ſetæ in imis lateribus breviores, paulatìm longitudine augentur ad medium uſque dorſum, ubi nonnullæ 5 aut 6 digitos longæ ſunt. Ab aliis

Il eſt un peu plus petit que le *Cochon domeſtique*. Il a le col court & épais; les oreilles droites, pointues, & longues d'environ 3 pouces; les yeux petits. Il n'a point du tout de queue. Tout ſon corps eſt couvert de ſoyes plus groſſes que celles des *Cochons ordinaires*, noires, mêlées d'un peu de blanchâtre. Ces ſoyes ſont courtes vers le bas des côtés, & elles ſont de plus en plus longues à meſure qu'elles s'approchent du dos, où il y en a qui ont 5 ou 6 doigts de longueur.

Il différe principalement des autres eſpeces de ce genre par une eſpece de bourſe qu'il a ſur le dos vers la partie poſtérieure, d'où découle une liqueur d'une odeur déſagréable. On le trouve au *Mexique*, dans la *Guiane*, & au *Bréſil*.

hujus generis ſpeciebus præcipuè differt folliculo, quem versùs clunes in dorſo gerit, ex quo ingrati odoris liquor emanat. Habitat in *Mexico*, *Guianiâ*, & *Braſiliâ*.

ORDO VIII.

ORDO VIII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ, & tribus digitis ungulatis in ſingulis pedibus donata.

RHINOCEROS ſolus hunc Ordinem conſtituit.

XVI.

Genus Rhinocerotis.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo, à ſe invicem plurimùm remoti :
In ſingulis pedibus digiti tres ungulati :
Cornu in naſo.

Obſ. Uniuſcujuſque maxillæ pars anterior aliquo modo plana eſt, vel potiùs quaſi quadratim truncata ; & unuſquiſque dens inciſorius in angulis, partibus maxillarum anterioribus & lateralibus conſtitutis, ſitus eſt. Dentes caninos non habet ; ſed 12 ſunt molares in utrâque maxillâ, 6 utrinque.

ORDRE VIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents inciſives aux deux mâchoires, & trois doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul QUADRUPEDE, qui eſt le *Rhinoceros*.

XVI.

Le Genre du Rhinoceros.

Son caractere eſt
D'avoir à chaque mâchoire deux dents inciſives, très éloignées l'une de l'autre :
Trois doigts ongulés à chaque pied :
Une corne ſur le nez.

Obſ. La partie antérieure de chacune de ſes mâchoires eſt en quelque façon applatie, ou plûtôt comme coupée quarrément, & chacune des dents inciſives eſt placée à peu-près dans un des angles formés par le devant des mâchoires & leurs côtés. Il n'a point de dents canines ; mais il a à chaque mâchoire 12 dents molaires, 6 de chaque côté.

P

** 1. Le Rhinoceros.

RHINOCEROS.

Rhinoceros cornu unico conico. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 25. ſp. 1.*
Rhinoceros. *Raj. Syn. Quadr. p.* 122.
Klein. Quadr. p. 26.
Geſn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (Fig. mala).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. [Fig. mala].
Aldro. Quadr. Biſ. p. 878. Fig. p. 884. [Fig. mala].
Jonſt. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (Fig. mala).
Muſ. Worm. p. 336.
Charlet. Exer. p. 12.
Abada, ſive Rhinoceros. *Bont. Ind. Ori. p. 50. Fig. p. 51. [Fig. ſat bona, ſi digiti ungulati eſſent].*
Naricornis Catelani. *Klein.*
Rhinoceros. *Kolbe. Tom. III. p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauvaiſe).*
Porte-Corne. *Klein.*
Les Hébreux l'appellent REEM. *Geſn.*
Les Chaldéens, KARAS, *ou* KARASCH. *Geſn.*
Les Grecs, Ρίνοκερως.
Les Perſes, ELKERKEDOM. *Klein.*
Les Italiens, RHINOCEROTE. *Klein.*
Les Polonois, NOZOROZEC; ZEBATI. *Klein.*
Les Suédois, ENHÖRNING. *Linn.*
Les Habitans du Cap de B. Eſp. TUABBA; NABBA. *Klein.*
Les Indiens, SANDA BENAMET. *Geſn.* GOMELA. *Klein.*
Les Habitans de Java, ABADA; NOEMBA. *Klein.*

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, environ 6 pieds; depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 12 pieds: le tour de ſon corps eſt égal à ſa longueur. Sa tête eſt oblongue; ſes yeux petits; ſes oreilles ſemblables à celles d'un *Cochon*: ſa lévre ſupérieure, qu'il peut étendre & retirer à volonté, eſt beaucoup plus longue que l'inférieure, & pointue. Il porte une corne ſur le nez; (Quelques Au-

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 6 pedes circiter altus eſt; ab extremitate oris ad caudam, 12 pedes circiter longus: ambitus corporis longitudini æqualis. Caput habet oblongum; oculos parvos; auriculas *porcinis* ſimiles; labium ſuperius, quod extendere & contrahere poteſt, inferiore multò longius, & valdè acutum; in naſo cornu unum, (quandoque duo, ſecundùm Authores quoſ-

dam) ; caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigreſcit, eſtque admodum rugoſa, cum profundis plicaturis in collo, dorſo, lateribus & cruribus. Pilos non habet, niſi in caudâ, & auriculis. Habitat in *Africæ* deſertis, inque regnis *Bengalæ*, & *Patanæ* *Aſiæ*.

teurs prétendent qu'il en a quelquefois deux). Sa queue eſt longue de 2 pieds. Sa peau eſt d'un gris preſque noir, très raboteuſe, avec des plis conſidérables au col, ſur le dos, aux côtés, & aux jambes. Il n'a des poils qu'aux oreilles, & à la queue. On le trouve dans les déſerts de l'*Afrique*, & dans les Royaumes de *Bengale*, & de *Patane* en *Aſie*.

ORDRE IX.

LES QUADRUPEDES

Qui ont deux dents inciſives à chaque mâchoire, & quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul QUADRUPEDE, qui eſt le *Cabiai*.

XVII.

Le Genre du Cabiai.

Son caractere eſt.

D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:

Quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Obſ. Il n'a point de dents canines; mais ſes dents molaires ſont ſingulieres: il en a 8 à chaque mâchoire, 4 de chaque côté, chacune deſquelles équivaut à trois; car elles ſont fendues à demi, chacune en trois parties, & repréſentent 3 dents attachées les unes aux autres.

ORDO IX.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ duobus, & quatuor digitis ungulatis in pedibus anticis, & tribus in poſticis donata.

UNICUM QUADRUPEDEM continet hic Ordo, ſcilicet, *Hydrochærum*.

XVII.

Genus Hydrochæri.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:

Quatuor digiti ungulati in pedibus anticis, & tres in poſticis.

Obſ. Dentibus caninis caret. Dentes verò molares maximè ſunt ſingulares: 8 ſunt in quâlibet maxillâ, 4 utrinque: unuſquiſque dens tribus æquivalet dentibus; tripartitus enim eſt ſecundùm dimidiam altitudinem, treſque dentes inſeparabiles repræſentat.

1. Le Cabiai.

HYDROCHŒRUS.

Capybara Braſilienſibus: Porcus fluviatilis, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 126.
Capybara Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 230. (*Fig. bona*).
Capybara. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 99. (*Fig. bona*).
Porcus fluviatilis. *Jonſt. Quadr. p.* 73. *Fig. T.* 60. (*Fig. bona*).
Sus maximus paluſtris. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 160.
Cochon d'eau. *Des March. T. III. p.* 314.
Les Européens de la Guiane l'appellent COCHON D'EAU. *Des March.*
Les Guianois, CABIAI, & CABIONARA. *Barr.*
Les Indiens, CAPYBARA. *Des March.*

Bimum *Porcum* magnitudine circiter exæquat. Longitudo corporis, à capite ad anum, circiter 2 pedum eſt. Caput 7 aut 8 pollices longum, & totidem ferè craſſum; os craſſum & obtuſum; maxilla inferior ſuperiore brevior; oculi magni nigri; auriculæ parvæ, parumper acutæ. Barbam habet *felinam*, pilis longis & rigidis compoſitam: caudâ caret. In ſingulis pedibus anterioribus quatuor habet ungulas, quarum media longior eſt, duæ laterales breviores, & quarta minima; in poſterioribus verò pedibus tres tantùm ungulas, quarum media aliis longior. Pilus totius corporis fuſcus eſt, rigidus, brevis, & denſus. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cochon* de 2 ans. Il a, depuis la tête juſqu'à l'anus, environ 2 pieds. Sa tête a 7 à 8 pouces de longueur, & preſque autant d'épaiſſeur: ſon muſeau eſt gros & obtus; la mâchoire inférieure plus courte que la ſupérieure; ſes yeux grands & noirs; ſes oreilles petites & pointues. Il a des mouſtaches longues & dures, comme celles d'un *Chat*: il n'a point de queue. Il a à chaque pied de devant 4 ongles: celui du milieu eſt le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatriéme le plus petit; & aux pieds de derriere trois ſeulement, dont le milieu eſt plus long que les deux autres. Tout ſon corps eſt couvert d'un poil brun, rude, court, & aſſez épais. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

ORDRE X.

LES QUADRUPEDES

Qui ont dix dents inciſives à chaque mâchoire, & quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

CET Ordre ne contient qu'un ſeul QUADRUPEDE, ſçavoir le *Tapir* ou *Manipouris*.

XVIII.

Le Genre du Tapir, ou Manipouris.

Son caractere eſt
D'avoir dix dents inciſives à chaque mâchoire :
Quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Obſ. La partie anterieure de chaque mâchoire ſe termine en pointe, & eſt garnie de 10 dents inciſives : il n'a point de dents canines ; mais il en a dix grandes molaires à chaque mâchoire, 5 de chaque côté, un peu diſtantes des inciſives : ce qui fait en tout 40 dents.

ORDO X.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ decem, & quatuor digitis ungulatis in pedibus anticis, & tribus in poſticis donata.

UNICUM eſt in hoc Ordine QUADRUPES, ſcilicet *Tapirus*.

XVIII.

Genus Tapiri.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ decem :
Quatuor digiti ungulati in pedibus anticis, & tres in poſticis.

Obſ. Maxillæ ambæ anteriùs faſtigatæ ſunt, & in qualibet decem ſunt dentes inciſores ; canini nulli ; molares 10, quinque utrinque, magni, ab inciſoribus diſtantes. Summa dentium 40.

1. Le Tapir, ou Manipouris.

Tapirus.

Tapiierete Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 126.
Klein. Quadr. p. 36.
Jonſt. Quadr. p. 74.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 229. (*Fig. bona*).
Tapiierete. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 101. (*Fig. bona*).
Sus aquaticus multiſulcus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 161.
Les Portugais l'appellent Anta. *Raj. Jonſt. Marcgr. Piſon.*
Les Guianois, Tapir ; Maypoury, *ou* Manipouris. *Barr.*

Magnitudine *Juvencum* ſemeſtrem exæquat. Figurâ corporis quodammodo ad *Porcum* accedit ; capite tamen craſſiori, oblongo, ſuperiùs in acumen deſinente ; labio ſuperiore quàm inferius multò longiore, præeminente, fiſſuris oblongis donato, quodque validiſſimo nervo contrahere & extendere poteſt. Oculos habet parvos *porcinos* ; auriculas obrotundas, majuſculas ; caudam breviſſimam, conicam, pilis nudam ; crura vix *porcinis* longiora, at craſſiuſcula ; in anterioribus pedibus quatuor ungulas nigricantes, quarum media longior eſt, duæ laterales breviores, & quarta exterior minima ; in poſterioribus verò pedibus tres tantùm ungulas, quarum media aliis longior. Pili breves ſunt : color ipſorum in junioribus eſt umbræ lucidæ, maculis albis

Il eſt de la grandeur d'un *Veau* de 6 mois. Quant à la figure du corps, il approche de celle d'un *Cochon* ; il a cependant la tête plus groſſe, oblongue, & dont la partie ſupérieure ſe termine en pointe. La lévre ſupérieure, qu'il peut étendre & contracter à volonté, eſt beaucoup plus longue que l'inférieure, très élevée, & comme garnie de ſillons dans ſa longueur. Il a de petits yeux de *Cochon* ; des oreilles arrondies, aſſez grandes ; la queue très courte, conique & dénuée de poils ; les jambes à peu près de la longueur de celles d'un *Cochon*, mais un peu plus groſſes : il a à chacun des pieds de devant 4 ongles noirâtres ; celui du milieu eſt le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatriéme, qui eſt extérieur, le plus petit ; & aux pieds de derriere 3 ſeulement, dont le milieu eſt plus long que les deux autres. Son poil eſt court : dans

les jeunes ; il eſt de couleur d'ombre brillante, variée de taches blanches ; & dans les adultes il eſt brun, ou noirâtre, ſans taches. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

variegatus ; in adultis fuſcus ; ſive nigricans, ſine maculis. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

ORDO XI.

ORDO XI.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ, & quatuor digitis ungulatis in ſingulis pedibus donata.

HIc Ordo, ſicut & tres præcedentes, unico QUADRUPEDE conſtituitur, ſcilicet *Hippopotamo.*

XIX.

Genus Hippopotami.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ quatuor; ſuperiores per paria remoti; inferiores rectè antrorsùm prominentes, intermedii lateralibus multò longiores:

In ſingulis pedibus digiti quatuor ungulati.

Obſ. Hippopotami dentium numerus 44; ſcilicet inciſores 8, 4 in utrâque maxillâ; canini 4, duo utrinque; omnes cilindrici: canini oblique truncati: molares 32, octo utrinque in utrâque maxillâ.

ORDRE XI.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents inciſives aux deux mâchoires, & quatre doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans les trois précédents, qu'un ſeul QUADRUPEDE, ſçavoir *l'Hippopotame.*

XIX.

Le Genre de l'Hippopotame.

Son caractere eſt

D'avoir à chaque mâchoire quatre dents inciſives; dont les ſupérieures ſont ſéparées par paires, & les inférieures avancent en avant parallélement à la mâchoire, & les deux du milieu ſont beaucoup plus longues que celles des côtés:

Quatre doigts ongulés à chaque pied.

Obſ. L'Hippopotame a en tout 44 dents, ſçavoir 8 inciſives, 4 à chaque mâchoire; 4 canines, 2 de chaque côté; toutes ces dents ſont cilindriques: les canines ſont comme coupées en biſeau: 32 molaires, 8 de chaque côté à chaque mâchoire.

* 1. L'HIPPOPOTAME.

HIPPOPOTAMUS.

Hippopotamus. Bupotamus. *Klein. Quadr. p.* 34. *Fig. T.* 3. (*Fig. mala*).
Hippopotamus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 123.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 26. *ſp.* 1.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 82. (*Fig. peſſima*).
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 354. (*Fig. eadem, ut ſuprà*).
Geſn. Piſc. Fig. p. 494. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 181. *Fig. p.* 183. & 184. [*Fig. ſat bonis*].
Jonſt. Quadr. p. 76. *Fig. T.* 49. (*Fig. peſſimis*).
Bell. de Aquat. p. 22. *Fig. p.* 23. [*Fig. mala*].
Charlet. Exer. p. 14.
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 246. *Fig. T.* 23. (*Fig. ſat bona*).
Hippopotamus Antiquorum. *Colum. Aquat. p.* 28. *Fig. p.* 30. (*Fig. bona*).
Caballus marinus. *Flor. Sin. p. I. Fig. T. I.* (*Fig. bona, exceptis pedibus*).
Cheval marin, ou Hippopotame. *Kolbe. Tom. III. p.* 27. *Fig. p.* 64. *F.* 1. (*Fig. mauv.*).
Bomarin. *Klein.*
Les Grecs l'appellent Ἱπποποταμος.
Les Egyptiens, FORAS FLEBAR. *Aldrov.*
Les Chinois, HAYMA. *Flor. Sin.*
Les Suédois, BEHEMOT. *Linn.*

Il a, depuis la tête juſqu'à la queue, 13 pieds de long : le diametre vertical de ſon corps a 3 ½ pieds, & le diametre horizontal 4 ½ pieds. Le tour de ſon corps eſt de 13 pieds. Sa tête a 2 ½ pieds de large, & 3 pieds de long ; l'ouverture de la bouche 1 pied ; ſes jambes 3 ½ pieds de long depuis le ventre juſqu'à terre, & 3 pieds de tour. Son muſeau eſt gros & charnu ; ſes yeux petits ; ſes oreilles minces, & longues de 3 pouces. Sa queue, qui a un pied de long, eſt groſſe à ſon origine, & ſe termine tout à coup en pointe.

Longitudo corporis, à capite ad caudam, 13 pedum eſt : corporis diameter verticalis 3 ½ pedum, diameter horizontalis 4 ½ pedum. Ambitus corporis longitudini æqualis ; caput 2 ½ pedes latum, 3 pedes longum ; oris rictus 1 pedem ; crura à terrâ ad ventrem 3 ½ pedes longa ; crurum ambitus 3 pedes. Roſtrum craſſum & carnoſum ; oculi parvi ; auriculæ 3 uncias longæ, & tenues. Cauda 1 pede longa, ab origine craſſa, & ſtatim in acutum deſinens. Cutis admodum

craſſa, dura, & colore obſcuro. Pilos non habet, niſi in extremitate caudæ, & in roſtro, in quo eſt barba *Leoninæ* & *Felinæ* ſimilis. Habitat in *Africâ*, & in *Indo Indiæ* fluvio.

Sa peau eſt très épaiſſe, dure, & d'une couleur obſcure. Il n'a point de poil, excepté au bout de la queue, & au muſeau, où il a une mouſtache pareille à celle des *Lions* & des *Chats*. On le trouve en *Afrique*, & dans l'*Inde* ſur le fleuve *Indus*.

ORDRE XII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont deux dents inciſives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

LE plus grand nombre des QUADRUPEDES de cet Ordre n'a point de dents canines; quelques uns en ont. Parmi les uns & les autres, il y en a qui ont des piquans ſur le corps, les autres n'ont que du poil. Ils ſe diviſent en quatre Sections. La premiere contient ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquans ſur le corps, comme le *Porc-Epic*. La ſeconde ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans ſur le corps, mais qui l'ont ſeulement couvert de poils, comme le *Caſtor*, le *Liévre*, le *Rat*, &c. La troiſiéme ceux qui ont des dents canines, & qui n'ont point de piquans ſur le corps, comme la *Muſaraigne* : & la quatriéme ceux qui ont des dents canines, & des piquans ſur le corps, comme le *Hériſſon*.

ORDO XII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ duobus, & digitis unguiculatis donata.

PLeraque hujus Ordinis QUADRUPEDA dentibus caninis carent; quædam verò illis dentibus donantur. Ex utriſque quædam habent corpus aculeatum, vel aculeis tectum, alia ſunt corpore tantummodò piloſo. In quatuor Sectiones dividuntur. Prima continet ea quæ dentibus caninis carent, quæque corpus aculeatum habent, ſicut *Hyſtrix*. Secunda ea quæ nec dentes caninos, nec corpus aculeatum, ſed tantummodò piloſum habent, ſicuti *Caſtor*, *Lepus*, *Mus*, &c. Tertia ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis deſtitutum habent, ut *Muſaraneus*. Quarta denique ea quæ dentes caninos habent, & corpus aculeatum, vel aculeis tectum, ſicut *Erinaceus*.

SECTIO I.

Ea quæ dentibus caninis carent; quæque corpus aculeatum habent.

UNICO Genere, ſcilicet *Hyſtricis*, conſtituitur hæc Sectio.

XX.

Genus Hyſtricis.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:

Canini nulli:

Digiti unguiculati:

Corpus aculeatum.

Obſ. Omnium hujus Generis ſpecierum dentes inciſores contigui ſunt & cultrati.

SECTION I.

Ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquants ſur le corps.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Porc-Epic.*

XX.

Le Genre du Porc-Epic.

Son caractere eſt

D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire :

Point de dents canines :

Les doigts onguiculés :

Des piquans ſur le corps.

Obſ. Les dents inciſives de toutes les eſpéces de ce Genre ſont contigues & tranchantes.

** 1. LE PORC-EPIC.

Hyſtrix, capite criſtato... HYSTRIX.

Hyſtrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 17. ſp. 1.*

Hyſtrix. *Geſn. Quadr. p.* 631. *Fig. p.* 632. (*Fig. bona, exceptis dentibus*).

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 87. (*Fig. eadem, ut ſuprà*).

Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p. 471. *Fig. p.* 474. (*Fig. at bona*).

Jonſt. Quadr. p. 119. *Fig. T.* 68. (*Fig. bona*).

Raj. Syn. Quadr. p. 206.

Charlet. Exer. p. 19.

Muſ. Worm. p. 335.

Hyſtrix Orientalis criſtata. *Seb. Vol. I. p.* 79. *Fig. T.* 50. *F.* 1. [*Fig. bona*].

Acanthion criſtatus. *Klein. Quadr. p.* 66.

Porc-Epic. *Kolbe. T. III. p.* 44. *Fig. p.* 64. *F.* 2. [*Fig. bonne*].

Hiſt. de l'Acad. T. III. Part. 2. *p.* 33. *Fig. Pl.* 41. (*Fig. bonne*).

Les Grecs l'appellent ὕϛριξ.
Les Eſpagnols, PUERCO-ESPIN. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, HISTRICE, *ou* PORCO SPINOSO. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, PORCUPINE. *Raj.* PORTEPYNE. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, PORCO SPINO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, MEERSCHWEYN; DORNSCHWEYN; STACHELSCHWEYN; PORCOPICT; TARAN. *Geſn.*
Les Suédois, PIGG SWIN. *Linn.*

Il a 2 ½ pieds de long, depuis le muſeau juſqu'à l'anus. Ses jambes ſont fort courtes : celles de devant n'ont que quatre pouces depuis le ventre juſquà terre, & celles de derriere *6*. Sa tête a 5 pouces de long. Sa lévre ſupérieure eſt fendue comme celle d'un *Liévre* : ſes yeux ſont petits ; ſes oreilles reſſemblent à celles de l'homme. Il n'a point de queue. Il a à chaque pied 5 doigts (*a*) : il y en a un de ceux de devant qui eſt fort petit, & dont il n'y a que l'ongle qui paroît au dehors. Le dos & les côtés ſont couverts de piquans un peu courbés comme des alênes, pointus, de différentes longueurs & différentes groſſeurs, variés de blanc, & de brun noirâtre. Il y en a de tout à fait blancs. Les plus gros ſont les moins longs ; ils ont depuis *6* juſqu'à 12 pouces : les autres ont 15 pouces, & ſont flexibles. Il

(*a*) Pluſieurs Auteurs ne lui donnent que 4 doigts aux pieds de devant. J'ai vû au *Cabinet du Roi* 2 ſquéletes de cet Animal, dont un avoit 5 doigts aux pieds de devant, & l'autre n'en avoit que 4.

Longitudo corporis, ab ore ad anum, 2 ½ pedum eſt. Crura breviſſima ; anteriora à ventre ad terram 4 tantùm pollices, poſteriora verò *6* longa ſunt. Caput 5 pollices longum. Labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum : oculi parvi : auriculæ auriculis humanis ſimiles : cauda nulla. In ſingulis pedibus 5 ſunt digiti (*a*), quorum unus pedum anteriorum minimus, ungue tantummodò exteriùs apparente. Dorſum & latera teguntur aculeis ad inſtar ſubularum parumper incurvis, acuminatis, longitudine & craſſitie variis, ex nigro, fuſco, & albo diſtinctis : dantur etiam omninò albi. Craſſiores longitudine ſunt minores ; *6* inter & 12 pollices longi ſunt ; tenuiores verò 15 pollicum longitudinem attingunt, & flexibiles ſunt. In

(*a*) Secundùm Authores plurimos 4 ſunt tantùm in pedibus anterioribus digiti. 2 Hyſtricis ſceleta in *Muſeo Regio* vidi, quorum alter in pedibus anterioribus 5 digitis, alter verò 4 tantùm donabatur.

parte poſteriore capitis & colli pulchra eſt quaſi criſta, conflata plurimis aculeis tenuiſſimis, & flexibilibus, ſetis *Apri* ſimilibus, longitudine inæqualibus, aliis unius pedis, aliis minùs longis; quorum medietas versùs originem alba eſt in aliquibus, alterâ medietate cinereâ, in aliis verò viceversâ. Pectus & venter ſimilibus ornantur ſetis. Habitat in *Africâ*, *Sumatrâ*, & *Javâ*.

a ſur le derriere de la tête & du col une eſpece de panache, formée de quantité de piquans fort déliés & flexibles, aſſez ſemblables aux ſoies du *Sanglier*, & de longueur inégale, quelques uns ayant un pied de long, dont la moitié vers la racine eſt blanche dans quelques uns & le reſte gris, & dans d'autres tout au contraire. La poitrine & le ventre ſont couverts de ſoyes à peu près pareilles. On le trouve en *Afrique*, à *Sumatra*, & à *Java*.

2. Le Porc-Epic de la Nouvelle Espagne.

Hyſtrix aculeis apparentibus, caudâ brevi & craſsâ... Hystrix Novæ Hispaniæ.

Hoitzlacuatzin, ſeu Tlacuatzin ſpinoſum. Hyſtrix Novæ Hiſpaniæ. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 322. (*Fig. ſat bona*).
Hoitzlaquatzin. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 154. (*Fig. ſat bona*).

Canis mediocris magnitudinem adæquat. Totum corpus, exceptis ventre & cruribus, tegitur aculeis peracutis, 3 pollices longis, tenuibus, candentibus & luteis, ſed mucronibus nigricantibus; pilis tamen quibuſdam mollibus, atris, ſed circa exortum candentibus, ſi caput excipias, intermixtis. Cauda brevis eſt & craſſa, aculeorum à media parte uſque ad extremum expers. Hæc caudæ medietas, ſicut & venter & crura, pilis tantùm teguntur nigris. Habitat in *Novâ*

Il eſt de la grandeur d'un *Chien* d'une moyenne taille. Tout ſon corps, excepté le ventre & les jambes, eſt couvert de piquans très aigus, longs de 3 pouces, menus, variés de blanc & de jaune, avec la pointe noire. Parmi ces piquans, exceptez à la tête, ſont quelques poils noirs, terminés par un peu de blanc, & doux au toucher. La queue eſt courte & groſſe; elle n'a point de piquans depuis la moitié de ſa longueur juſqu'à ſon extrémité: cette partie eſt ſeulement couverte de poils noirs, ainſi que le ventre & les jambes. On le trou-

ve dans la *Nouvelle Eſpagne*, le plus ſouvent ſur les montagnes.

Hiſpaniâ, ac montoſis gaudet locis.

3. Le Porc-Epic de la Baye de Hudson.

Hyſtrix aculeïs ſub pilis occultis, caudâ brevi & craſsâ... Hystrix Hudsonis.

Cavia Hudſonis. *Klein. Quadr. p.* 51.
Porc-Epic de la Baye de Hudſon. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p.* 56. *Fig. p.* 58. (*Fig. bonne*).
Edwards. Tom. I. Fig. p. 52. (*Fig. bonne*).
Porc-Epic de l'Amérique Septentrionale. *Cat. App. p.* 30.

Il reſſemble beaucoup au *Caſtor* par ſa taille & ſa groſſeur. Sa tête eſt allongée, comme celle d'un *Liévre*. Il a le nez plat, & tout à fait couvert de poils courts; les oreilles très courtes, & qui paroiſſent à peine au-deſſus de la fourrure; les jambes courtes; des ongles longs & pointus, 4 aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; la queue d'une longueur médiocre, & aſſez groſſe, plus épaiſſe vers le corps qu'à ſon extrémité, qui eſt blanche en deſſous. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un brun obſcur, aſſez doux au toucher, longs de 4 pouces, plus courts cependant autour de la tête & proche des pattes, & un peu plus longs ſur le derriere de la tête. Sous ces poils ſur la partie ſupérieure de la tête, du corps & de la queue, ſont cachés des piquans blancs, dont les pointes ſont noires & très aiguës, & dont les plus

Quoad magnitudinem & craſſitiem *Caſtorem* æmulatur. Caput habet oblongum, *Leporis* capiti ſimile; naſum planum, pilis brevibus omninò tectum; auriculas breviſſimas, ſub pilis ferè occultas; crura brevia; digitos 4 in pedibus anterioribus, 5 in poſterioribus, longis & acutis unguibus munitos; caudam mediocris longitudinis, & craſſam, craſſiorem tamen ad originem quàm in extremitate, quæ infrà eſt alba. Per univerſum corpus veſtitur pilis ſordidè fuſcis, parumper mollibus, 4 pollicum longis, brevioribus tamen circà caput & propè crura, & paulò longioribus in parte capitis poſteriore; ſub quibus pilis in parte ſuperiore capitis, corporis & caudæ, occultantur aculei candentes, mucronibus nigris & peracutis, quorum majores

3 pollices

3 pollices æquant. Præter prædictos pilos molles, quidam ſunt intermixti multò longiores, rigidi, & rari, ſordidè albo terminati; quibus ope quibuſdam in locis aliquid cinerei apparet. Habitat in freto *Hudſonis*, & etiam in omni *Americæ Septentrionali regione.*

longs le ſont de 3 pouces. Outre ces poils doux, il y en a quelques uns de beaucoup plus longs, roides & clair-ſemés, dont le bout eſt d'un blanc ſale; ce qui fait paroître la fourure un peu griſâtre en quelques endroits. On le trouve à la *Baye de Hudſon*, & même dans toute la partie *Septentrionale* de l'*Amérique*.

4. Le Porc-Epic d'Amerique.

Hyſtrix caudâ longiſſimâ, tenui, medietate extremâ aculeorum experte... HYSTRIX AMERICANUS.

Hyſtrix pedibus tetradactylis, caudâ exſertâ prehenſili ſeminudâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 17. ſp. 2.*
Hyſtrix Americanus. *Raj. Syn. Quadr. p. 208.*
Hyſtrix minor leucophæus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 153.*
Cuandu. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 60. (Fig. bona).*
Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p. 99. (Fig. bona).
Cuandu Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 233. (Fig. bona).*
Chat épineux. *Des March. T. III. p. 303.*
Les Portugais l'appellent OURICO CACHEIRO. *Piſon. Marcgr. Des March.*
ESPINHO. *Piſon.*
Les Indiens, CUANDU. *Des March.*
Les Habitans de la Guiane, GOUANDOU. *Barr.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad initium caudæ, 1 pedis eſt; caudæ autem 1 pedis & 5 pollicum; crurum anteriorum circiter 4 pollicum, poſteriorum paulò major. Caput habet parvum; roſtrum oblongum; oculos rotundos, prominentes, inſtar carbunculi, fulgidos; auriculas parvas, ſub aculeis ferè latitantes; nares patentes; pedes pedibus *Simiarum*

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à la queue, eſt d'environ 1 pied; celle de ſa queue d'un pied 5 pouces; celle des jambes de devant d'environ 4 pouces, & celle des jambes de derriere un peu plus. Sa tête eſt petite; ſon muſeau allongé; ſes yeux ronds, élevés & brillants comme des charbons ardents; ſes oreilles petites & preſque cachées ſous les piquans; les narines ouvertes. Ses pieds

approchent de ceux du *Singe* ; il n'a cependant que 4 doigts à chaque pied, & point de pouce. Tout ſon corps, exceptez ſes pieds, eſt couvert de piquans de 3 ou 4 pouces de longueur, jaunes depuis leur origine juſqu'à la moitié de leur longueur, l'autre moitié noire ou d'un brun roux, terminée par une pointe blanche & très aiguë. Les piquans qui couvrent la tête & les jambes, ſont moins longs. Il a autour des narines des poils longs de 3 ou 4 pouces, qui lui font une barbe ſemblable à celle des *Chats*. Sa queue n'a des piquans que depuis ſon origine juſqu'à la moitié de ſa longueur; l'autre moitié n'eſt couverte que de quelques poils ſemblables aux ſoyes de *Cochon*, & très clair-ſemés. On le trouve en *Amérique*.

ferè ſimiles, ſed 4 tantummodò digitis conſtantes ; nam pollice caret. Totum corpus, pedibus exceptis, munitum eſt aculeis 3 aut 4 pollicum longis, ab inſitione in cutem ad dimidiam ferè longitudinem flaveſcentibus, alterâ medietate nigrâ, aut ex rufo fuſcâ, cuſpide albo & peracuto. Aculei, quibus caput & crura cooperiuntur, minore longitudine donantur. Pilos habet circum nares 3 aut 4 pollicum longos, qui barbam *felinam* ipſi faciunt. Cauda, ab exortu ſuo ad medietatem tantùm, aculeis munitur, alterâ medietate raris ſetis, *Porcorum* inſtar, obſitâ. Habitat in *Americâ*.

5. Le Grand Porc-Epic d'Amerique.

Hyſtrix caudâ longiſſimâ, tenui, medietate extrema aculeorum experte... Hystrix Americanus major.

Hyſtrix longiùs caudatus, brevioribus aculeis. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 153.
Hyſtrix. *Bont. Ind. Ori. Fig. p.* 54. (*Fig. bona*).
Cuandu major. *Piſon. Hiſt. Nat. p.* 324. *Fig. p.* 325. (*Fig. bona*).
Les Portugais l'appellent Orico Cachero, & Espinho. *Piſon.*

Il ne différe du précédent, que parce qu'il eſt plus grand. On le trouve auſſi en *Amérique*.

Magnitudine tantùm, quâ eum antecellit, à præcedente differt. Habitat etiam in *Americâ*.

6. Le Porc-Epic des Indes Orientales.

Hyſtrix caudâ longiſſimâ, aculeis undique obſitâ, in extremo panniculatâ... Hystrix Orientalis.

Hyſtrix pedibus pentadactylis, caudâ exſertâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 15. ſp. 3.*

Porcus aculeatus ſylveſtris, ſive Hyſtrix Orientalis ſingularis. *Seb. Vol. I. p. 84. Fig. T. 52. F. 1. (Fig. optima).*

Acanthion caudâ prælongâ acutis pilis horridâ, in exitu quaſi panniculatâ. *Klein. Quadr. p. 67.*

Corpus habet craſſum & breve; caput craſſum; labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum; oculos magnos ſplendentes; auriculas parvas, rotundas, intùs omninò nudas; barbam pilis longis & acutiſſimis conflatam. In ſingulis pedibus 5 digitis, unguibus craſſis & acuminatis munitis, donatur. Pedes poſteriores anterioribus ſunt longiores, & *Urſinis* ſimiles. Totum corpus, ad extremos uſque pedes, tenuiſſimis & acutiſſimis munitum eſt aculeis, quorum, qui ſupinam corporis partem veſtiunt, varios reflectunt colores, pro vario, quo lucis radii incidunt, modo. Caudam habet longiſſimam, undique obſitam aculeis, quorum, qui extremitatem caudæ cooperiunt, maximè ſingulares ſunt; ex nodis enim veluti articulatis conflati videntur. Horum aculeorum ſinguli non unius ſunt

Il a le corps gros & court; la tête groſſe; la lévre ſupérieure fendue, comme celle d'un *Liévre*; les yeux grands & brillants; les oreilles petites, rondes, & nues intérieurement; une mouſtache compoſée de poils longs & très pointus. Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles gros & aigus. Ses pieds de derriere ſont plus longs que ceux de devant, & reſſemblent à ceux de l'*Ours*. Tout ſon corps eſt hériſſé, juſqu'au bout des pieds, de piquans très déliés & très aigus: ceux du deſſous du corps paroiſſent de couleur différente, ſelon qu'ils reçoivent les rayons de lumiere. Sa queue eſt très longue, & couverte d'un bout à l'autre de piquans, dont ceux de l'extrémité ſont ſinguliers; car ils ſemblent compoſés de nœuds attachés bout à bout les uns des autres. Ces piquans ne ſont pas tous de la même longueur, ni de la même groſſeur; mais joints enſemble, ils forment comme une eſpece

d'épi. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

longitudinis, nec craſſitiei; ſed omnes adunati, quaſi panniculam referunt. Habitat in *Indiâ Orientali*.

SECTION II.

Ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans ſur le corps.

CEtte Section eſt compoſée de *6* genres différents, qui ſe diſtinguent les uns des autres par la forme de la queue. Les uns l'ont tout à fait platte & écailleuſe, comme le *Caſtor*; d'autres, ou l'ont très courte, ou n'en ont point du tout; & ceux là, ou ont les oreilles longues, comme le *Liévre*, ou ont les oreilles courtes, ou n'en ont point du tout, comme les *Lapins*; d'autres l'ont longue & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît platte, comme l'*Ecureuil*; d'autres l'ont de même longue & couverte de poils, mais rangés de façon qu'elle paroît ronde, comme le *Loir*; d'autres enfin l'ont nue, ou couverte de poils clair ſemés, comme le *Rat*.

Obſ. Les dents inciſives de tous les Quadrupedes de cette Section, ainſi que de ceux du Genre précédent, ſont contigues & tranchantes.

SECTIO II.

Ea quæ dentibus caninis carent, & corpus aculeis deſtitutum habent.

HÆc Sectio conſtituitur *6* generibus, formâ caudæ à ſe invicem diſcrepantibus: alia enim caudâ donantur omninò planâ & ſquamosâ, ſicut *Caſtor*; alia vel caudâ breviſſimâ, vel caudâ nullâ; inter quæ alia auriculis longis, ut *Lepus*; alia auriculis brevibus, vel nullis, ut *Cuniculus*, prædita ſunt; alia caudâ longâ veſtitâ pilis ità diſpoſitis, ut caudam planam efficiant, ut *Sciurus*; alia caudâ etiam longâ & veſtitâ pilis, ſed ità diſpoſitis, ut caudam rotundam efficiant, ut *Glis*; alia denique caudâ nudâ aut raris pilis obſitâ, ut *Mus*.

Obſ. Omnium hujus Sectionis Quadrupedum, ſicut eorum Generis præcedentis, dentes inciſores contigui ſunt & cultrati.

XXI.

Genus Caſtoris.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis deſtitutum:
Cauda plana & ſquamoſa.

Obſ. In aliquibus hujus Generis QUADRUPEDIBUS cauda horizontaliter plana eſt; in aliis verò verticaliter.

XXI.

Le Genre du Caſtor.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doigts onguiculés:
Point de piquans ſur le corps:
La queue platte & écailleuſe.

Obſ. Parmi les QUADRUPEDES de ce Genre les uns ont la queue platte horizontalement; les autres l'ont platte verticalement.

** 1. LE CASTOR, OU LE BIÉVRE.

Caſtor caſtanei coloris, caudâ horizontaliter planâ... CASTOR, SIVE FIBER.

Caſtor caudâ ovatâ planâ. Fiber. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 20. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 23.
Caſtor ſive Fiber. *Raj. Syn. Quadr. p.* 209.
Rzac. auct. p. 406.
Caſtor. Fiber. *Klein. Quadr. p.* 91.
Fiber; Caſtor; Canis Ponticus. *Geſn. Icon. Aquat. p.* 352. *Fig. p.* 353. (*Fig. bona*).
Caſtor. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 336. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 83. (*Fig. mala*). & *p.* 84. (*Fig. bona*).
Geſn. Piſc. p. 219. *Fig. p.* 220. (*Fig. mala*).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 276. *Fig. p.* 279. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 102. *Fig. T.* 68. [*Fig. bona*].
Muſ. Worm. p. 320.
Charlet. Exer. p. 18.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 215.
Fiber. *Bell de aquat. p.* 28. *Fig. p.* 30. (*Fig. bona*).
Caſtor. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. part. 1. p.* 137. *Fig. Pl.* 19. (*Fig. bonne*).
Hiſt. de l'Acad. an. 1704. *p.* 48.
Cat. App. p. 29.
Les Grecs l'appellent Καςωρ.
Les Eſpagnols, BEVARO. *Charlet.*
Les Italiens, BIVARO, *ou* BEVERO. *Geſn. Aldro.*

Les Allemands, BIBER. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, *& les Polonois*, BOBR. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Suédois, BÄFFWER. *Linn.*
Les Flamands, BEVER. *Charlet.*
Les Anglois, BEAVER. *Raj.* BEVER. *Geſn. Aldro.*

Il a environ $2\frac{1}{2}$ pieds, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue : le tour de ſon corps a auſſi $2\frac{1}{2}$ pieds. Sa queue, qui eſt plate horizontalement, a 11 pouces de long, & 3 pouces de large vers ſon milieu, & finit en ovale. Sa tête eſt ronde, & a $5\frac{1}{2}$ pouces, depuis les narines juſqu'à l'occiput. Ses yeux ſont petits & noirâtres ; ſes oreilles rondes & très courtes, revetues de poil en dehors, & preſque nues en dedans ; ſon col court & épais ; ſes jambes très courtes. Il a à chaque pied 5 doigts ſéparés les uns des autres dans les pieds de devant, & joints enſemble par une forte membrane dans ceux de derriere. Les pieds de devant ſont plus petits que ceux de derriere, & repréſentent une main, dont les ongles ſont longs & pointus : ceux des pieds de derriere ſont larges & obtus. Tout ſon corps, excepté ſa queue, qui eſt couverte d'écailles, entre leſquelles ſortent quelques petits poils, mais très clair ſemés, eſt couvert de poils doux & épais, d'un maron plus foncé dans quelques uns, & plus

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad initium caudæ, $2\frac{1}{2}$ pedum; ambitus corporis totidem. Cauda, quæ horizontaliter plana eſt, 11 pollices longa, 3 pollicum lata circa medium, in ovalem figuram deſinit. Caput rotundum, à naribus ad occipitium $5\frac{1}{2}$ pollices longum. Oculi parvi, ſubnigri; auriculæ rotundæ, breves, extrorsùm piloſæ, intùs ferè nudæ; collum breve & craſſum; crura brevia. In ſingulis pedibus 5 ſunt digiti, omnes in anterioribus à ſe invicem ſeparati, in poſterioribus verò validiſſimâ membranâ inter ſe connexi. Pedes anteriores poſterioribus minores, manum quodammodo referunt. Ungues pedum anteriorum longi ſunt & acuti, poſteriorum verò lati & obtuſi. Totum corpus, exceptâ caudâ, quæ ſquamis undique tegitur, pilis quibuſdam rariſſimis intermixtis, veſtitur pilis denſiſſimis & molliſſimis, in aliquibus saturatioris, in aliis dilutioris caſ-

tanei coloris (*a*). Habitat in *Occitaniâ*, & in Regionibus *Europæ* & *Americæ Septentrionalibus*.

clair dans d'autres (*a*). On le trouve en *Languedoc*, & dans la partie *Septentrionale* de l'*Europe* & de l'*Amérique*.

** 2. Le Castor blanc.

Caſtor albus, caudâ horizontaliter planâ... Castor albus.

A præcedente differt colore, qui albus eſt, cum magnâ maculâ cinereâ, ex rufo paululùm mixtâ, in parte ſuperiore colli, & maculâ ſimili, ſed minori, verſus clunes. Pili quoque circà caudæ originem ex flavo rufeſcunt. Habitat in *Norvegia* & *Canadâ*. Ex Muſeo *Realmuriano*.

Il différe du précédent par ſa couleur. Il eſt blanc, avec une grande tache griſe, mêlée d'un peu de roux, ſur la partie ſupérieure du col, & une pareille, mais plus petite, vers le derriere. Il a auſſi pluſieurs poils d'un jaune roux autour de l'origine de la queue. On le trouve en *Norvége* & en *Canada*, d'où il a été apporté à M. de *Reaumur*.

** 3. Le Rat musqué.

Caſtor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus membranis inter ſe connexis... Mus moschiferus.

Caſtor caudâ longâ, lanceolatâ, planâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 20. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 24.
Glis moſchiferus. *Klein. Quadr. p. 57.*
Mus Aquaticus Exoticus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p. 217.*
Mus Aquatilis Cluſii. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p. 448. (Fig. ſat bona).*
Mus Aquaticus Cluſii. *Muſ. Worm. p. 334.*
Mus Aquaticus. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 73. (Fig. ſat bona).*
Cluſ. Exot. Fig. p. 375. (Fig. ſat bona).
Sorex Moſcoviticus, ſive odoriferus. *Charlet. Exer. p. 25.*
Animal ex Moſcoviâ. *Gaz. Rup. Beſt. Fig. T. 15.) Fig. bona).*
Les Anglois l'appellent Muscovy, *ou* Musk-Rat. *Raj.*
Les Suédois, Desman. *Linn.*

(*a*) Quidam ſunt omninò nigri in *Septentrionalibus* regionibus : & eò ſaturatior eſt color quò frigidior eſt regio quâ inhabitant.

(*a*) Il y en a de tout à fait noirs dans les pays les plus *Septentrionaux* : & en general plus le pays qu'ils habitent eſt froid, plus leur couleur eſt foncée.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 9 pouces: le tour de ſon corps eſt de 7 pouces. Sa tête eſt petite à proportion du corps: la partie ſuperieure de ſon muſeau eſt allongée, comme celle de la *Taupe*; l'ouverture de ſa bouche petite; ſes yeux très petits, & à peine viſibles. Sa queue, qui eſt platte verticalement, a 6 ½ pouces de long, & 8 lignes de large, & ſe termine en pointe obtuſe: elle eſt couverte de très petites écailles, entre leſquelles pouſſent quelques poils. Ses jambes ſont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous joints enſemble par de fortes membranes, armés d'ongles longs & forts: les pieds de derriere ſont plus grands que ceux de devant. Tout ſon corps eſt couvert de poils très doux & très épais, d'un brun brillant ſur le dos, & d'un gris blanchâtre & brillant ſous le ventre. Il a une forte odeur de muſc. On le trouve en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, & en *Laponie*.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ originem, 9 pollicum: ambitus 7 pollicum. Caput habet, pro corporis mole, parvum; partem roſtri ſuperiorem, inſtar *Talpæ*, prominulam; oris rictum parvum; oculos valdè exiguos, & vix conſpicuos; caudam verticaliter planam, 6 ½ pollices longam, 8 lineas latam, in apicem obtuſum deſinentem, ſquamis minimis, pilis quibuſdam intermixtis, tectam; crura brevia. Pedes ſinguli in 5 digitos ſunt diviſi, omnes validis membranis inter ſe connexos, longis & validis unguibus munitos: pedes poteriores anterioribus ſunt majores. Totum corpus veſtitur pilis molliſſimis & denſiſſimis, fuſcis & ſplendentibus in dorſo, & ex albo cineraſcentibus & ſplendentibus in ventre. Moſchum maximè redolet. Habitat in *Ruſſiâ*, *Moſcoviâ* & *Laponiâ*.

** 4. LE RAT MUSQUÉ DE CANADA.

Caſtor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus à ſe invicem ſeparatis... MUS MOSCHIFERUS CANADENSIS.

Rat muſqué. *Hiſt. de l'Acad. an.* 1725, *p.* 323. *Fig. Pl.* 11. [*Fig. aſſez bonne*].

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue,

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium,

initium, 1 pedis; ambitus 10 circiter pollicum. Caput habet oblongum, à naribus ad occipitium 2 ½ pollices longum; oculos magnos; auriculas breviſſimas; caudam verticaliter planam, 9 pollices longam, & 10 circiter lineas latam, in apicem obtuſum deſinentem, ſquamis minimis tectam, pilis quibusdam intermixtis; crura brevia. Pedes ſinguli in 5 digitos ſunt diviſi, omnes à ſe invicem ſeparatos, validis unguibus munitos, pollice diſtincto: pedes poſteriores anterioribus majores. Totum corpus veſtitur pilis molliſſimis & denſiſſimis, in parte corporis ſuperiore & in thorace rufis, ſed ſaturatiùs in dorſo, in gutture & ventre ex albo flavicantibus. Moſchum maximè redolet. Habitat in *Canadâ.*

1 pied: le tour de ſon corps eſt d'environ 10 pouces. Sa tête eſt oblongue, & a, depuis les narines juſqu'à l'occiput, 2 ½ pouces: ſes yeux ſont grands; ſes oreilles très courtes. Sa queue, qui eſt platte verticalement, a 9 pouces de long, & environ 10 lignes de large, & ſe termine en pointe obtuſe: elle eſt couverte de très petites écailles, parmi leſquelles pouſſent quelques poils: ſes jambes ſont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous ſéparés les uns des autres, armés d'ongles forts, le pouce bien diſtinct: ſes pieds de derriere ſont plus grands que ceux de devant. Tout ſon corps eſt couvert de poils très doux & très épais: toute la partie ſupérieure du corps, ainſi que la poitrine, eſt d'un roux, plus foncé ſur le dos qu'ailleurs: la gorge & le ventre ſont d'un blanc jaunâtre. Il a une forte odeur de muſc. On le trouve en *Canada.*

XXII.

Genus Leporinum.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis deſtitutum:
Cauda breviſſima, vel nulla:
Auriculæ longæ.

XXII.

Le Genre du Liévre.

Son caractere eſt

D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doits onguiculés:
Point de picquants ſur le corps:
La queue très courte, ou point de queue:
Les oreilles longues.

** 1. Le Liévre.

Lepus caudatus, ex cinereo rufus... Lepus.

Lepus caudâ abrupta, pupillis atris. Lepus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 19. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 19.
Lepus vulgaris cinereus. *Klein. Quadr. p.* 51.
Lepus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 204.
Geſn. Quadr. Fig. p. 681. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 104. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 347.
Jonſt. Quadr. p. 109. *Fig. T.* 65. (*Fig. bona*).
Muſ. Worm. p. 321.
Charlet. Exer. p. 23.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 219.
Rzac. auct. p. 311.
Liévre. *Kolbe. Tom. III. p.* 62.
Les François appellent le mâle Liévre; *la femelle*, Hase; *le jeune*, Lévraut.
Les Hébreux l'appellent Arnebet. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, Arneba. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Λαγως.
Les Arabes, Ernab. *Geſn. Aldro.*
Les Sarraſins, Arneph. *Geſn. Aldro.*
Les Perſes, Kargos. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, Liébre. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Lepre, *ou* Lievora. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, Zagicz. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Hass, *ou* Haas. *Geſn. Aldro.* Hase. *Rzac.*
Les Polonois, Zaiac. *Rzac.*
Les Suédois, Hare. *Linn.*
Les Anglois, Hare. *Raj. Geſn.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 1 pied 9 pouces : le tour de ſon corps eſt d'environ 14 pouces. Sa tête eſt oblongue, & a depuis les narines juſqu'à l'occiput 3 ½ pouces; ſes oreilles 4 pouces; ſa queue 2 ½ pouces, & eſt noire en deſſus, & blanche en deſſous. Sa lévre ſupérieure eſt fendue :

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, circiter 1 pedis & 9 pollicum; ambitus circiter 14 pollicum. Caput habet oblongum, à naribus ad occipitium 3 ½ pollices longum; auriculas 4 pollices; caudam ſuprà nigram, infrà albicantem, 2 ½ pollicibus

longam ; labium ſuperius fiſſum ; oculos magnos ; crura poſteriora anterioribus longiora ; in pedibus anterioribus digitos 5, in poſterioribus 4, omnes validis unguibus munitos ; plantam pedum villoſam. Totum corpus veſtitur pilis mollibus & denſis, ex cinereo rufis, excepto in ventre, ubi albicant. Habitat in totâ *Europâ.*

ſes yeux ſont grands ; ſes jambes de derriere plus longues que celles de devant. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts ; le deſſous des pieds velu. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & épais, variés de roux & de gris, excepté ſous le ventre, où ils ſont blancs. On le trouve dans toute l'*Europe.*

** 2. Le Liévre blanc.

Lepus caudatus, planè candidus... Lepus albus.

Lepus albiſſimus, toto nitens in corpore candor. *Klein. Quadr. p.* 51.
Lepus albus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 349.
Lepus candidus. *Jonſt. Quadr. p.* 111.

Æſtate præcedenti ſimillimus eſt ; hieme verò in toto corpore candidus. Habitat in *Alpibus* & *Septentrionalibus* regionibus.

Il reſſemble au précédent pendant l'été ; & l'hyver il eſt tout blanc. On le trouve dans les *Alpes*, & dans les Pays du *Nord.*

3. Le Liévre noir.

Lepus caudatus, planè niger... Lepus niger.

Lepus niger. *Klein. Quadr. p.* 52.
Lepus planè niger. *Muſ. Worm. p.* 321.

A *Lepore vulgari* non differt, niſi quod totus ſit niger, exceptis pedum extremitatibus, quæ ad cœruleum tendunt.

Il ne différe du *Liévre ordinaire* qu'en ce qu'il eſt tout noir, excepté l'extrémité des pieds, qui eſt bleuâtre.

** 4. Le Lapin de notre pays.

Lepus caudatus, obſcurè cinereus... CUNICULUS NOSTRAS.

Lepus caudâ abruptâ, pupillis rubris. Cuniculus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 19. ſp. 3.*
Faun. Suec. Linn. N°. 20.
Lepuſculus: Cuniculus, terram fodiens. *Klein. Quadr. p. 52.*
Cuniculus. *Raj. Syn. Quadr. p. 205.*
Geſn. Quadr. Fig. p. 394. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 105. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 382. Fig. p. 385. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 111. Fig. T. 65. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 23.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 240.
Lapin. *Kolbe. Tom. III. p. 62.*
Les Hébreux l'appellent SAPHAN. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, THAPSA. *Geſn.*
Les Grecs, Δασύπȣς.
Les Arabes, VEBAR. *Geſn.*
Les Perſes, BESANGERAH. *Geſn.*
Les Eſpagnols, CONÉIO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, CONIGLIO. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, KRALIK, *ou* KROLYK. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, KÜNIGLE; KÜNELE; KÜNLEIN. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, KROLIK. *Rzac.*
Les Suédois, KANIN. *Linn.*
Les Flamands, KONIIN. *Charlet.*
Les Anglois, RABIT, *ou* CONY. *Raj. Geſn. Aldro.*
Les François appellent le jeune LAPREAU.

Il reſſemble au *Liévre* par la forme du corps; mais il eſt plus petit. Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, 1 ½ pied: le tour de ſon corps eſt d'environ 1 pied. Sa tête a, depuis les narines juſqu'à l'occiput, 3 ½ pouces; ſes oreilles autant; ſa queue, qui eſt noire en deſſus & blanche en deſſous, 2 ½ pouces. Il a, comme le *Liévre*, la lévre ſupérieure fendue; les

Formâ corporis externâ *Leporem vulgarem* refert; ſed illo minor eſt. Ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 1 ½ pede longus eſt: ambitus corporis 1 circiter eſt pedis. Caput, à naribus ad occipitium, 3 ½ pollices longum; auriculæ totidem; cauda, quæ ſuprà nigra eſt infrà candida, 2 ½ pollices longa. Labium ſuperius habet, ut in *Lepore*,

fiſſum; oculos magnos; crura poſteriora anterioribus longiora; in pedibus anterioribus digitos 5, in poſterioribus 4; plantas pedum villoſas. Per univerſum corpus veſtitur pilis mollibus & denſis, ex cinereo fuſcis, excepto ventre, in quo albicant. Habitat in totâ *Europâ*.

yeux grands; les jambes de derriere plus longues que celles de devant; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere; le deſſous du pied velu. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & épais, variés de brun & de gris, excepté ſous le ventre, où ils ſont blancs. On le trouve en toute l'*Europe*.

** 5. Le Riche.

Lepus caudatus, dilutè cinereus.

Colore à præcedente differt: pilis dilutè cinereis per univerſum corpus veſtitur. Ex muſeo *Realmuriano*.

Il différe du précédent par ſa couleur: tout ſon corps eſt couvert de poils d'un très joli petit-gris. Il eſt dans le Cabinet de M. *de Reaumur*.

** 6. Le Lapin d'Angora.

Lepus caudatus, pilis tenuiſſimis & longiſſimis toto corpore veſtitus... Cuniculus Angorensis.

Pilis tenuiſſimis & longiſſimis ab aliis hujus generis ſpeciebus diſtinguitur. Habitat in *Angora*. Ex muſeo *Realmuriano*.

Il différe des autres eſpeces de ſon genre par la longueur & la fineſſe de ſes poils. On le trouve à *Angora*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

7. Le Liévre du Brésil.

Lepus ecaudatus... Lepus Brasilianus.

Lepus caudâ nullâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 19. ſp.* 1.
Cuniculus Braſilienſis Tapeti dictus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 205.
Tapeti Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 223. *Fig. p.* 224. (*Fig. bona, ſi caudam non haberet*).
Tapeti. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 102. [*Fig. eadem ut ſuprà*].
Cavia Cobaya, Cuniculi Braſilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 63. (*Fig. eadem*).

Il reſſemble à *notre Liévre* par la forme du corps : il eſt de la même couleur ; cependant un peu plus brun. Il a un peu de roux ſur le front ; & la gorge, la poitrine, & le ventre ſont blancs. Quelques uns ont un cercle blanc autour du col. Il n'a point de queue. On le trouve au *Bréſil.*

Quoad formam corporis externam *Lepori vulgari* ſimilis eſt : iiſdem ac ille pilis & colore, ſed paulò fuſciore. In fronte rufeſcit paululùm ; ſub gutture, pectore, & ventre albicat. Quidam circulum album habent circà collum. Caret caudâ. Habitat in *Braſiliâ.*

XXIII.

Le Genre du Lapin.

Son caractere eſt

D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire :

Point de dents canines :

Les doigts onguiculés :

Point de picquants ſur le corps :

La queue très courte, ou point de queue :

Les oreilles courtes, ou point d'oreilles.

XXIII.

Genus Cuniculi.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo :

Canini nulli :

Digiti unguiculati :

Corpus aculeis diſtitutum :

Cauda breviſſima, vel nulla :

Auriculæ breves, vel nullæ.

1. Le Lapin de Java.

Cuniculus caudatus, auritus, rufeſcens, fuſco admixto... Cuniculus Javensis.

Cavia Javenſis. *Klein. Quadr. p.* 50.
Liévre de Java. *Cat. App. Fig. p.* 18. [*Fig. bonne*].

Il eſt de la groſſeur d'un *Liévre.* Il a la tête petite à proportion du corps ; les yeux grands & ſortants ; les oreilles ſemblables à celles d'un *Rat* ; toute la partie poſtérieure du corps groſſe & épaiſſe ; les jambes longues. Tout ſon corps eſt couvert d'un

Leporis magnitudinem attingit. Caput habet pro mole corporis parvum ; oculos magnos & prominentes ; auriculas auriculis *Murinis* ſimiles ; poſteriorem corporis partem craſſam ; crura longa. Per univerſum corpus

veſtitur pilis rufeſcentibus, paululùm fuſco admixto. In pedibus anterioribus 4 digitis, exteriore breviſſimo, in poſterioribus verò tribus tantùm donatur. Habitat in *Javâ* & *Sumatrâ*.

poil rouſsâtre, mêlé d'un peu de brun. Il a aux pieds de devant 4 doigts, dont l'extérieur eſt fort court, & 3 à ceux de derriere. On le trouve à *Java* & à *Sumatra*.

** 2. L'AGOUTY.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo & fuſco mixtis, rigidis veſtitus.

Cuniculus omnium vulgatiſſimus, Aguti vulgò. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 153.
Mus ſylveſtris Americanus Cuniculi magnitudine, Porcelli pilis & voce. *Raj. Syn. Quadr. p.* 226.
Cavia Aguti, vel Acuti Braſilienſibus. *Klein. Quadr. p.* 50.
Aguti, vel Acuti Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 224. [*Fig. bona*].
Aguti, vel Acuti, Cuniculi Braſilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 63. [*Fig. bona*].
Acuti, ſive Agouti. *Jo. de Laet. p.* 551.
Aguti. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 102. (*Fig. bona*).
Les Braſiliens l'appellent vulgairement COTIA. *Marcgr. Piſon.*
Les Habitans de la Guiane, AGOUTY. *Barr.*

Magnitudine & formâ *Cuniculum noſtratem* æmulatur; auriculas tamen habet breves & rotundas; os acutum; maxillam inferiorem ſuperiore breviorem; labium ſuperius fiſſum; oculos nigros; caudam breviſſimam, & ferè glabram; crura anteriora poſterioribus paulò breviora. In pedibus anterioribus 4 habet digitos, in poſterioribus 3 tantùm, acutis unguibus munitos. Per univerſum corpus veſtitur pilis rigidis, ſplendentibus, ex rufo & fuſco mixtis, cum pauxillo

Il eſt de la grandeur & de la forme de *notre Lapin*; mais il a les oreilles rondes & courtes; le muſeau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la ſupérieure; la lévre ſupérieure fendue; les yeux noirs; la queue extrémement courte, & preſque ſans poils; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derriere. Il a aux pieds de devant 4 doigts, & 3 à ceux de derriere, armés d'ongles aigus. Tout ſon corps eſt couvert de poils rudes au toucher, brillants, mêlés de roux & de brun avec un peu de noir

ſur le dos, & un peu plus jaunâtres ſous le ventre. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

nigro in dorſo; in ventre autem magis flaveſcentibus. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

3. Le Lapin d'Amerique.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis rufis rigidis veſtitus... Cuniculus Americanus.

Cuniculus Americanus. *Seb. Vol. I. p.* 67. *Fig. T.* 41. *F.* 2. (*Fig. bona*).
Cavia Surinamenſis. *Klein. Quadr. p.* 50.

Il eſt un peu plus petit que *notre Lapin*. Il a les oreilles courtes & rondes; la tête groſſe; le col long; & la queue très courte. Ses pieds ſont fendus en 4 doigts, armés d'ongles pointus & recourbés. Tout ſon corps eſt couvert de poils roux, rudes, & picquants comme des *ſoyes*, ſurtout ceux du dos. On le trouve en *Amerique*.

Noſtrate Cuniculo paulò minor eſt. Auriculas habet breves & rotundas; caput craſſum; collum longum; caudam breviſſimam. Pedes in 4 fiſſi ſunt digitos, acutis & incurvis unguibus munitos. Totum corpus tegitur pilis rufis, rigidis, *ſetarum* inſtar, pungentibus, præcipuè per dorſum. Habitat in *Americâ*.

** 4. Le Pak.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis obſcurè fulvis, rigidis, lineis ex albo flaveſcentibus ad latera diſtinctis... Paca.

Cuniculus major paluſtris, faſciis albis notatus. *Barr. Hiſt Fr. eq. p.* 152.
Mus Braſilienſis magnus Porcelli pilis & voce, *Paca* dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 226.
Cavia Paca Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 50.
Paca Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 224. (*Fig. bona*).
Paca Cuniculi Braſilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. p.* 111. *Fig. T.* 63. [*Fig. bona*].
Paca. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 101. (*Fig. bona*).
Jo. de Laet. p. 551.
Les Habitans de la Guiane l'appellent Ourana, & Pak. *Barr.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium,

initium, 1 circiter pedis eſt; caput, à naribus ad occipitium, 4 pollices longum, craſſum; maxilla inferior ſuperiore brevior. Barbam habet prolixam *Leporinam*; auriculas breves & acutas; caudam breviſſimam; crura anteriora poſterioribus paulò breviora; in ſingulis pedibus digitos 5, quorum interior pedum anteriorum minimus eſt, & ab aliis 4 remotus: poſteriorum pedum digiti 3 intermedii majores, exterior parvus, & à 3 intermediis parumper remotus, interior verò minimus, à 3 intermediis adhuc remotior. Totum corpus veſtitur pilis brevibus, rigidis, supernè obſcurè fulvis, tribus lineis longitudinalibus ex albo flaveſcentibus ad latera diſtinctis, infernè verò ex albo flaveſcentibus. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

1 pied de long: ſa tête eſt groſſe, & a, depuis les narines juſqu'à l'occiput, 4 pouces: ſa mâchoire inférieure eſt plus courte que la ſupérieure. Il a une grande barbe de *Liévre*; des oreilles pointues, & tres courtes, ainſi que ſa queue; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derriere; 5 doigts à chaque pied, dont l'intérieur des pieds de devant eſt tres petit, & articulé plus haut que les 4 autres: les 3 doigts du milieu des pieds de derriere ſont les plus grands, l'extérieur eſt petit, & articulé un peu plus haut que les 3 du milieu, l'intérieur eſt encore plus petit, & articulé plus haut que l'extérieur. Son corps eſt couvert de poils courts, rudes au toucher, d'un fauve foncé en deſſus, avec de chaque côté 3 bandes étroites longitudinales d'un blanc jaunâtre, & en deſſous de ce même blanc jaunâtre. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

5. Le Lapin de Norvege.

Cuniculus caudatus, auritus, ex flavo, rufo & nigro variegatus... Cuniculus Norvegicus.

Mus caudâ abruptâ, corpore fulvo nigroque vario. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp. 2.*

Faun. Suec. Linn. N°. 26.

Mus Lemingus, Norvagicus, Olai magni, Wormii Muſei. *Klein. Quadr. p.* 58.

Mus Norvagicus, vulgò *Leming*, Wormii Muſei. *Raj. Syn. Quadr. p.* 227.

Muſ. Worm. p. 322. *Fig. p.* 325. [*Fig. optimâ*].
Mus Norvegicus. *Charlet. Exer. p.* 25.
Leem. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 436.
Jonſt. Quadr. p. 116.
Les Suédois l'appellent FIÅLLMUS, SABELMUS. *Linn.*
Les Lapons, LUMMICK. *Linn.*

Il reſſemble à un *Rat* par la forme du corps; mais il en différe en ce qu'il a la queue extrémement courte, & couverte de poils. Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 5 pouces de long. Son muſeau eſt pointu; ſes yeux ſont petits & noirs; ſes oreilles courtes, obtuſes, & un peu inclinées vers le dos. Il a autour du muſeau des poils longs & roides, qui lui font une eſpece de mouſtache. Ses jambes de devant ſont beaucoup plus courtes que celles de derriere: il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles aigus & recourbés, dont le milieu eſt plus long que les autres, qui ſont d'autant plus courts qu'ils en ſont plus éloignés. La couleur de ſon poil eſt variée de noir, de jaune & de roux: la partie antérieure de ſa tête eſt noire; le ſommet eſt jaune; le col & les épaules noires; le reſte du corps eſt roux, marqué de quelques taches noires de différentes figures; le ventre eſt d'un blanc jaunâtre: l'ordre, la figure, & la grandeur des taches varient dans les différents individus. Il a en tout 16 dents, ſça-

Formâ corporis *Rattum* repræſentat; ab eo tamen differt cauda breviſſimâ & piloſâ. Longitudo corporis, ab extremitate oris ad caudæ initium, eſt 5 circiter pollicum. Os habet acuminatum; oculos parvos, nigros; auriculas breves, & obtuſas, paululùm in dorſum reclinantes. Os cingunt pili multi longi & rigidi, myſtacis inſtar. Crura anteriora poſterioribus multò ſunt breviora: pedes ſinguli 5 præditi ſunt digitis, acutis & incurvis unguibus munitis, quorum medius longiſſimus, reliquis utrinque ab hâc longitudine eò magis diſcedentibus, quò magis ſunt à medio remoti. Pilorum color ex nigro, flavo, & rufo variegatur: capitis pars anterior nigricat; vertex flaveſcit; hinc collum & ſcapulæ nigræ; corpus reliquum rufeſcit, intermixtis quibuſdam maculis nigris variarum figurarum; venter eſt albicans ad flavedinem tendens: in variis autem individuis macularum ordo figura, & magnitudo variant. 16

dentibus donatur, 4 ſcilicet inciſoribus, 2 in utrâque maxillâ, & 12 molaribus, 6 etiam in utrâque maxillâ, 3 utrinque. Habitat in *Norvegiâ* & *Laponiâ*.

voir 4 inciſives, 2 à chaque mâchoire, & 12 molaires, 6 à chaque mâchoire, 3 de chaque côté. On le trouve en *Norvege*, & en *Laponie*.

6. LE LAPIN D'ALLEMAGNE.

Cuniculus caudatus, auriculis nullis, cinereus... CUNICULUS GERMANICUS.

Mus caudâ brevi, capite inauri. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 21. *ſp.* 3.
Mus Noricus, vel Citellus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 220.
Klein. Quadr. p. 56. *Not.* 48.
Geſn. Quadr. p. 835.
Geſn. Icon. Quadr. p. 113.
Mus Noricus Agricolæ. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 235.
Rzac. auct. p. 327.
Mus Citellus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 436.
Les Allemands l'appellent ZYSEL. *Geſn. Aldro.* ZIESEL. *Rzac.*
Les Bohémiens, SISEL. *Rzac.*
Les Polonois, SUSEL. *Rzac.*

Corpus habet, ut *Muſtela vulgaris*, longum & tenue. Caret auriculis; ſed non caret foraminibus, quibus ſonum recipit. Caudâ breviſſimâ donatur. Color pilorum cinereus eſt. Habitat in *Bohemiâ*, *Auſtriâ*, *Hungariâ*, & *Poloniâ*.

Il a le corps long & effilé, comme la *Belette*. Il n'a point d'oreilles; mais il a, à leur place, des trous, par leſquels il entend. Sa queue eſt tres courte. La couleur de ſon poil eſt griſe. On le trouve en *Bohëme*, en *Autriche*, en *Hongrie*, & en *Pologne*.

**7. LE LAPIN DES INDES.

Cuniculus ecaudatus, auritus, albus aut rufus, aut ex utroque variegatus... CUNICULUS INDICUS.

Cuniculus Indus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 106. [*Fig. ſat bona, ſi tantum numerum digitorum non haberet*].
Cuniculus Indicus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 63. [*Fig. ſat bona*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 160. (*Fig. Geſneri*).

Porcellus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p.* 391. [*Fig. Geſneri*]. *Jonſt. Quadr. p.* 112. *Fig. T.* 64. (*Fig. bona*). *Rzac. auct. p.* 333.

Porcellus Indicus, ſivè Guineenſis. *Charlet. Exer. p.* 24.

Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 21. *ſp.* 1.

Mus, ſeu Cuniculus Americanus & Guineenſis, Porcelli pilis & voce, *Cavia Cobaya* Braſilienſibus dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 223.

Cavia Cobaya Braſilienſibus: quibuſdam Mus Pharaonis; Tatu piloſus, Porcellus, Mus Indicus. *Klein. Quadr. p.* 49.

Cavia Cobaya Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 224. (*Fig. ſat bona*).

Cavia Cobaya. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 102. (*Fig. ſat bona*).

Les François l'appellent COCHON D'INDE.

Les Allemands, INDIANISCH KÜNELE, *ou* INDISCH SEÜLE. *Geſn.* MEER-FERCKEL; MEER-SCHWEIN. *Rzac.*

Les Polonois, SWINKA ZAMORSKA. *Rzac.*

Les Suédois, MARSWIN. *Linn.*

Les Anglois, GUINY PIG. *Raj.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, 9 ½ pouces; depuis les narines juſqu'à l'occiput, 2 pouces 4 lignes: le tour de ſon corps eſt de 8 pouces. Il a la lévre ſupérieure fendüe, comme le *Liévre*; l'ouverture de la bouche petite; les oreilles courtes, rondes, ouvertes, tranſparantes, & preſque dénuées de poils; les jambes courtes: il ne lui paroît point de queue. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 3 à ceux de derriere. Ses poils ſont doux au toucher: leur couleur eſt différente dans différents individus: les uns ſont tout à fait blancs; d'autres tout à fait roux; d'autres variés de blanc & de roux; quelques uns ont des taches noires. On le trouve en *Europe* dans les maiſons, en *Guinée*, & au *Bréſil*.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad anum uſque, 9 ½ pollicum; ambitus 8 pollicum; caput, à naribus ad occipitium, 2 pollices cum 4 lineis longum. Labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum eſt; oris rictus parvus; auriculæ breves, ſubrotundæ, patulæ, pellucidæ, & glabræ ferè; crura brevia; caudæ veſtigium nullum. Pedes anteriores in 4, poſteriores verò in 3 digitos diviſi. Pili ad tactum molles: color in individuis variis varius: alia omninò alba ſunt; alia omninò rufa; alia ex albo & rufo variegata; quædam ex nigro maculata. Habitat in *Europâ* domeſticus, in *Guineâ*, & *Braſiliâ*.

8. Le Lapin du Brésil.

Cuniculus ecaudatus, auritus, ex cinereo rufus... Cuniculus Brasiliensis.

Cuniculus Braſilienſis, *Aperea* dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 206.
Cuniculus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p.* 393. (*Fig. bona*).
Cavia Aperea. *Klein. Quadr. p.* 50.
Aperea, Cuniculi ſpecies. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 63. [*Fig. bona*].
Aperea Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 223. (*Fig. bona*).
Aperea. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103. (*Fig. bona*).
Les Flamands l'appellent Veldratte, *ou* Boschratte. *Marcgr.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad anum uſque, 1 eſt circiter pedis: diameter 7 digitorum. Barbam habet *Leporinam*; labium ſuperius fiſſum; auriculas breves & ſubrotundas. Caret caudâ. Crura anteriora 3 circiter digitos longa ſunt; poſteriora paulò longiora. 4 habet in pedibus anticis digitos unguibus parvis munitos, in poſterioribus 3, quorum medius reliquis longior. Color totius corporis, excepto ventre, in quo albicat, *Leporinus*. Habitat in *Braſiliâ*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, environ 1 pied: le diametre de ſon corps eſt de 7 doigts. Il a, comme le *Liévre*, une mouſtache, & la lévre ſupérieure fendue. Ses oreilles ſont courtes & rondes. Il n'a point de queue. Ses jambes de devant ont environ 3 doigts de long, & celles de derriere un peu plus. Il a 4 doigts aux pieds de devant, armés de petits ongles, & 3 à ceux de derriere, dont le milieu eſt le plus long. La couleur de ſes poils, exceptez ceux du ventre, qui ſont blancs, eſt la même que celle de nos *Liévres ordinaires*. On le trouve au *Bréſil*.

XXIV.

Genus Sciuri.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:

XXIV.

Le Genre de l'Ecureuil.

Son caractere eſt

D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:

Point de dents canines : Les doigts onguiculés : Point de picquants ſur le corps : La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît platte.

Canini nulli : Digiti unguiculati : Corpus aculeis deſtitutum : Cauda longa, veſtita pilis ità diſpoſitis ut caudam planam efficiant.

** 1. L'ECUREUIL.

Sciurus rufus, quandoque griſeo admixto... SCIURUS VULGARIS.

Sciurus palmis ſolis ſaliens. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 18. ſp. 1. Faun. Suec. Linn.* No. 21.
Sciurus vulgaris. *Raj. Syn. Quadr. p.* 214.
Sciurus vulgaris rubicundus. *Klein. Quadr. p.* 53.
Sciurus. *Geſn. Quadr. p. 955. Fig. p. 956. (Fig. bona).*
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 110. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 396. Fig. p. 398. [Fig. ſat bona].
Jonſt. Quadr. p. 113. Fig. T. 66. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 24.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 224.
Rzac. auct. p. 320.
Pirolus, Spirioſus, Scurulus quorumdam. *Klein.*
Les Grecs l'appellent Σκίουρος.
Les Eſpagnols, HARDA, *ou* ESQUILO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens SCHIRIVOLO. *Geſn.* SCHIRATO, *ou* SCHIRATOLO. *Aldro.*
Les Allemands, EYCHORN, *ou* EYCHHORN, *ou* EICHHERMLIN. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, WEWERKA. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, WYEWYORKA. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Suedois, IKORN. *Linn.*
Les Anglois, SQUYRRELL. *Geſn. Aldro.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, $7\frac{1}{2}$ pouces : ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, eſt longue de 2 pouces ; ſa queue de 8 pouces. Ses oreilles ſont courtes & couvertes de poils très longs. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudam uſque, $7\frac{1}{2}$ pollicum ; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum ; caudæ 8 pollicum. Auriculæ breves ſunt & pilis longiſſimis ornatæ. 4 ſunt in pedibus anterioribus digiti, in poſterioribus verò 5, om-

nes longis, incurvis, & acutis unguibus muniti: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis eſt breviſſimus & obtuſus. Univerſum corpus, exceptis gutture & ventre albicantibus, veſtitur pilis omninò rufis, vel cum pauco griſeo admixto. Caudam habet pilis longiſſimis ornatam, quâ ſuprà dorſum reflexâ, ſe tegit & inumbrat. Habitat in *Europâ*.

d'ongles longs, recourbés, & aigus: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un ongle très court & obtus. Tout ſon corps eſt couvert de poils roux, ou d'un roux mêlé de gris, exceptez la gorge & le ventre, qui ſont blancs. Sa queue eſt ornée de poils très longs; & lorſqu'il la releve par deſſus ſon dos, elle lui couvre tout le corps. On le trouve en *Europe*.

** 2. L'Ecureuil blanc de Siberie.

Sciurus albus, Sibericus.

Sciurum vulgarem magnitudine circiter æquat: ab eo autem differt colore, qui per univerſum corpus albus eſt. Habitat in *Siberia*. Ex muſeo *Realmuriano*.

Il eſt à peu près de la grandeur de l'*Ecureuil ordinaire*: il en différe en ce qu'il eſt tout blanc. On le trouve en *Siberie*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

3. L'Ecureuil noir.

Sciurus niger.

Sciurus niger. *Klein. Quadr. p.* 53.
Quauhtechallotl. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 8.
Quauhtechallotl Thliltic. Sciurus Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 582. (*Fig. ſat bona*).
Quauhtechallotl Thliltic, ſivè Tlilocoteqvillin dictus. *Jonſt. Quadr. p.* 113.
Ecureuil noir. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 73. [*Fig. très bonne*].

Præcedentes magnitudine ſuperat: ab eis etiam colore differt: multi ſunt omninò nigri; alii vel naſo, vel pedibus, vel caudæ apice, vel

Il eſt plus grand que les précédents: il en différe encore par ſa couleur: pluſieurs ſont tout noirs; quelques uns ont le nez blanc; d'autres les pieds; d'au-

tres le bout de la queue; d'autres ont un collier blanc. On le trouve au *Mexique*.

denique torque albis donantur. Habitat in *Mexico*.

4. L'Ecureuil varié.

Sciurus ex candido cinereus... Sciurus varius.

Sciurus varius, *Varus* vulgò dictus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 403. *Fig. p.* 405. (*Fig. ſat bona*).
Sciurus Scythicus. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 111.
Sciurus, ſive Mus Ponticus. *Charlet. Exer. p.* 24.
Mus Ponticus, ſeu Venetus, vulgò *Varius*. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 839. (*Fig. bona*).
Rzac. Auct. p. 318.
Mus Ponticus, *Varius* dictus. *Jonſt. Quadr. p.* 113.
Mus Laſſicus Mathioli. *Aldro. Jonſt.*
Les Italiens l'appellent Vare. *Geſn.*
Les Allemands, Fech, *ou* Vech. *Geſn. Aldro.* Grau-Werck. *Rzac.*
Les Polonois, Popieliza. *Aldro. Jonſt. Rzac.*

Il reſſemble à l'*Ecureuil ordinaire* par ſa grandeur & ſa figure; mais il en différe par ſa couleur, qui eſt variée de blanc & de gris, & par les poils de ſa queue, qui ne ſont pas ſi longs. On le trouve en *Europe*.

Magnitudine & figurâ *Sciurum vulgarem* æmulatur; ab eo autem differt colore, qui in candido cinereus eſt, & caudâ non adeo amplâ. Habitat in *Europâ*.

**5. L'Ecureuil d'Amerique.

Sciurus obſcurè cinereus... Sciurus Americanus.

Sciurus caudâ teretiuſculâ, auribus ſubrotundis, nudis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 18. *ſp.* 3.
Sciurus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 54.
Seb. Vol. I. p. 78. *Fig. T.* 48. *F.* 5. (*Fig. optima*).

Il eſt un peu plus petit que l'*Ecureuil ordinaire*: il en différe encore par ſa couleur, qui eſt un gris obſcur dans la partie ſupérieure du corps, & un gris blanc dans la partie inférieure; & par

Sciuro vulgari magnitudine cedit: ab eo etiam differt colore, qui obſcurè cinereus eſt in parte corporis ſuperiore, in inferiore verò ex cinereo albus; & pilis caudæ brevioribus,

brevioribus, & ad rufum accedentibus. Habitat in *Americâ.*

les poils de ſa queue, qui ſont plus courts, & un peu rouſsâtres. On le trouve en *Amerique.*

** 6. L'ECUREUIL DE VIRGINIE.

Sciurus cinereus, auriculis ex albo flavicantibus... SCIURUS VIRGINIANUS.

Sciurus Virginianus cinereus major. *Raj. Syn. Quadr. p.* 215. *Klein. Quadr. p.* 53.
Grand Ecureuil gris. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 74. [*Fig. bonne*].
Les Anglois l'appellent GREAT GREY VIRGINIA SQUIRREL. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 11 circiter pollicum. Corpus habet & membra corpore & membris *Sciuri vulgaris* craſſiora; caput & auriculas breviores; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus verò 5; auriculas intùs nudas, extùs verò pilis ex albo flavicantibus veſtitas. Partes corporis ſuperior & crurum exterior ſunt cinereæ; corporis verò inferior & crurum interior ex cinereo candidæ: diverſi illi colores ſeparantur tæniis longitudinalibus rufis, in lateribus utrinque ſitis. Cauda, quæ veſtitur pilis longiſſimis cinereis, versùs extremum ex nigro & albo variis, in dorſum reflexa, totum corpus cooperit. Habitat in *Virginiâ* & *Carolinâ.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, eſt d'environ 11 pouces. Il a le corps & les membres plus épais que nos *Ecureuils ordinaires*; la tête & les oreilles plus courtes; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. Ses oreilles ſont nuës intérieurement, & extérieurement couvertes de poils d'un blanc jaunâtre. La partie ſupérieure de ſon corps, & l'extérieur de ſes jambes ſont d'un joli gris; la partie inférieure du corps, & l'intérieur des jambes d'un gris blanc: une bande rouſſe s'étend de chaque côté ſelon leur longueur, & ſépare ces deux couleurs. Sa queue eſt revetue de très longs poils gris, variés de noir & de blanc vers leur extrémité; & lorſqu'elle eſt relevée vers le dos, elle couvre tout le corps. On le trouve à la *Virginie* & à la *Caroline.*

7. L'Ecureuil du Brésil.

Sciurus coloris ex flavo & fuſco mixti, tæniis in lateribus albis... Sciurus Brasiliensis.

Sciurus Braſilienſis. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 230.

Il eſt de la grandeur & de la figure de l'*Ecureuil ordinaire.* Sa queue eſt auſſi longue que ſon corps, & lorſqu'elle eſt relevée vers le dos, elle peut le couvrir entiérement. Il a la prunelle de l'œil bleuâtre; les oreilles courtes & rondes; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés d'ongles longs & aigus, dont ceux du milieu ſont plus longs que les autres: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un petit ongle noir. La couleur de tout ſon corps, exceptez la gorge & le ventre, qui ſont blancs, eſt mêlée de jaune pâle, & de brun: il a outre cela de chaque côté une bande étroite longitudinale blanche. Sa queue eſt revêtue de longs poils variés de noir & de blanc. On le trouve au *Bréſil.*

Longitudine & figurâ *Sciurum vulgarem* æmulatur. Caudam habet ejuſdem cum corpore longitudinis, quâ in dorſum reflexâ, corpus cooperiri poteſt; oculorum pupillam cœruleſcentem; auriculas breves & obrotundas; 4 in anterioribus pedibus digitos, in poſterioribus 5, omnes longis & acutis unguibus munitos, quorum medii reliquis longiores: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis eſt parvulus & niger. Color totius corporis, exceptis gutture & ventre albis, eſt ex pallidè flavo, & fuſco mixtus: in utroque latere tæniam habet longitudinalem albam. Cau da pilis longis veſtitur ex nigro & albo mixtis. Habitat in *Braſiliâ.*

8. L'Ecureuil de la Nouvelle Espagne.

Sciurus obſcurè cinereus, tæniis in dorſo albicantibus... Sciurus Novæ Hispaniæ.

Sciurus rariſſimus, ex Novâ Hiſpaniâ, tæniis albis. *Klein. Quadr. p.* 53. *Seb. Vol. I. p.* 76. *Fig. T.* 47. *Mas F.* 2. *Fœm. F.* 3. (*Fig. bonis*).

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 5 ½ circiter pollicum: cauda longitudine corpus antecellit. Auricularum ambitus pilis deſtituitur. Color totius corporis, exceptis ore & inferiore corporis parte cinereis, eſt obſcurè *Murinus*. Dorſum albicantes 7 in mare, 5 tantùm in fœminâ percurrunt tæniæ longitudinales, indè & per caudam quoque, quæ longis diffuſiſque pilis tegitur, extenſæ: harum albedinem nigricantes pili intermixti variegant. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 5 ½ pouces: ſa queue eſt plus longue que tout ſon corps. Le contour de ſes oreilles eſt denué de poils. Sa couleur, exceptez ſon muſeau & la partie inférieure de ſon corps, qui ſont d'une couleur cendrée, eſt un gris de *Souris* foncé. Le mâle a ſur le dos 7, & la femelle ſeulement 5 bandes longitudinales blanchâtres, entremêlées de poils preſque noirs: ces bandes s'étendent auſſi ſur la queue, qui eſt garnie de grands poils clair ſemés. On le trouve dans la *Nouvelle Eſpagne*.

9. L'ECUREUIL DE LA CAROLINE.

Sciurus rufus, tæniis in dorſo nigris, tæniis ex albo flavicantibus intermixtis... SCIURUS CAROLINENSIS.

Sciurus ſtriatus. *Klein. Quadr. p.* 53.
Sciurus Lyſteri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216.
Ecureuil de Terre. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 75. (*Fig. bonne*).

Dimidio minor eſt *Sciuro vulgari*. Oculos habet magnos & nigros; auriculas obrotundas: cauda pilis, quàm in aliis ſpeciebus multò brevioribus, & rufis veſtitur: corpus ejuſdem coloris eſt. In medio dorſo tænia longitudinalis extenditur nigra, & inſuper in utroque latere duæ tæniæ etiam nigræ, tertiâ tæniâ ex albo flavicante in

Il eſt plus petit de moitié que l'*Ecureuil ordinaire*. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles arrondies; les poils de la queue beaucoup plus courts que dans les autres eſpeces, & roux, ainſi que ceux du corps: il a en outre une bande longitudinale noire placée ſur le milieu du dos; & de chaque côté deux autres de même couleur, entre leſquelles eſt une troiſiéme bande d'un

blanc jaunâtre. On le trouve dans les bois de la *Caroline*, & de la *Virginie*.

illis incluſâ. Habitat in *Carolinæ* & *Virginiæ* ſylvis.

** 10. L'Ecureuil Palmiste, *vulgairement*, Rat Palmiste.

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in dorſo flavicantibus... Sciurus Palmarum; Mus Palmarum *vulgò*.

Muſtela Africana. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216.
Cluſ. Exot. Fig. p. 112. [*Fig. ſat bona*].
Jonſt. Quadr. p. 105.
Euſ. Nieremb. Fig. p. 172. (*Fig. ſat bona*).
An Mus Indicus arboreus ſtriatus? *Raj. Syn. Quadr. p.* 230.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 5 pouces : ſa tête a, depuis les narines juſqu'à l'occiput, 1 pouce 5 lignes de long; & ſa queue environ 6 pouces, & ſe termine en pointe. Ses oreilles ſont courtes & arrondies. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. Tous les poils de ſon corps ſont variés de roux & de noir ; ceux de ſa queue de noir & de jaunâtre en deſſus, & en deſſous ils ſont d'un jaune roux, ayant de chaque côté 2 bandes étroites longitudinales noires, & terminées par une bande longitudinale blanchâtre : il a auſſi ſur le dos 3 bandes jaunâtres, qui s'étendent dans toute ſa longueur, ſçavoir une de chaque côté, & l'autre au milieu. On le trouve en *Aſie*, en *Afrique*, & en *Amerique*.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pollicis & 5 linearum; caudæ, quæ in acumen deſinit, 6 circiter pollicum. Auriculas habet breves & ſubrotundas; 4 in pedibus anticis digitos, 5 verò in poſticis. Pili corporis ex rufo & nigro variegantur : pili caudæ ſuprà ex nigro & flavicante, infrà verò ſunt ex flavo rufi, cum duobus tæniis longitudinalibus in utroque latere nigris, alterâ tæniâ etiam longitudinali albicante utrinque terminati : 3 ſunt inſuper in dorſo ſecundùm ipſius longitudinem tæniæ flavicantes, in utroque ſcilicet latere una, altera in medio dorſo. Habitat in *Aſiâ*, *Africâ*, & *Americâ*.

11. L'Ecureuil de Barbarie.

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis, & fuſcis aut nigris... Sciurus Getulus.

Sciurus Getulus Caii apud Geſnerum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216. *Klein. Quadr. p.* 54.
Sciurus Getulus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 112. (*Fig. bona*). *Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p.* 405. *Fig. p.* 406. (*Fig. bona*). *Jonſt. Quadr. p.* 113. *Fig. T.* 67. *Fig. bona*).
Sciurus, ſive Mus Getulus. *Charlet. Exer. p.* 24.

Sciuri vulgaris magnitudinem non attingit; nec auriculas exſtantes habet, ut ille, ſed depreſſas magis, breviores & orbiculares. Pilorum color, excepto in ventre, in quo ex cinereo albus, ex rufo & nigro mixtus eſt. Eum, ab armis ad caudam, per latera albæ fuſcæque tæniæ in aliquibus, & albæ & nigræ in aliis alternatim decentiſſimè pingunt, reſpondentibus etiam in caudâ tæniis, niſi ſiquando expansâ caudâ, propter pilorum raritatem eædem diſpareant. Habitat in *Barbariâ*.

Il eſt un peu plus petit que l'*Ecureuil ordinaire*: il n'a pas les oreilles ſi relevées, mais plus baſſes, plus courtes, & arrondies. La couleur de ſes poils, exceptez ceux du ventre, qui ſont gris-blancs, eſt mêlée de roux & de noir. Il a ſur les côtés, depuis les épaules juſqu'à la queue, des bandes alternativement blanches & brunes dans quelques uns, & alternativement blanches & noires dans d'autres: ces bandes s'étendent auſſi ſur la queue; mais lorſqu'elle eſt étendue, elles diſparoiſſent, parce que les poils ſont trop clair-ſemés. On le trouve en *Barbarie*.

** 12. L'Ecureuil volant.

Sciurus obſcurè cinereus aut rufeſcens, cute ab anticis cruribus ad poſtica membranæ in modum extensâ, volans... Sciurus volans.

Sciurus hypocondriis prolixis volitans. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 18. *ſp.* 2.
Faun. Suec. Linn. N°. 22.

Sciurus Americanus volans. *Raj. Syn. Quadr. p.* 215.
Sciurus petauriſta volans. *Klein. Quadr. p.* 54.
Sciurus volans. *Seb. Vol. I. p.* 67. *Fig. T.* 41. *F.* 3. (*Fig. optima*).
Mus Ponticus aut Scythicus, Sciurus-ve alius, quem volantem cognominant. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 111. (*Fig. ſat bona*).
Mus Ponticus, Scythicus, volans. *Rzac. auct. p.* 315.
Quimichpatlan, ſeu Mus volans. *Jonſt. Quadr. p.* 114.
Aſſapanick à Barbaris dictus. *Jo. de Laet. p.* 82.
Ecureuil volant. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 76. & 77. (*Fig. très bonnes*).
Ecureuil volant, connu ſous le nom de *Rat de Pont* ou *de Tartarie* de Geſner. *Tranſ. Phil. an.* 1733. *p.* 35. *Fig. Pl.* 1. (*Fig. très bonne*).
Les Polonois l'appellent WIEWIORKA LATAIACA. *Rzac.*
Les Moſcovites, LETAGA. *Rzac.*
Les Ruſſes, POLATUCHA. *Rzac.*
Les Suédois, FLYGANDE IKORN. *Linn.*
Les Anglois, FLYING SQUIRREL. *Raj.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 5 pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ſes oreilles de 5 lignes; & celle de ſa queue de 5 pouces 3 lignes. Il a les oreilles rondes; les yeux grands & noirs; une mouſtache composée de poils noirs longs d'un pouce & demi; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous garnis d'ongles pointus & recourbés. La peau des côtés, qui eſt attachée aux jambes de devant & à celles de derriere ſelon leur longueur, peut être étendue comme une membrane: c'eſt par ſon moyen qu'il peut parcourir en l'air un grand eſpace; car il vole la longueur de 40 toiſes: il ne peut en volant ni s'élever, ni garder la ligne horizontale; mais il deſ-

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, eſt circiter 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 5 pollicum cum 3 lineis. Auriculas habet rotundas; ingentes & nigros oculos; myſtacem pilis nigris 1 ½ pollicem longis conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus verò 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos. Laterum cutis, quæ cruribus anterioribus & poſterioribus ſecundùm ipſorum longitudinem connectitur, inſtar membranæ extendi poteſt: ope illius loca maximè à ſe diſtantia facilè ſaltu attingit; 40 enim ſexpedarum longitudinem volatu, vel potiùs ſaltu percurrit. Volando aut ſursùm tendere, aut horizon-

taliter aerem percurrere nequit, ſed deorsùm obliquè tendit. Pili denſiſſimi ſunt & molliſſimi, suprà corpus aut obſcurè cinerei aut rufeſcentes, infrà verò albicantes: pili caudæ ejuſdem ferè coloris ac corporis pars ſuperior. Habitat in *Poloniâ*, *Laponiâ*, *Finlandiâ*, *Novâ Hiſpaniâ*, *Virginiâ*, & *Canadâ*.

cend obliquement. Ses poils, qui ſont tres épais & très doux au toucher, ſont d'un gris obſcur ou rouſſâtres en deſſus du corps, & blanchâtres en deſſous: ceux de ſa queue ſont à peu près de la même couleur que le deſſus du corps. On le trouve en *Pologne*, en *Laponie*, en *Finlande*, dans la *Nouvelle Eſpagne*, en *Virginie*, & en *Canada*.

** 13. L'ECUREUIL VOLANT DE SIBERIE.

Sciurus dilutè cinereus, cute ab anticis cruribus ad poſtica membranæ in modum extensâ, volans... SCIURUS SIBERICUS VOLANS.

A præcedente differt magnitudine quâ eum antecellit, caudâ breviori, & colore per univerſum corpus dilutè cinereo. Habitat in *Siberiâ*. Ex Muſeo *Realmuriano*.

Il différe du précédent en ce qu'il eſt un peu plus grand, qu'il a la queue plus courte, & par ſa couleur, qui eſt partout le corps d'un joli petit gris. On le trouve en *Siberie*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

14. L'ECUREUIL VOLANT DE VIRGINIE.

Sciurus, cute à capite ad anum membranæ in modum lateraliter extensâ, volans... SCIURUS VIRGINIANUS VOLANS.

Sciurus cute à capite ad caudam relaxatâ volans. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 4. *g.* 20. *ſp.* 4.
Sciurus Virginianus petauriſta. *Klein. Quadr. p.* 55.
Sciurus Virginianus volans. *Seb. Vol. I. p.* 72. *Fig. T.* 44. *F.* 3. (*Fig. optima*).

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, eſt circiter $5\frac{1}{2}$ polli-

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'envi-

ron 5 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, d'environ 15 lignes; celle de ſes oreilles de 8 lignes; & celle de ſa queue de 4 ½ pouces. Il a à chaque pied 5 doigts, armés de petits ongles pointus & crochus; le pouce eſt ſéparé des autres doigts. Il peut voler à l'aide de la peau des côtés, qui peut s'étendre comme une membrane : elle commence à avoir cette faculté ſous la gorge, de là au ſommet de la tête, enſuite aux jambes de devant, & à celles de derriere, & de là à l'anus auprès de l'origine de la queue. La partie ſupérieure de ſon corps eſt rouſſe, & l'inférieure eſt d'un cendré qui tire ſur le jaune. On le trouve en *Virginie*.

cum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 circiter linearum; auricularum 8 linearum; caudæ 4 ½ pollicum. Pedes ſinguli in 5 digitos, acutis & incurvis unguiculis munitos, fiſſi ſunt, pollice ab aliis digitis remoto. Ope cutis laterum, quæ à gutture ad cervicem protenditur, indè ad anteriora crura, deindè etiam ad poſteriora, & tandem ad anum uſque propè caudæ exortum, quæque membranæ inſtar extendi poteſt, aerem percurrit. In parte corporis ſuperiore rufeſcit; in inferiore verò ex cinereo flaveſcit. Habitat in *Virginiâ*.

X X V.

Le Genre du Loir.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants ſur le corps :
La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît ronde.

X X V.

Genus Gliris.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo :
Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis deſtitutum :
Cauda longa, veſtita pilis ità diſpoſitis ut caudam rotundam efficiant.

1. Le Loir.

Glis ſuprà obſcurè cinereus, infrà ex albo cineraſcens... Glis.

Glis Geſneri & aliorum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 229.

Glis. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 619. (*Fig. mala*).

Geſn.

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 109. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 25.
Sciurus Epilepticus. *Klein. Quadr. p.* 54.
Loir. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 40. *Fig. Pl.* 7. (*Fig. aſſez bonne*).
Les Hébreux l'appellent AKBAR. *Geſn.*
Les Chaldéens, AKBERA. *Geſn.*
Les Arabes, PIR, *ou* PHIR. *Geſn.*
Les Eſpagnols, LIRON. *Geſn.*
Les Italiens, GALERO, GLIERO; *ou* GHIRO. *Geſn.*
Les Suiſſes, RELL, *ou* RELLMUSS, *ou* GROSSE HASSELMUSS. *Geſn. Raj.*
Les Allemands, GREUL. *Geſn.*
Les Polonois, SCZUZEK. *Geſn.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 4 ½ pollicum; caudæ 3 ½ pollicum. Oculos habet magnos; auriculas longas; pedes pedibus *Ratti* ſimiles. Pili in parte corporis ſuperiore ſunt obſcurè cinerei, in inferiore verò ex albo cineraſcentes. Habitat in ſylvis.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 4 ½ pouces: ſa queue eſt longue de 3 ½ pouces. Ses yeux ſont grands; ſes oreilles longues; ſes pieds ſemblables à ceux du *Rat*. La couleur de ſon poil eſt un gris obſcur dans la partie ſupérieure de ſon corps, & un blanc gris dans la partie inférieure. On le trouve dans les forêts.

** 2. LE LÉROT.

Glis ſuprà obſcurè cinereus, infrà ex albo cineraſcens, maculâ ad oculos nigrâ.

Mus Avellanarum major. *Raj. Syn. Quadr. p* 219.
Klein. Quadr. p. 56. *Not.* 48.
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439.
Jonſt. Quadr. p. 116.
Mus Avellanarum. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 833. (*Fig. bona*).
Rzac. Auct. p. 315.
Mus Avellanarius. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 66. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 25.
Sorex Plinii. *Geſn. Quadr. p.* 834.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 115. (*Fig. bona*).
Les Eſpagnols l'appellent SORCE, *ou* RATON PEQUENNO. *Geſn.*
Les Allemands, HASERMUSS. *Geſn.* HASELMAUS. *Rzac.*
Les Polonois, MYSZORZECHOWA; KOSZALKA. *Rzac.*

Les Flamands, SLAEP RATTE. *Geſn.*
Les Anglois, GREATER DORMOUSE, *ou* SLEEPER. *Raj.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 5 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ſes oreilles de 6 lignes; celle de ſa queue de 4 pouces. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles arrondies, tranſparentes, & couvertes de poils extrémement courts; une mouſtache compoſée de poils partie noirs & partie blancs; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. La couleur de ſon poil eſt un gris obſcur dans la partie ſupérieure du corps, & un blanc gris dans la partie inférieure: autour des yeux eſt une tache noire, & une autre audeſſous des oreilles. Sa queue, depuis ſon origine juſqu'à la moitié de ſa longueur, eſt couverte en deſſus de poils variés de roux & de noir, & en deſſous d'un roux blanchâtre: dans le reſte de ſa longueur elle eſt noire en deſſus, & blanche en deſſous. On le trouve dans les bois, & dans les endroits où il y a des fruits.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 5 $\frac{1}{2}$ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; auricularum 6 linearum; caudæ 4 pollicum. Oculos habet ingentes & nigros; auriculas ſubrotundas, pellucidas, & pilis breviſſimis obſitas; myſtacem partìm nigris partìm albis pilis conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5. Pili in parte corporis ſuperiore ſunt obſcurè cinerei, in inferiore ex albo cineraſcentes: macula eſt circà oculos nigra, altera macula ejuſdem coloris infrà auriculas. Cauda, ab exortu ad mediam longitudinem uſque, obſita eſt in parte ſuperiore pilis ex rufo & nigro variis, in inferiore pilis ex rufo albicantibus, alterâ medietate ſupernè nigrâ, infernè albâ. Habitat in ſylvis, & in locis in quibus fructus creſcunt.

** 3. LE CROQUE-NOIX.

Glis ſuprà rufus, infrà albicans.

Mus caudâ longâ piloſâ, corpore rufo, gulâ albicante. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp. 9.*

Faun. Suec. Linn. N°. 32.
Mus Avellanarum minor. *Raj. Syn. Quadr. p.* 220.
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439. *Fig. p.* 440. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 116.
Les Italiens l'appellent MOSCARDINO. *Aldro.*
Les Suédois, SKOGSMUS. *Linn.*
Les Anglois, DORMOUSE, *ou* SLEEPER. *Raj.*

Soricem magnitudine æmulatur. Caudam habet corpore paulò longiorem; auriculas breves & rotundas; ingentes & nigros oculos; myſtacem pilis nigris & raris conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos, excepto pollice pedum poſteriorum, qui caret ungue, & ab aliis digitis eſt remotus. Pili in parte corporis ſuperiore ſunt rufi, in inferiore verò albicantes, paululùm flavicante admixto. Habitat in *Europæ* ſylvis.

Il eſt de la grandeur d'une *Souris*. Il a la queue un peu plus longue que le corps; les oreilles courtes & rondes; les yeux grands & noirs; une mouſtache compoſée de poils noirs, & clair-ſemés; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, armés d'ongles crochus & pointus: le pouce des pieds de derriere eſt ſéparé des autres doigts, & n'a point d'ongle. La couleur de ſon poil eſt rouſſe dans la partie ſupérieure du corps, & blanche, mêlée d'un peu de jaunâtre, dans la partie inférieure. On le trouve en *Europe* dans les bois.

4. LA MARMOTTE DE BAHAMA.

Glis fuſcus.... MARMOTA BAHAMENSIS.

Cavia Bahamenſis. *Klein. Quadr. p.* 50.
Lapin de Bahama. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 79. (*Fig. bonne*).

Noſtrate Cuniculo paulò minor eſt. Auriculas habet & pedes auriculis & pedibus *Murinis* ſimiles. Color pilorum fuſcus. Habitat in *Bahamâ*.

Elle eſt un peu plus petite que *notre Lapin*. Elle a les oreilles & les pieds ſemblables à ceux du *Rat*. La couleur de ſes poils eſt brune. On la trouve à *Bahamâ*.

5. La Marmotte d'Amérique.

Glis fuſcus, roſtro è cinereo cœruleſcente... Marmota Americana.

Glis Marmota, Americanus. *Klein. Quadr. p.* 56.
Monax, ou Marmotte d'Amérique. *Edwards. Tom. II. Fig. p.* 104. (*Fig. tres bonne*).
Marmotte Amériquaine. *Cat. app. p.* 28.

Elle eſt environ de la groſſeur de *notre Lapin*. Elle a les yeux noirs & à fleur de tête; les oreilles courtes & rondes; une mouſtache compoſée de poils roides comme des *ſoyes*, & en outre de pareils poils de chaque côté de la tête, un peu au-delà des coins de la bouche; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous très longs, & armés d'ongles longs & pointus. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un brun plus foncé ſur le dos, un peu plus clair ſur les côtés, & encore plus clair ſur le ventre. Le muſeau eſt d'un cendré clair & bleuâtre: les ongles, les doigts & les pieds juſqu'au talon ſont noirs. La queue, qui a plus de la moitié de la longueur du corps, eſt couverte de poils bruns & noirâtres. On la trouve en *Amérique*, & ſurtout à *Maryland*.

Noſtratis Cuniculi magnitudinem circiter æquat. Oculos habet exſtantes & nigros; auriculas breves & rotundas; myſtacem pilis *ſetarum* inſtar rigidis conflatum, & præterea ſimiles pilos in utroque capitis latere ultrà oris angulos; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5, omnes longiſſimos, longis & acutis unguibus munitos. Per univerſum corpus veſtitur pilis fuſcis ſaturatiùs in dorſo, dilutè in lateribus, in ventre dilutiùs. Roſtrum ex dilutè cinereo cœruleſcit: ungues, digiti, & pedes ad talum uſque nigricant. Cauda, quæ pluſquam mediam corporis longitudinem attingit, pilis veſtitur fuſcis & nigreſcentibus. Habitat in *Americâ*, & præſertim in *Marglandiâ*.

** 6. La Marmotte de Pologne.

Glis flavicans, capite rufeſcente... Marmota Polonica.

Mus Alpinus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 233.
Rzac. Auct. p. 327.
Mus Montanus quorumdam. *Rzac.*
Les Italiens l'appellent Marmontana. *Rzac.*
Les Allemands, Murmelthier. *Rzac.*
Les Polonois, Bobak; Swiszez. *Rzac.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 1 ½ pedis eſt; capitis, à naribus ad occipitium, 4 pollicum; caudæ totidem. Auriculas habet breviſſimas & rotundas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis eſt breviſſimus & obtuſus: pedum poſteriorum digiti 3 intermedii duobus lateralibus ſunt longiores. Univerſum corpus pilis flavicantibus veſtitur, capite tamen & caudâ paululùm rufeſcentibus. Habitat in *Poloniâ*.

Elle a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 1 ½ pied: ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, eſt longue de 4 pouces: ſa queue eſt de la même longueur. Ses oreilles ſont très courtes & rondes. Elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un ongle très court & obtus: les 3 doigts du milieu des pieds de derriere ſont plus longs que les 2 autres. Tout ſon corps eſt couvert de poils jaunâtres: ſa tête eſt un peu rouſſe, ainſi que ſa queue. On la trouve en *Pologne*.

** 7. La Marmotte des Alpes.

Glis pilis è fuſco & flavicante mixtis veſtitus... Marmota Alpina.

Glis, Marmota Italis. Mus Alpinus Plinii. *Klein. Quadr. p.* 56.
Mus caudâ elongatâ nudâ, corpore rufo. Marmota. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 21. *ſp.* 11.
Mus Alpinus Plinii, Marmota Italis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 221.
Mus Alpinus, ſive Marmota. *Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p.* 445. [*Fig. ſat bona*].

Charlet. Exer. p. 19.
Mus Alpinus. *Geſn. Quadr. p.* 840. *Fig. p.* 841. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 108. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 117. *Fig. T.* 67. [*Fig. bona*].
Marmotte. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 33. *Fig. Pl.* 7. [*Fig bonne*].
Les Italiens l'appellent MURMONT; MARMOTA; MARMONTANA; VAROZA. *Geſn.*
Les Griſons, MONTANELLA. *Geſn.*
Les Allemands & les Suiſſes, MURMELTHIER; MURMENTLE; MISTBELLERLE. *Geſn.*
Les Suédois, MORMELDIUR. *Linn.*

La longueur de ſon coprs, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 1 ½ pied; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 3 pouces 9 lignes; celle de ſes oreilles de 7 lignes; & celle de ſa queue, depuis ſon origine juſqu'au bout des poils, qui ſont fort longs, de 6 pouces. Elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, dont les 3 du milieu ſont plus longs que les 2 lateraux. Tout ſon corps eſt couvert de poils rudes, variés de brun & de jaunâtre dans la partie ſupérieure du corps, & tout à fait jaunâtres dans la partie inférieure : ceux de la queue ſont variés de noir & de jaunâtre. On la trouve dans les *Alpes.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 1 ½ pedis eſt; capitis, à naribus ad occipitium, 3 pollicum cum 9 lineis; auricularum 7 linearum; caudæ, ab exortu ad extremitatem uſque pilorum, qui longiſſimi ſunt, 6 pollicum. Pedes anteriores in 4 digitos fiſſi ſunt, poſteriores verò in 5, quorum 3 intermedii duobus lateralibus ſunt longiores. Univerſum corpus veſtitur pilis rigidis, ex fuſco & flavicante variegatis in parte corporis ſuperiore, in inferiore verò flavicantibus: pili caudæ ex nigro & flavicante variegantur. Habitat in *Alpibus.*

8. LA MARMOTTE DE STRASBOURG.

Glis ex cinereo rufus in dorſo, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis... MARMOTA ARGENTORATENSIS.

Mus caudâ elongatâ, corpore cinereo, rutilo nigroque longitudinaliter vario. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 21 *ſp.* 10.

Glis Cricetus, Geſneri. *Klein. Quadr. p.* 56.
Cricetus Geſneri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 221.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 232.
Rzac. auct. p. 326.
Cricetus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 836.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 113.
Arctomys Paleſtinæ ſecundùm Gelenium. *Raj. Geſn.*
Porcellus frumentarius Schwenckfeldii. *Rzac.*
Mus magnus campi quorumdam. *Rzac.*
Auprès de Straſbourg on l'appelle KORNFÄRLE. *Geſn.*
Les Polonois l'appellent SKRZECZEK ; CHOMIK. *Rzac.*
Les Allemands, HAMSTER, *ou* HAMESTER. *Geſn. Rzac.*

Quoad magnitudinem *Rattum* inter & *noſtratem Cuniculum* medio pollet. Pedes habet admodùm breves; caudam 8 circiter pollices longam. Capitis pars ſuperior, dorſum, & cauda ex cinereo rufeſcunt : tempora rutila ſunt, ſicut & latera : venter eſt niger, & guttur candidum; & inſuper utrumque latus maculis albis tribus numero diſtinguitur. Habitat in agris circà *Argentoratum*, in *Turingiâ*, *Miſniâ* & *Poloniâ*.

Sa grandeur tient le milieu entre le *Rat* & *notre Lapin*. Elle a les pieds très courts, & la queue longue d'environ 8 pouces. Le deſſus de la tête, le dos, & la queue ſont d'un gris roux : les temples & les côtés ſont roux : la gorge eſt blanche, & le ventre noir ; de plus les côtés ſont marqués chacun de 3 taches blanches. On la trouve auprès de *Straſbourg*, dans la *Turinge*, la *Miſnie*, & la *Pologne*.

XXVI.

Genus Muris.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo :
Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis deſtitutum :
Cauda nuda, aut raris pilis obſita.

XXVI.

Le Genre du Rat.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants ſur le corps :
La queue nuë, ou couverte de poils clair ſemés.

Obſ. 1°. Les eſpeces de ce Genre ſe diſtinguent entr'elles par la longueur de leur queue, & par leurs couleurs: les unes ont la queue plus longue que le corps; d'autres ont la queue à peu près de la longueur du corps; & d'autres l'ont beaucoup plus courte. J'appelle la premiere *queue très longue*; la ſeconde *queue longue*; & la troiſiéme *queue courte*. J'entends par la longueur du corps, la diſtance qu'il y a depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue.

Obſ. 2°. Toutes les eſpeces de *Rats* ont les pieds de derriere plus longs que ceux de devant.

Obſ. 1°. Hujus Generis ſpecies coloribus & caudæ longitudine inter ſe diſtinguntur: aliæ caudam habent corpore longiorem; aliæ caudam corporis circiter longitudine; aliæ caudam corpore multò breviorem. Primam *caudam longiſſimam*; ſecundam *caudam longam*; tertiam denique *caudam brevem* vocavi. Per corporis longitudinem, intelligo diſtantiam occipitium inter & caudæ exortum.

Obſ. 2°. Omnes hujus Generis ſpecies pedes habent poſteriores anterioribus longiores.

** 1. LE RAT.

Mus caudâ longiſſimâ, obſcurè cinereus... RATTUS.

Mus caudâ longâ, ſubnudâ, corpore fuſco cineraſcente. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp. 6.*
Faun. Suec. Linn. N°. 28.
Mus, Rattus domeſticus. *Klein. Quadr. p. 57.*
Mus domeſticus major, ſive Rattus. *Raj. Syn. Quadr. p. 217.*
Sloane. Vol. II. p. 330.
Geſn. Quadr. Fig. p. 829. [Fig. ſat bona].
Geſn. Icon. Quadr. p. 114. Fig. p. 115. (Fig. ſat bona).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 415.
Jonſt. Quadr. p. 115. Fig. T. 66. ſub iſto nomine, Glires. *(Fig. bonis).*
Sorex. *Charlet. exer. p. 25.*
Guabiru Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. p. 229.*
Les Grecs l'appellent Μῦς.
Les Eſpagnols, RATON. *Geſn. Aldro.*
Les Portugais, RATO DA CASA. *Marcgr.*
Les Italiens, RATO DI CASA; PANTEGANA; SOURCO. *Geſn.*
Les Allemands, RATZ. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, SEZUREZ. *Aldro.*
Les Anglois, RAT; RATTE. *Raj. Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 7 pouces; celle de ſa tête,

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 7 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium,

tium, 2 circiter pollicum. Caudam habet corpore longiorem; auriculas magnas ſubrotundas, & pellucidas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguiculus eſt breviſſimus. Per univerſum corpus veſtitur pilis obſcurè cinereis; cauda verò ſquamis minimis, pilis quibuſdam rariſſimis intermixtis, tegitur. Dantur & toti albi. Habitat in domibus.

depuis les narines juſqu'à l'occiput, d'environ 2 pouces. Sa queue eſt plus longue que le corps: ſes oreilles ſont grandes, arrondies & tranſparentes. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un petit ongle tres court. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un brun obſcur, & ſa queue de tres petites écailles, entre leſquelles ſont quelques poils tres clair-ſemés. Il y en a qui ſont tout à fait blancs. On le trouve dans les maiſons.

** 2. LA SOURIS.

Mus caudâ longiſſimâ, obſcurè cinereus, ventre ſubalbeſcente... SOREX.

Mus caudâ nudiuſculâ, corpore cinereo-fuſco, abdomine ſubalbeſcente. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp.* 8.
Faun. Suec. Linn. N°. 31.
Mus minor; Muſculus vulgaris domeſticus, caudâ tereti longâ. K*lein. Quadr. p.* 57.
Mus domeſticus vulgaris, ſeu minor. *Raj. Syn. Quadr. p.* 218.
Sloane. Vol. II. p. 330.
Mus domeſticus communis vel minor. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 114. (*Fig. ſat bona*).
Mus domeſticus minor. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 415. *Fig. p.* 417. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 115. *Fig. T. 66. ſub iſto nomine*, Mures. (*Fig. ſat bonis*).
Mus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 808. (*Fig. ſat bona*).
Sorex domeſticus. *Charlet. exer. p.* 25.
Carucvoca Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 229.
Les Hebreux l'appellent ACBAR. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, ACBERA. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Μυάριον, *ou* Μυσκος.
Les Arabes, PHIR, *ou* PHAR. *Geſn. Aldro.*

Les Sarraſins, Farra. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, Rat. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Topo; Sorice; Sorgio di Casa. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Musz. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois & les Illyriens, Myss. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, Mus. *Linn.*
Les Anglois, Mows. *Geſn. Aldro.* Mouse. *Raj. Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, eſt de 2 pouces 9 lignes; celle de ſa tête de 11 lignes; celle de ſes oreilles de 5 lignes; & celle de ſa queue de 3 pouces 4 lignes. Elle a les oreilles larges, arrondies & tranſparentes; les yeux grands & à fleur de tête; & le même nombre de doigts que le précédent. La couleur de ſes poils eſt un gris obſcur dans la partie ſupérieure de ſon corps, & un peu blanchâtre dans la partie inférieure. Quelques unes ſont tout à fait blanches. On la trouve dans les maiſons.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 2 pollicum cum 9 lineis; capitis 11 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 3 pollicum cum 4 lineis. Auriculas habet latas, ſubrotundas & pellucidas; oculos magnos exſtantes; pedum digitos, ut in præcedente. Pili in parte corporis ſuperiore obſcurè ſunt cinerei; in inferiore verò paululùm ſubalbeſcentes. Dantur & toti albi. Habitat in domibus.

** 3. Le Rat de bois.

Mus caudâ longiſſimâ, ſuprà dilutè fulvus, infrà albicans.
Mus Sylvestris.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 7 ½ pouces: ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, eſt longue de 2 pouces; & ſa queue de 7 ½ pouces: elle eſt, comme celle du *Rat*, couverte de tres petites écailles, entre leſquelles ſont quelques poils tres clair-ſe-

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 7 ½ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum; & caudæ 7 pollicum. Cauda verò, ſicuti & cauda *Ratti*, ſquamis minimis, pilis quibuſdam rariſſimis intermixtis, tegitur. Au-

riculas habet auriculis *Ratti* ſimiles. Pedes anteriores in 4, poſteriores in 5 digitos fiſſi ſunt : & loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis brevis & obtuſus extat. Corporis pars ſuperior, ſicut & crurum exterior, ſunt dilutè fulvæ ; inferior verò corporis pars, & crurum interior albæ. Habitat in ſylvis. Ex Muſeo *Realmuriano*.

més. Ses oreilles ſont ſemblables à celles du *Rat*. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un ongle tres court & obtus. Toute la partie ſupérieure du corps, & l'extérieure des jambes ſont d'un fauve clair ; & la partie inférieure du corps, & l'intérieure des jambes ſont blanches. On le trouve dans les bois. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

4. LE GRAND RAT DES CHAMPS.

Mus caudâ longiſſimâ, fuſcus, ad latera rufus... MUS CAMPESTRIS MAJOR.

Mus agreſtis major, Macrouros Geſneri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 219.
Klein. Quadr. p. 57. *Not.* 50.
Mus agreſtis major. *Geſn. Quadr. p.* 830. *Fig. p.* 1104. (*Fig. ſat bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. [*Fig. ſat bona*].
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 436.
Mus agreſtis. *Rzac. auct. p.* 328.
Les Italiens l'appellent CAMPAGNOLI. *Aldro.*
Les Allemands, FELDMUSZ ; ERDMUSZ ; NŮLMUSZ, *ou* NIELMUSZ. *Geſn. Rzac.*
Les Anglois, FELDMUSZ. *Geſn.*
Les Polonois, MYSS POLNA. *Rzac.*

Ratti magnitudinem circiter attingit. Caudam, ut ille, longam habet & craſſam ; auriculas rotundas ; caput magnum & rotundum. Pilorum color per univerſum corpus fuſcus eſt, exceptis lateribus, in quibus rufus. Habitat in agris.

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Rat*. Il a, comme lui, la queue longue & groſſe : ſes oreilles ſont rondes ; ſa tête groſſe & arrondie. Tout ſon corps eſt couvert de poils bruns, excepté aux côtés, où ils ſont roux. On le trouve dans les champs.

5. La Souris d'Amérique.

Mus caudâ longiſſimâ, dilutè ſpadiceus... Sorex Americanus.

Mus Americanus pilis dilutè ſpadiceis veſtitus. *Seb. Vol. I. p.* 177. *Fig. T.* 111. *F. 6.* (*Fig. optimâ*).

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 3 pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, d'un pouce; & celle de ſa queue de 3 pouces 8 lignes. Elle a le muſeau un peu pointu; & les oreilles grandes & larges. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un bay-rouge clair. On la trouve en *Amérique*.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 3 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pollicis; & caudæ 3 pollicum cum 8 lineis. Roſtrum paulò acutum eſt; auriculæ magnæ & latæ. Pili dilutè ſpadicei universum corpus veſtiunt. Habitat in *Americâ*.

6. Le Rat d'Amérique.

Mus caudâ longiſſimâ, ſuprà ex rufo flaveſcens, infrà albicans, auriculis retrorsùm ſitis... Rattus Americanus.

Mus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 58.
Seb. Vol. II. p. 30. *Fig. T.* 29. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 3 ½ pouces: ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, a environ 15 lignes de long; & ſa queue 4 pouces: elle eſt blanchâtre, & hériſſée de quelques poils. Ses oreilles ſont aſſez grandes, blanchâtres, & placées plus en arriere que dans les autres eſpeces de ce genre. Ses pieds de derriere ſont plus grands & plus

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 3 ½ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 circiter linearum; caudæ 4 pollicum. Caudam habet albeſcentem, pilis quibuſdam raris hiſpidam; auriculas ſat magnas, albeſcentes, plus retrorsùm ſitas quàm in aliis hujus generis ſpeciebus; pedes poſteriores

anterioribus majores & craſſiores. Dorſum & capitis pars ſuperior ex rufo flaveſcunt: pedes 4 & venter albicant. Habitat in *Americâ*.

gros que ceux de devant. Son dos & la partie ſupérieure de ſa tête ſont d'un roux jaunâtre; le ventre & les 4 pieds ſont blancs. On le trouve en *Amérique*.

7. Le Rat blanc de Virginie.

Mus caudâ longâ, albus, myſtace nigricante... Mus albus Virginianus.

Mus agreſtis Virginianus albus. *Klein. Quadr. p.* 57.
Seb. Vol. I. p. 76. *Fig. T.* 47. *F.* 4. (*Fig. optimâ*).

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 3 ½ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; caudæ 2 pollicum cum 9 lineis. Caput habet acuminatum, & myſtacem pilis longis nigricantibus conflatum; caudam in exortu craſſam, in acumen deſinentem, piliſque longis & raris obſitam. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus albis. Habitat in *Virginiâ*.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 3 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 15 lignes; & celle de ſa queue de 2 pouces 9 lignes. Il a la tête oblongue, & une mouſtache compoſée de poils longs & noirâtres. Sa queue, qui eſt groſſe à ſon origine, ſe termine en pointe, & eſt garnie de poils longs & clairſemés. Tout ſon corps eſt couvert de poils blancs & courts. On le trouve en *Virginie*.

8. Le Rat de Norvége.

Mus caudâ longâ, ex dilutè cinereo fuſcus... Mus Norvegicus.

Mus ex Norvagiâ cinereo fuſcus. *Seb. Vol. II. p.* 64. *Fig. T.* 63. *F.* 5. [*Fig. bona*].
Glis Norvagicus. *Klein. Quadr. p.* 56.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ ex-

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue,

environ 4 ½ pouces ; depuis les narines juſqu'à l'occiput, 1 ½ pouce : ſa queue a 3 ½ pouces de long. Il a une mouſtache compoſée de longs poils. Ses oreilles ſont courtes & larges ; ſon dos large & courbé ; ſon ventre pendant ; ſes cuiſſes groſſes ; ſes doigts longs, & armés d'ongles pointus. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un cendré clair, tirant ſur le brun. On le trouve en *Norvége.*

ortum, 4 ½ circiter pollicum ; capitis, à naribus ad occipitium, 1 ½ pollicis ; caudæ 3 ½ pollicum. Myſtacem habet longis pilis conflatum ; auriculas breves & latas ; dorſum latum, incurvum ; ventrem pendulum ; femora craſſa ; digitos longos, acutis unguibus munitos. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex dilutè cinereo fuſcis. Habitat in *Norvegiâ.*

** 9. Le Mulot.

Mus caudâ longâ, ſuprà è fuſco flaveſcens, infrà ex albo cineraſcens.

Mus caudâ longâ, corpore nigro flaveſcente, abdomine albo. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 21. *ſp.* 7.
Faun. Suec. Linn. N°. 30.
Mus domeſticus medius. *Raj. Syn. Quadr. p.* 218.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 4 ½ pouces ; celle de ſa tête de 15 lignes ; & celle de ſa queue de 3 ½ pouces. Il a les yeux grands, & à fleur de tête ; les oreilles larges, rondes & tranſparentes ; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un ongle court & obtus. La couleur de ſes poils eſt un brun jaunâtre dans la partie ſupérieure de ſon corps, &

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 4 ½ pollicum ; capitis 15 linearum ; caudæ 3 ½ pollicum. Oculos habet magnos & prominentes ; auriculas latas, rotundas, & pellucidas ; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5 : loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis eſt brevis & obtuſus. Pili in parte corporis ſuperiore ex fuſco flaveſcunt ; in inferiore ex albo cineraſcunt ; in lateribus capitis ru-

feſcunt. Habitat in ſylvis, agris, & hortis.

un blanc tirant ſur le gris dans l'inférieure : il y a un peu de rouſsâtre à chaque côté de la tête. On le trouve dans les bois, les champs & les jardins.

10. LE RAT ORIENTAL.

Mus caudâ longâ, rufus, lineis in dorſo albicantibus, margaritarum æmulis... MUS ORIENTALIS.

Mus Orientalis. *Klein. Quadr. p.* 57.
Seb. Vol. II. p. 22. *Fig. T.* 21. *F.* 2. (*Fig. optimâ*).

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 2 eſt pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 8 aut 9 linearum; caudæ, 1 $\frac{1}{2}$ pollicis. Auriculas habet breviſſimas, ſicut & crura; pedes latos; caudam craſſam. Pilorum color rufus eſt, lineis albicantibus margaritarum æmulis per dorſum diſtinctus. Habitat in *Indiâ Orientali*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 2 pouces. Sa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, a 8 ou 9 lignes de long; & ſa queue 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Il a les oreilles & les jambes tres courtes; les pieds aſſez larges, & la queue groſſe. La couleur de ſon poil eſt rouſſe. Il a ſur le dos des rayes blanchâtres, qui paroiſſent perlées. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

** 11. LE RAT D'EAU.

Mus caudâ longâ, pilis ſuprà ex nigro & flaveſcente mixtis, infrà cinereis veſtitus... MUS AQUATICUS.

Mus major aquaticus, ſive Rattus aquaticus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 217.
Mus, Rattus aquatilis. *Klein. Quadr. p.* 57.
Mus aquatilis, QUADRUPES Bellonii. *Geſn. Icon. aquat. Fig. p.* 354. [*Fig. mala*].
Mus aquatilis. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 447.
Mus aquaticus. *Geſn. Quadr. p.* 830.
Jonſt. Quadr. p. 117.
Bell. de aquat. p. 35. *Fig. p.* 36. (*Fig. mala*).
Rzac. auct. p. 328.

Sorex aquaticus. *Charlet. exer. p.* 25.

Caſtor caudâ lineari tereti. Rattus aquaticus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 20. *ſp.* 3.

Faun Suec. Linn. N°. 25.

Les Grecs l'appellent Μῦς ἔνυδρος.

Les Italiens, SORGO MORGANGE. *Geſn. Aldro.*

Les Polonois, MYSS WODNA. *Rzac.*

Les Allemands, WASSER-MUSZ. *Geſn. Aldro. Rzac.* WASSER-RATZ. *Geſn.*

Les Suédois, WATN-ROTTA. *Linn.*

Les Anglois, WATTER-RATTE. *Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 6 pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 2 pouces; celle de ſa queue de 4 pouces 3 lignes : le tour de ſon corps eſt de 4 ½ pouces. Il a les yeux aſſez grands; les oreilles courtes, rondes & preſque cachées dans ſes poils; 4 doigts aux pieds de devant & 5 à ceux de derriere: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, eſt un ongle court & obtus. Ses poils ſont mêlés de noir & de jaunâtre dans la partie ſupérieure de ſon corps, & dans la partie inférieure ils ſont cendrez, & mêlez d'un peu de jaunâtre. On le trouve dans des endroits aquatiques.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 6 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum; caudæ 4 pollicum cum 3 lineis; ambitus corporis 4 ½ pollicum. Oculos habet ſat magnos; auriculas breves, rotundas, & ferè in pilis occultas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5 : loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis eſt brevis & obtuſus. Pilorum color in parte corporis ſuperiore ex nigro & flaveſcente mixtus eſt, in inferiore cinereus, cum pauco flaveſcente admixto. Habitat in aquoſis locis.

12. LE PETIT RAT DES CHAMPS.

Mus caudâ brevi, pilis è nigricante & ſordidè luteo mixtis in dorſo, & ſaturatè cinereis in ventre veſtitus... MUS CAMPESTRIS MINOR.

Mus caudâ brevi, corpore nigro fuſco, abdomine cineraſcente. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 21. *ſp.* 4.

Faun.

Faun. Suec. Linn. No. 27.
Mus agreſtis capite grandi brachiuros. *Raj. Syn. Quadr. p.* 218.
Mus agreſtis capite grandi. *Klein. Quadr. p.* 57. *Not.* 50.
Mus agreſtis minor. *Geſn. Quadr. p.* 830.
Geſn. Icon. Quadr. p. 116.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 436.
Les Italiens l'appellent Campagnoli. *Aldro.*

Soricem magnitudine ſuperat. Corpus habet longius; caput grande; roſtrum breve, obtuſum; oculos parvos; auriculas breves, latas, ſubrotundas, in pilis, qui longiores ſunt quam in *Sorice*, penè occultatas; caudam pollicis longitudinem non multùm ſuperantem, & pilis quam in *Ratto* crebrioribus, non tamen denſis, veſtitam; crura perbrevia. Pilorum color è nigricante & ſordidè luteo mixtus eſt in dorſo, & ſaturatè cinereus in ventre. Habitat in agris, in meſſe frequens.

Il eſt plus grand que la *Souris*. Il a le corps allongé; la tête groſſe; le muſeau court & obtus; les yeux petits; les oreilles courtes, larges, arrondies, & preſque cachées dans ſes poils, qui ſont un peu plus longs que ceux de la *Souris*. Sa queue n'a gueres plus d'un pouce de long: elle eſt plus couverte de plois que celle du *Rat*, quoiqu'ils ſoient encore clair ſemez. Ses jambes ſont courtes. La couleur de ſes poils eſt mêlée de noirâtre & de vilain jaune ſur le dos, & d'un gris foncé ſur le ventre. On le trouve dans les champs, & ſur tout pendant la moiſſon.

SECTIO III.

Ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis deſtitutum habent.

Unico Genere, ſcilicet *Muſaranei*, conſtituitur hæc Sectio.

SECTION III.

Ceux qui ont des dents canines, & qui n'ont point de picquants ſur le corps.

Cette Section ne contient qu'un ſeul Genre, qui eſt celui de la *Muſaraigne*.

XXVII.

Le Genre de la Muſaraigne.
(Fig. 2.).

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives (Fig. 2. a. b.) à chaque mâchoire :
Des dents canines : (Fig. 2, c.)
Les doigts onguiculés :
Point de picquants ſur le corps.

XXVII.

Genus Muſaranei.
(Fig. 2.).

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo : (Fig. 2. a, b.)
Canini præſentes : (Fig. 2. c.)
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis deſtitutum.

** 1. La Musaraigne.

Muſaraneus ſuprà ex fuſco rufus, infrà albicans... Musaraneus.

Muſaraneus, roſtro productiore. Mus venenoſus. *Klein. Quadr. p.* 58.
Muſaraneus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 239.
Geſn. Quadr. Fig. p. 844. (*Fig. ſat bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 441. *Fig. p.* 442. [*Fig. mala*].
Jonſt. Quadr. p. 116. *Fig. T.* 66. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 25.
Muſaraneus; Mus cæcus; Mygale. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 116. (*Fig. ſat bona*).
Sorex. Muſaraneus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 22. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. No. 33.
Les Bourguignons l'appellent Sery. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Μυγαλή.
Les Eſpagnols, Raton Pequénno. *Geſn.* Murganho. *Aldro.*
Les Italiens, Toporagno. *Aldro.*
Les Griſons, Museraing. *Geſn. Aldro.*
Les Savoyards, Muset, *ou* Musette. *Aldro.*
Les Suiſſes, Mutzet. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Spitzmuss. *Geſn. Aldro.*
Les Siléſiens, Bisem-Muss. *Geſn.*
Les Illyriens, Niemegka-Myss. *Geſn.*
Les Polonois, Keret. *Geſn.*
Les Suédois, Nåbbmus. *Linn.*
Les Anglois, Shrew *Raj. Geſn. Aldro.* Shrew-Mouse, *ou* Hardy-Shrew. *Raj.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſ-

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ

exortum, 2 ½ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 9 linearum; caudæ 15 linearum. Naſum habet ultrà maxillam inferiorem multò prominentem, & acutiſſimum; oculos minimos & nigros; auriculas breves, ſicut & crura; in ſingulis pedibus digitos 5, quorum 3 intermedii pedum poſteriorum duobus lateralibus ſunt longiores; caudam pilis brevibus veſtitam. Pilorum color in parte corporis ſuperiore ex fuſco rufus eſt, in inferiore, ſicut & in 4 pedibus, albicans. Dentes habet inciſores in utrâque maxillâ binos, acutos; ſuperiores (*Fig.* 2. *a.*) bifidos & uncinatos; inferiores (*Fig.* 2. *b.*) rectè antrorſùm prominentes, apice recurvos: ſunt inſuper dentes canini in maxillâ ſuperiore 3 utrinque, quorum primus duobus aliis major; & in maxillâ inferiore duo utrinque, quorum primus ſequente minor eſt: dentes molares in maxillâ ſuperiore 4 utrinque, quorum ulterior parvus; & in maxillâ inferiore 3 utrinque: ſumma dentium 28. Habitat in agris.

qu'à l'origine de la queue, eſt de 2 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 9 lignes; celle de ſa queue de 15 lignes. Son nez avance beaucoup au delà de la mâchoire inférieure, & eſt très pointu. Elle a les yeux très petits & noirs; les oreilles & les jambes courtes; à chaque pied 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de derriere ſont plus longs que les 2 lateraux. Sa queue eſt couverte de poils courts. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt d'un brun roux, & l'inférieure eſt blanchâtre, ainſi que les 4 pieds. Elle a à chaque mâchoire 2 dents inciſives pointues: les ſupérieures (*Fig.* 2. *a.*) ſont échancrées & crochues; les inférieures (*Fig.* 2. *b.*) avancent droit en avant, & ſont un peu courbées vers le bout: elle a en outre 3 dents canines de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, dont la premiere eſt plus grande que les 2 autres; & 2 de chaque côté à la mâchoire inférieure, dont la premiere eſt plus petite que la ſuivante: de plus 4 dents molaires de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, dont la derniere eſt petite; & 3 de chaque côté à la mâchoire inférieure: en tout 28 dents. On la trouve dans les champs.

2. La Musaraigne du Brésil.

Muſaraneus fuſcus, tribus tæniis in dorſo nigris... Musaraneus Brasiliensis.

Muſaraneus. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 229.

La longueur de ſon corps, depuis l'extrêmité du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 5 doigts; & celle de ſa queue d'environ 2 doigts. Son muſeau eſt très pointu. Sa couleur eſt brune; & elle a 3 bandes noires qui s'étendent ſur le dos, ſelon ſa longueur, depuis la tête juſqu'à la queue. On la trouve au *Bréſil*.

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, circiter 5 digitorum; caudæ ferè 2. Os habet acutum. Color ipſius eſt fuſcus; & in dorſo, ſecundùm longitudinem, à capite ad caudam, 3 tænias habet nigras. Habitat in *Braſiliâ*.

SECTION IV.

Ceux qui ont des dents canines, & le corps couvert de picquants.

Il n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Hériſſon*.

SECTIO IV.

Ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeatum habent.

Unicum Genus, ſcilicet *Erinacei*, continet hæc Sectio.

XXVIII.

Le Genre du Hériſſon. (Fig. 3.)

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives (Fig. 3. a, b.) à chaque mâchoire:
Des dents canines:
Les doigts onguiculés:
Le corps couvert de picquants.

XXVIII.

Genus Erinacei. (Fig. 3.)

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo: (Fig. 3. a, b.)
Canini præſentes:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeatum.

** 1. LE HÉRISSON.

Erinaceus auriculis erectis... ERINACEUS.

Erinaceus auriculatus. Echinus terreſtris. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 11. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 16.
Echinus, ſivè Erinaceus terreſtris. *Raj. Syn. Quadr. p.* 231.
Echinus vel Herinaceus. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 106. *Fig. p.* 107. (*Fig. bona*).
Echinus terreſtris. *Geſn. Quadr. p.* 399. *Fig. p.* 400 [*Fig. bona*].
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 459.
Jonſt. Quadr. p. 119. *Fig. T.* 68. *ſub iſto nomine*, Herinaceus. (*Fig. bona*).
Muſ. Worm. p. 334.
Erinaceus noſtras. *Seb. Vol. I. p.* 78. *Fig. T.* 49. *F.* 1. & 2. (*Fig. optimis*).
Erinaceus. *Charlet. Exer. p.* 19.
Herinaceus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 233.
Rzac. auct. p. 326.
Hericius, Herix Sipontino. *Rzac.*
Acanthion vulgaris noſtras. Herinaceus: Echinus. *Klein. Quadr. p.* 66.
Acanthio terreſtris Galeni. *Rzac.*
Les Hébreux l'appellent KIPOD. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, KOPEDA. *Geſn.*
Les Grecs, Εχῖνος.
Les Eſpagnols, ERIZO. *Geſn. Aldro.*
Les Portugais, OURISO, *ou* ORICO CACHERO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, RICCIO, *ou* RIZO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, IGEL. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, GESS, *ou* MALOX, *ou* TZWIJERZATKO, *ou* OTZIJSCHAK. *Geſn.*
Les Polonois, IEZ; ZIEMUY. *Rzac.*
Les Suédois, IGELKOTT. *Linn.*
Les Hollandois, YSEREN VEREKEN. *Geſn.*
Les Anglois, URCHIN, *ou* HEDGEHOG. *Raj. Geſn. Aldrov.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 9 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, $2\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ 1 pollicis. Oculos habet parvos & extantes; auriculas latas, rotundas, & erectas; nares criſ-

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 9 pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de $2\frac{1}{2}$ pouces; celle de ſa queue d'un pouce. Ses yeux ſont petits & à fleur de tête; ſes oreil-

les larges, rondes & élevées; ſes narines dentelées comme la crête d'un *Coq*. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles: le pouce eſt plus court que les autres. Tout le deſſus du corps, ſçavoir le dos, les côtés, & le ſommet de la tête ſont couverts de picquants durs & pointus, variés de brun & de blanchâtre, dont les plus longs ont environ 1 ½ pouce: & la tête, ſi l'on en excepte le ſommet, la gorge, le ventre, les pieds & la queue ſont couverts de poils bruns ou blanchâtres. Il a à chaque mâchoire 2 longues dents inciſives; les ſupérieures (*Fig*. 3. *a*.) ſont éloignées l'une de l'autre, & les inférieures (*Fig*. 3. *b*.) preſque contigues: & en outre de chaque côté de la mâchoire ſupérieure ſont 4 petites dents canines ſéparées par paires, & 5 molaires, dont la premiere & la derniere ſont plus petites que les 3 du milieu; & de chaque côté de la mâchoire inférieure 3 petites dents canines contigues, & couchées obliquement en avant, & 4 molaires, dont la derniere eſt plus petite que les 3 autres: en tout 36 dents. On le trouve dans les bois.

tæ *Galli* inſtar dentatas; in ſingulis pedibus digitos 5 unguibus munitos, pollice aliis digitis breviore. Corporis pars ſuperior, dorſum ſcilicet, latera, & vertex capitis, aculeis teguntur rigentibus & acutis, ex fuſco & albido variis, majoribus 1 ½ pollicem circiter longis: caput verò, vertice excepto, gutturem, ventrem, pedes, & caudam pili aut fuſci aut albidi cooperiunt. Dentes ſunt inciſores in utrâque maxillâ duo longi, ſuperiores (*Fig*. 3. *a*.) à ſe invicem diſtantes, inferiores (*Fig*. 3. *b*.) ferè contigui: canini in maxillâ ſuperiore 4 utrinque parvi, per paria remoti; in inferiore 3 utrinque parvi, contigui, obliquè antrorsùm inclinati: molares in maxillâ ſuperiore 5 utrinque, quorum anterior & ulterior parvi ſunt, intermediis majoribus; in inferiore 4 utrinque, quorum 3 anteriores majores, & ulterior parvus: ſumma dentium 36. Habitat in ſylvis.

2. LE HÉRISSON DE SIBERIE.

Erinaceus auriculis planis... ERINACEUS SIBERICUS.

Erinaceus Sibericus. *Seb. Vol. I. p.* 79. *Fig. T.* 49. *Mas F.* 5. *& fœmina F.* 4. (*Fig. optimis*).

Acanthion echinatus. Echinus Sibiricus. *Klein. Quadr. p.* 66.

Si figura, quam iſtius ſpeciei *Seba* dedit, magnitudinem naturalem æquet, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, non ultrà 6 pollices longus eſt. Auriculas habet breves & planas; roſtrum breve, ſicut & caudam, quæ 6 linearum longitudinem non ſuperat; in ſingulis pedibus 5 digitos, pollice aliis breviore. Corporis pars ſuperior veſtitur aculeis craſſis, brevibus, acuminatis, ſaturatè rufis, apicibus auro quaſi obductis: venter verò tegitur pilis tenuiſſimis, laneis, dilutè cinereis, & auro quaſi obductis. Habitat in *Siberiâ*.

Si la figure, qu'en a donné *Séba*, eſt de grandeur naturelle, il ne paroît pas avoir plus de 6 pouces, du bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue. Il a les oreilles courtes & applaties; le muſeau court, ainſi que la queue, qui a tout au plus 6 lignes de long; à chaque pieds 5 doigts, dont le pouce eſt plus court que les autres. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt couverte de picquants gros, courts, pointus, d'un roux foncé, & dont le bout paroît d'un jaune doré: ſon ventre eſt garni de poils fins, laineux, d'un cendré clair, & qui ſemblent dorés. On le trouve en *Siberie*.

3. Le Hérisson de Malacca.

Erinaceus auriculis pendulis... Erinaceus Malaccensis.

Acanthion aculeis longiſſimis. Hyſtrix genuina; Porcus aculeatus, Malaccenſis. *Klein. Quadr. p. 66.*

Hyſtrix pedibus pentadactylis, cauda truncata. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 17. ſp. 4.*

Porcus aculeatus, ſeu Hyſtrix Malaccenſis. *Seb. Vol. I. p. 81. Fig. T. 51. F. 1. & 2.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad anum uſque, 8 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 ½ pollicum. Oculos habet magnos & lucidos; auriculas nudas ferè, & pendulas; in ſingulis pedibus 5 digitos unguibus brevibus munitos. Corporis pars ſupe-

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, environ 8 pouces: ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, eſt longue de 2 ½ pouces: ſes yeux ſont grands & brillants; ſes oreilles preſque dénuées de poils, & pendantes: il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles courts. Tout le deſſus de ſon corps eſt

hériſſé de picquants droits & pointus, comme des *alênes*, de différente longueur, ſçavoir depuis un pouce juſqu'à *6*, variés en partie de blanc & de noir, & en partie de blanc & de rouſsâtre : les eſpaces qui ſont entre ces picquants, ſont remplis de poils déliés, longs & ſoyeux : ſa tête eſt couverte de poils courts : ceux de ſon ventre, de ſes jambes, & de ſes pieds ſont déliés, courts, picquants, épais, & roux. On le trouve à *Java*, à *Sumatra*, & ſurtout à *Malacca*.

rior rectis & *ſubularum* inſtar acuminatis horret aculeis, à pollicari ad ſeſquipedalem uſque menſuram variæ longitudinis, partìm ex albo & nigro, partìm ex albo & ſubruſo variegatis : horum interſtitia pilis replentur tenuibus, longis, & *ſetarum* æmulis : caput brevibus pilis obſitum eſt : venter, crura, & pedes pilis rufis, brevibus, tenuibus, acuminatis, & denſis. Habitat in *Javâ*, *Sumatrâ*, & præſertim *Malaccâ*.

4. Le Hérisson d'Amérique.

Erinaceus auriculis nullis... Erinaceus Americanus.

Erinaceus ſubauriculatus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 11. *ſp.* 2.
Erinaceus Americanus albus. *Seb. Vol. I. p.* 78. *Fig. T.* 49. *F.* 3. [*Fig. optima*].
Echinus Indicus albus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 232.
Acanthion echinatus; Erinaceus Americanus albus, Surinamenſis. *Klein. Quadr. p. 66.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 8 pouces de long. Sa tête eſt groſſe & courte ; ſon col eſt court, ainſi que ſa queue, qui eſt couverte de très peu de poils. Il ne luy paroît point d'oreilles; mais il a à leur place des trous, par leſquels il entend. Ses pieds ont chacun 5 doigts armés d'ongles longs, aigus & crochus. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt couverte de

Corpus, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 8 circiter pollices longum eſt. Caput breve & craſſum; collum breve, ſicut & cauda, quæ raris obſita eſt pilis. Auricularum nullum apparet veſtigium; ſed loco ipſarum foramina ſunt aperta, quibus ſonum recipit. Pedes ſinguli in 5 fiſſi ſunt digitos longis, acutis, & incurvis unguibus munitos. Corporis pars ſuperior

perior aculeis tegitur brevibus, craſſis, rigidis, ex cinereo dilutè flaveſcentibus: capitis pars anterior, venter & pedes veſtiuntur pilis ſetaceis albicantibus: qui ventrem cooperiunt, longiores & molliores ſunt, quam qui *Erinacei noſtratis* ventrem obtegunt: ſuprà oculos breves ſunt pili obſcurè fuſci, ad latera verò retrorsùm longi nigricantes. Habitat in *Americâ.*

picquants courts, gros, durs, & d'un cendré tirant ſur le jaune paſle: le devant de ſa tête, ſon ventre & ſes pieds ſont couverts de poils ſoyeux & blanchâtres: ceux qui couvrent ſon ventre, ſont plus longs, & moins rudes, que ceux qui couvrent le ventre de nos *Hériſſons ordinaires*: il a au deſſus des yeux des poils courts d'un brun foncé, & aux côtés vers le derriere des poils longs & noirâtres. On le trouve en *Amérique.*

ORDRE XIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont quatre dents inciſives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre, les uns ont tous les doigts ſeparés les uns des autres: les autres ont ceux des pieds de devant joints enſemble par une membrane étendue en aîles. Ils ſe diviſent en deux Sections: dans la premiere ſont ceux qui ont tous les doigts ſeparés les uns des autres, comme les *Singes*: dans la ſeconde ſont ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étendue en aîles, comme la *Rouſſette*.

ORDO XIII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ quatuor, & digitis unguiculatis donata.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM alia ſunt quorum digiti omnes à ſe invicem omninò ſunt ſeparati: alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter ſe connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum omnes digiti à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Simiæ*: ſecunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter ſe connectuntur, ſicut *Pteropus*.

SECTION I.

Ceux dont tous les doigts ſont ſeparés les uns des autres.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, qui eſt celui des *Singes*.

SECTIO I.

Ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, ſcilicet *Simiarum*.

XXIX.

Genus Simiæ.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ quatuor:
Digiti unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati:
Pollex diſtinctus.

Obſ. 1°. Omnes Simiarum ſpecies ciliis in utraque palpebra donantur: 2 habent in pectore mammas; & anteriora & poſteriora crura brachiis & cruribus *hominum* ſimilia. Pedes anteriores manus *hominum* referunt, & manuum officium præſtant: poſteriores ſunt velut manus majuſculæ, & digitis, ut manus, conſtant, medio longiore; officiumque duplex, tum manuum ſcilicet, tum pedum præſtant.

Obſ. 2°. Quædam nullam habent caudam; aliæ caudatæ ſunt: ex utriſque aliæ ſunt roſtro brevi, aliæ roſtro productiore: inter caudatas, aliæ caudam breviſſimam, aliæ caudam longam habent. In 5 *Stirpes* dividuntur: prima eſt earum quæ nullam habent caudam, quæ ſunt roſtro brevi, quæque *Simiæ propriè dictæ* vocantur: ſecunda earum quæ nullam habent caudam, quæ ſunt roſtro productiore, quæque *Simiæ Cynocephalæ* dicuntur: tertia earum quæ caudam habent breviſſimam, & *Papiones* dictæ ſunt: quarta earum quæ caudam habent longam, quæ ſunt roſtro brevi, quæque *Cercopitheci ſimpliciter* dicuntur: quinta denique earum quæ cau-

XXIX.

Le Genre du Singe.

Son caractere eſt
D'avoir quatre dents inciſives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous ſeparés les uns des autres:
Le pouce bien diſtinct.

Obſ. 1°. Toutes les eſpeces de Singes ont des cils aux deux paupieres, deux mamelles à la poitrine, & les jambes de devant & celles de derriere ſemblables aux bras & aux jambes de *l'homme*. Leurs pieds de devant reſſemblent à la main de l'*homme* & en font l'office: ceux de derriere ſont comme de grandes mains; leurs doigts ſont ſemblables à ceux des mains, dont le milieu eſt le plus long: ils ſervent ſelon le beſoin & de pieds & de mains.

Obſ. 2°. Quelques uns n'ont point de queue; les autres en ont: parmi les uns & les autres, les uns ont le muſeau court, & les autres l'ont allongé: parmi ceux qui ont une queue, quelques uns l'ont très courte; les autres l'ont longue. Ils ſe diviſent en 5 *Races*: la premiere eſt de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le muſeau court, qu'on appelle *Singes proprement dits*: la ſeconde eſt de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le muſeau allongé, qu'on appelle *Singes Cynocéphales*: la troiſiéme eſt de ceux qui ont une queue très courte, qu'on appelle *Babouins*: la quatriéme eſt de ceux qui ont une queue longue, & le muſeau court, qu'on appelle *ſimplement Cercopithéques*: la cinquiéme eſt de ceux qui ont une queue longue, & le mu-

ſeau allongé, qu'on appelle *Cercopithéques Cynocéphales.*

dam habent longam, & ſunt roſtro productiore, quæque *Cercopitheci Cynocephali* nominantur.

Table Méthodique des Singes diviſez en cinq Races.

LES Singes ou
- N'ont point de queue ; &
  - Le muſeau court... LE SINGE... *Rac. I.*
  - Le muſeau allongé... LE SINGE CYNOCÉPHALE... *Rac. II.*
- Ont une queue
  - Très courte... LE BABOUIN... *Rac. III.*
  - Longue ; &
    - Le muſeau court... LE CERCOPITHÉQUE... *Rac. IV.*
    - Le muſeau allongé... LE CERCOPITHÉQUE CYNOCÉPHALE... *Rac. V.*

Tabula Synoptica Simiarum in quinque Stirpes diſtinctarum.

SIMIÆ ſunt vel
- Ecaudatæ ;
  - Roſtro brevi... SIMIA... *Stirps I.*
  - Roſtro productiore... SIMIA CYNOCEPHALA... *Stirps II.*
- Caudatæ ;
  - Caudâ breviſſimâ... PAPIO... *Stirps III.*
  - Caudâ longâ ;
    - Roſtro brevi... CERCOPITHECUS... *Stirps IV.*
    - Roſtro productiore... CERCOPITHECUS CYNOCEPHALUS... *Stirps V.*

RACE I.

Ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le muſeau court.

STIRPS I.

Eæ quæ ſunt ecaudatæ, roſtro brevi.

LE SINGE.

SIMIA.

** 1. LE SINGE.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis... SIMIA.

Simia ſimpliciter dicta, caudâ carens. *Raj. Syn. Quadr. p.* 149.
Sloane. Vol. II. p. 328.

Simia. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 957. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 91. *Fig. p.* 92. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 96. *Fig. T.* 59. *ſub iſto nomine*, Simia 1 & 2. (*Fig. ſat bona*).

Les Hébreux appellent le Singe KOPH. *Geſn.*
Les Chaldéens, KOPHIN. *Geſn.*
Les Grecs, Πιθηκος.
Les Arabes, CATAPH. *Geſn.*
Les Eſpagnols, XIMIO. *Geſn.*
Les Italiens, SIMIA. *Geſn.*
Les Allemands, AFF. *Geſn.*
Les Illyriens, OPIEZE. *Geſn.*
Les Flamands, SIME, *ou* SCHEMIKEL. *Geſn.*
Les Anglois, APE. *Geſn. Raj.*

Plurimas vidi Simiarum ſpecies, magnitudine tantummodò à ſe invicem diſcrepantes. Ipſarum facies, auriculæ, & ungues vultum, auriculas & ungues *hominum* imitantur. Univerſum corpus, exceptis clunibus nudis, veſtitur pilis ex virideſcente & flavicante variegatis : pars corporis ſuperior magis virideſcit, inferior verò magis flaveſcit. Habitant in *Africâ*.

J'ai vû pluſieurs eſpeces de Singes, qui ne differoient entre elles que par la grandeur. Leur face, leurs oreilles & leurs ongles ſont aſſez ſemblables au viſage, aux oreilles & aux ongles de l'*homme*. Le poil qui couvre tout leur corps, exceptés les feſſes qui ſont nuës, eſt mêlé de verdâtre & de jaunâtre : le verdâtre domine dans la partie ſupérieure du corps, & le jaunâtre dans la partie inférieure. On les trouve en *Afrique*.

2. L'HOMME DES BOIS.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis, cæſarie faciem cingente.... HOMO SYLVESTRIS.

Simia ecaudata, ſubtùs glabra. Satyrus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp.* 1.
Simia Ourang outang, i. e. Homo ſylveſtris ; vir ſylvarum. *Klein. Quadr. p.* 86.
Satyrus Indicus; *Ourang outang* Indis, & *Homo ſylveſtris* dictus. *Charlet. Exer. p.* 16.
Ourang outang, ſive Homo ſylveſtris. *Bont. Ind. ori. Fig. p.* 84.
Ourang outang Indorum. *Jonſt. Quadr. p.* 97.
Baris. *Euſ. Nieremb.* p. 179.
Les Anglois l'appellent CHIMPANRÉE. *Klein.*

Auctores omnes, qui hujus Simiæ mentionem fece-

Tous les Auteurs, qui ont parlé de cette eſpece de Singe,

n'en ont rien dit autre choſe, ſi ce n'eſt qu'elle eſt parfaitement ſemblable à l'*homme*, & que le mâle & la femelle ont le corps couvert d'un poil court, & aſſez doux. Il paroît, par la figure qu'en a donné *Bontius*, que ſa tête eſt couverte de longs cheveux, qui croiſſent auſſi ſous le menton, & que ſa face eſt nuë. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

runt, nihil aliud de eâ retulerunt, niſi quod ſit *homini* ſimillima, & quod utrique ſexui corpus piloſum ſit, ſed pilo brevi ac ſatis leni. Figura, quam hujus dedit *Bontius*, caput obductum longis crinibus ſub mento etiam creſcentibus, nudamque faciem demonſtrat. Habitat in *Indiâ Orientali*.

3. Le Singe de Ceylan.

Simia unguibus Indicis pedum poſteriorum longis, incurvis, & acutis... Simia Ceylonica.

Simia Ceylonica, ſuperiori labio leporino. *Klein. Quadr. p.* 86.
Cercopithecus Ceylonicus, ſeu *Tardigradus* dictus, major. *Seb. Vol. I. p.* 75. *Fig. T.* 47. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Elegantiſſimum animal, Muſei D. Charleton. *Raj. Syn. Quadr. p.* 161.

Si la figure, que nous a donné *Séba* de cet animal, eſt de grandeur naturelle, il a environ 9 pouces de long, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'anus: ſes bras & ſes jambes ſont longues & menuës: ſa lévre ſupérieure eſt fenduë comme celle d'un *Liévre*: tous ſes ongles ſont plats & arrondis, exceptés ceux de l'index des pieds de derriere, qui ſont longs, recourbés, & aigus. Son poil eſt doux, ſoyeux, & d'un brun noirâtre; mais tout à fait noir ſur le dos: celui qui couvre le ventre, les bras & les pieds, eſt plus court, & d'un cendré jaunâtre. On le

Si hujus animalis figura, quam *Seba* dedit, magnitudinem naturalem adæquet, à capitis vertice ad anum uſque, 9 circiter pollices longum eſt. Brachia habet & crura longa & gracilia; labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis pedum poſteriorum unguibus, qui longi ſunt, incurvi & acuti. Pilus ei mollis eſt, & quaſi ſericeus, ex nigro fuſcus; per dorſum verò planè niger: brevior tamen, & ex cinereo dilutè flavus, qui ventrem, brachia, pedeſque veſ-

tit. Habitat in *Inſulâ Ceylonenſi.*

trouve dans l'*Iſle de Ceylan.*

STIRPS II.

Eæ quæ ſunt ecaudatæ, roſtro productiore.

RACE II.

Ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le muſeau allongé.

SIMIA CYNOCEPHALA.

LE SINGE CYNOCÉPHALE.

** 1. LE SINGE CYNOCÉPHALE.

Simia Cynocephala unguibus omnibus planis & rotundatis... SIMIA CYNOCEPHALA.

Simia ecaudata, clunibus tuberoſis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp. 3.*
Simius Cynocephalus alter. *Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 241. Fig. T. 16.* [*Fig. bona*].
Cynocephalus primus. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 59.* (*Fig. ſat bona*).

In omnibus, excepto roſtro roſtri *canini* inſtar producto, cum *Simiâ* convenit. Plures vidi Simiarum cynocephalarum ſpecies magnitudine tantùm à ſe invicem diſcrepantes. Habitant in *Africâ.*

Il ne differe du *Singe* que par ſon muſeau allongé comme celui d'un *chien* : d'ailleurs il luy reſſemble en tout. J'en ai vû pluſieurs, qui ne differoient entr'eux que par la grandeur. On les trouve en *Afrique.*

** 2. LE SINGE CYNOCÉPHALE DE CEYLAN.

Simia Cynocephala unguibus Indicis longis, incurvis, & acutis... SIMIA CYNOCEPHALA CEYLONICA.

Simia ecaudata, unguibus Indicis ſubulatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp. 2.*
Simia roſtro canino, capite elato. *Klein. Quadr. p. 86.*
Animalculum Cynocephalum, Ceylonicum, *Tardigradum* dictum, Simii ſpecies. *Seb. Vol. I. p. 55. Fig. T. 35. Mas F. 1. Fæm. F. 2.* [*Fig. bonis*].

Minima eſt hæc ſpecies : ſecundùm enim figuram, quam hujus *Seba* dedit, 7

Il eſt très petit. Selon la figure qu'en a donné *Séba*, il n'a guéres plus de 7 pouces, du ſommet

de la tête à l'anus. Ses oreilles ſont rondes, larges, tranſparentes, ſans poils, & d'un cendré clair; ſes jambes longues, menuës & couvertes de peu de poils; tous ſes ongles plats & arrondis, exceptés ceux de l'index de chaque pied, qui ſont longs, recourbés & pointus. Les poils qui couvrent le corps, ſont longs, comme laineux, doux comme de la ſoye, & d'un rouſsâtre plus foncé ſur le dos, & plus clair ſur le ventre dans le mâle; & au contraire plus clair ſur le dos, & plus foncé ſur le ventre dans la femelle. On le trouve dans l'*Iſle de Ceylan*.

pollicum longitudinem, à capitis vertice ad anum uſque, non multùm ſuperat. Auriculas habet rotundas, latas, pellucidas, glabras, & dilutè cinereas; longa & gracilia crura, raris pilis obſita; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis ſingulorum pedum unguibus, qui longi ſunt, incurvi, & acuti. Per univerſum corpus veſtitur pilis longis, quaſi laneis, & ſerici inſtar molliſſimis, ſubrufis, ſaturatioribus in dorſo, in ventre dilutioribus in mare; è contrà verò dilutioribus in dorſo, & in ventre ſaturatioribus in fœminâ. Habitat in *Inſulâ Ceylonenſi*.

RACE III.

Ceux qui ont une queue très courte.

STIRPS III.

Eæ quæ caudam habent breviſſimam.

LE BABOUIN.

PAPIO.

1. Le Babouin.

Papio.

Simia ſemicaudata, ore vibriſſato, unguibus acutis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp. 5.*

Cebus Papio; Baboon; Hyæna Geſneri. *Klein. Quadr. p. 89.*

Papio. *Raj. Syn. Quadr. p. 158.*

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 76.

Jonſt. Quadr. p. 100. Fig. T. 61. ſub iſto nomine, Papio primus.

Papio, ſeu Arctopithecus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 259. Fig. p. 260.*

Babio. *Charlet. Exer. p. 16.*

Babouin. *Kolbe. Tom. III. p. 55. Fig. p. 54. F. 2.*

Les Italiens l'appellent Babuino. *Kolbe.*

Les Allemands, Payyon. *Geſn. Aldro. Charlet.*

Les

Les Suédois, BABIAN. *Linn.*
Les Hollandois, BAVIAAN. *Kolbe.*
Les Anglois, BABOON. *Kolbe.*
Les Hottentots, CHOAKAMNA. *Kolbe.*

Canis Moloſſi magnitudinem circiter æquat. Illius inſtar, roſtrum habet longum, in exitu obtuſum. Cauda ipſius eſt admodùm brevis, eamque ſemper erectam gerit. Nates ſunt omninò glabræ, & colore ſanguineo tinctæ, tanquàm cute detractâ; crura brevia; ungues peracuti, & parumper lunati. Habitat in *Indiæ* ſolitudinibus.

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Dogue*. Il a, comme luy, le muſeau allongé & obtus vers le bout. Sa queue eſt très courte : il la porte toujours élevée. Ses feſſes ſont tout à fait dénuées de poils, & de couleur de ſang, comme ſi on les avoit écorchées. Ses jambes ſont courtes; & ſes ongles très aigus, & un peu recourbés. On le trouve dans les déſerts de l'*Inde*.

STIRPS IV.

Eæ quæ caudam habent longam, & roſtrum breve.

RACE IV.

Ceux qui ont la queue longue, & le muſeau court.

CERCOPITHECUS.

LE CERCOPITHÉQUE.

** 1. LE SAPAJOU BRUN.

Cercopithecus fuſcus, capitis vertice nigro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 13 eſt pollicum; caudæ $14\frac{1}{2}$ pollicum; ambitus corporis, circà pectus, $7\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet fuſcos; auriculas auriculis *humanis* ſimiles. Caudam gerit ſpiraliter intortam, cujus ope firmiter adhæret rei quam apprehendit. Per univerſum corpus, excepto capitis vertice

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 13 pouces; celle de ſa queue de $14\frac{1}{2}$ pouces; le tour de ſon corps, à la poitrine, de $7\frac{1}{2}$ pouces. Ses yeux ſont bruns : ſes oreilles reſſemblent à celles de l'*homme*. Il porte ſa queue roulée en ſpirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout ſon corps eſt couvert

de poils bruns, plus foncés ſur le dos que ſous le ventre : le ſommet de ſa tête eſt noir : ſes jambes & ſa queue tendent à cette derniere couleur. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

nigro, veſtitur pilis fuſcis in dorſo ſaturatioribus, in ventre verò dilutioribus : cauda & crura ad nigredinem tendunt. Ex muſeo *Realmuriano*.

** 2. Le Sapajou noir.

Cercopithecus niger, pedibus fuſcis.

Cercopithecus, *Guariba* apud Braſilienſes dictus. *Jonſt. Quadr. p.* 99. *Fig. T.* 61. *ſub iſto nomine*, Cercopithecus Meer Katz. (*Fig. bona*).
Simia caudata, barbata, cauda prehenſili. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 14.
Cebus Guariba Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 88.
Guariba Braſilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 153.
Guariba Braſilienſibus, Cercopitheci ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 226. [*Fig. bona*].

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Renard*. Il a la face élevée; les yeux noirs, & pleins de feu; les oreilles courtes, & rondes; la queue longue, nuë vers ſon extrémité, & roulée en ſpirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout ſon corps, exceptés la moitié extérieure de ſa queue & ſes pieds, qui ſont bruns, eſt couvert de poils longs, noirs, & brillants, mais ſi bien couchés les uns ſur les autres que l'animal paroît liſſe : ces poils ſont plus longs ſous la gorge & le menton, & luy font une eſpece de barbe ronde. On le trouve au *Bréſil*.

Vulpem noſtratem magnitudine circiter æquat. Faciem habet elatam ; oculos nigros, ſplendentes ; auriculas breves & ſubrotundas ; caudam longam, versùs extremitatem nudam, quâ, ſpiraliter intortâ, firmiter adhæret rei quam apprehendit. Per univerſum corpus, exceptis dimidiâ caudâ exteriore & pedibus, qui fuſci ſunt, veſtitur pilis longis, nigris, ſplendentibus, atque ità ſibi incumbentibus ut animal læve appareat, ſub gutture verò & mento longioribus, inque barbam rotundam deſinentibus. Habitat in *Braſiliâ*.

** 3. Le Sapajou cornu.

Cercopithecus ex nigro & fuſco variegatus, faſciculis duobus pilorum capitis corniculorum æmulis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, 14 pollicum; caudæ 15 pollicum. Oculos habet fuſcos, ſplendentes; auriculas auriculis *humanis* ſimiles; ungues longos & obtuſos. Duo ſunt in capitis vertice pilorum faſcicula, corniculorum æmula. Caudam habet pilis brevibus & ſplendentibus tectam, eamque ſemper gerit ſpiraliter intortam, cujus ope firmiter adhæret rei quam apprehendit. Facies, latera, venter, & crura anteriora pilis fuſcis; capitis verò vertex, medium dorſi, cauda, crura poſteriora, & pedes 4 pilis nigris veſtiuntur. Ex muſeo *Realmuriano*.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 14 pouces; celle de ſa queue de 15 pouces. Ses yeux ſont bruns, & pleins de feu. Ses oreilles reſſemblent à celles de l'*homme*. Il a ſur la tête deux bouquets de poils, qui lui font comme deux eſpeces de petites cornes. Ses ongles ſont longs & obtus: ſa queue eſt couverte de poils courts & brillants: il la porte toujours roulée en ſpirale, & s'attache fortement par ſon moyen à tout ce qu'il peut joindre. Les poils qui couvrent ſa face, ſes côtés, ſon ventre, & ſes jambes de devant, ſont bruns; ceux qui couvrent le deſſus de la tête, le milieu du dos, la queue, les jambes de derriere, & les 4 pieds, ſont noirs. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

** 4. Le Sapajou a queue de Renard.

Cercopithecus pilis nigris, apice albido, veſtitus, cauda pilis longiſſimis nigris obſita.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, *6* eſt pollicum; caudæ 10 pollicum. Ungues habet

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de *6* pouces; & celle de ſa queue de 10 pou-

ces. Il a les ongles longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui ſont plus courts & arrondis. Les poils qui couvrent ſa face, ſont très courts & blanchâtres : ceux de ſa queue ſont très longs & noirs : tout ſon corps eſt couvert de poils longs, noirs & terminés par un bout blanchâtre : ſa gorge & ſon ventre ſont d'un blanc ſale. On le trouve dans la *Guiane*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

longos & obtuſos, unguibus tamen pollicum brevioribus & rotundatis. Pili breviſſimi candicantes faciem obtegunt; longiſſimi verò ſunt & omninò nigri, qui caudam cooperiunt : corpus pilis longis & nigris, in apice tantùm albidis; guttur autem & venter pilis ſordidè albis veſtiuntur. Habitat in *Guianiâ*. Ex muſeo *Realmuriano*.

5. Le Petit Singe négre.

Cercopithecus totus niger.

Cercopithecus Braſilianus ſecundus. *Cluſ. Exot. p.* 372.
Cay Braſilianis Tououpinamboutiis dictus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 155.
C aapud Touvoupinambutios. *Jonſt. Quadr. p.* 100.

Il eſt très petit, & tout noir. On le trouve au *Bréſil*.

Puſillus eſt, nigrique coloris. Habitat in *Braſiliâ*.

6. Le Singe de Guinée.

Cercopithecus pilis ex umbrâ, griſeo, fuſco & flavo variegatis veſtitus.

Cercopithecus Guineenſis tertius Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 157.
Cercopithecus Guineenſis alius. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 228.
Cebus tertius Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 89.

Il a la tête petite, & la queue longue. La couleur de ſon poil eſt mêlée d'ombre, de gris, de brun, & de jaune, & reſſemble preſque à celle du dos de notre *Liévre*. On le trouve en *Guinée* & au *Bréſil*.

Caput huic parvum eſt, & cauda longa. Pilorum color ex umbra, griſeo, fuſco, & flavo variegatus, ferè ut in dorſo *Leporino*. Habitat in *Guineâ* & *Braſiliâ*.

7. Le Singe musqué.

Cercopithecus ex albido flaveſcens, moſchum redolens.

Cercopithecus moſcatus, Braſilienſibus *Caitaja* dictus *Jonſt. Quadr. p.* 100.
Cercopithecus Braſilianus primus. *Cluſ. Exot. p.* 371.
Cebus moſchum redolens, Braſilienſis: Caitaia. *Klein. Quadr. p.* 88.
Caitaja Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 155.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 227.

Caput habet ſubrotundum; frontem haud elatam, & penè nullam; naſum parvum, & compreſſum; caudam arcuatam. Per univerſum corpus veſtitur pilis longis, ex albido flaveſcentibus. Moſchum redolet. Habitat in *Braſiliâ.*

Il a la tête arrondie; le front très petit, & applati; le nez court, & camus; la queue courbée en arc. Tout ſon corps eſt couvert de poils longs, d'un blanc jaunâtre. Il répand une odeur de muſc. On le trouve au *Bréſil.*

** 8. Le Sapajou jaune.

Cercopithecus pilis ex fuſco, flaveſcente, & candicante variegatis veſtitus, pedibus ex flavo rufeſcentibus.

Cercopithecus minor luteus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 151.
Cebus Simiolus Ceylonicus. *Klein. Quadr. p.* 88.
Simiolus Ceylonicus. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig. T.* 48. *F.* 3. (*Fig. optima*).
Les François de la Guiane l'appellent Sapajou jaune. *Barr.*

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, 7 ½ pollicum eſt; caudæ unius pedis. Auriculas habet rotundas, pilis longis, ſordidè albis, veſtitas; ungues longos & obtuſos, exceptis pollicum unguibus, qui breviores ſunt & rotundati. Pilus ei tenuiſſimus eſt & molliſſimus, in parte corporis in-

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 7 ½ pouces; & celle de ſa queue d'un pied. Il a les oreilles rondes, & couvertes de poils aſſez longs, & d'un blanc ſale: tous ſes ongles ſont longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui ſont plus courts & arrondis. Son poil, qui eſt très fin, & très doux au tou-

cher, eſt blanchâtre dans la partie inférieure du corps, & mêlé de brun, de jaunâtre, & de blanchâtre dans la partie ſupérieure : ces couleurs ſont plus foncées ſur le dos qu'ailleurs. Ses 4 pieds ſont d'un jaune rouſsâtre. Sa queue eſt de la même couleur que le deſſus du corps dans toute ſa longueur, excepté ſon bout, qui eſt noir. On le trouve à *Ceylan* & dans la *Guiane*.

feriore candicans, in ſuperiore verò ex fuſco, flaveſcente, & candicante variegatus : qui colores in dorſo ſunt ſaturatiores. Pedes 4 ex flavo ruſeſcunt. Cauda, exceptâ extremitate nigrâ, ejuſdem coloris eſt per totam longitudinem ac corpus ſuperius. Habitat in Inſulâ *Ceylonenſi* & *Guianiâ*.

On a envoyé de *Cayenne* à M. *de Reaumur* un Singe de cette eſpece, ſous le nom de *Singe de nuit*.

A *Cayennâ* ad *Illuſtr. Dom. de Reaumur* hujus ſpeciei Simia miſſa eſt ſub nomine *Simiæ nocturnæ*.

** 9. Le Singe varié.

Cercopithecus pilis ex nigro & rufo variegatis veſtitus, pedibus nigris, caudâ cinereâ.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 11 pouces; & celle de ſa queue eſt d'environ 15 pouces. Il a de chaque côté de la mâchoire inférieure une eſpece de bourſe aſſez grande pour contenir une groſſe noix. Ses oreilles ſont rondes; ſes ongles longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui ſont plus courts & arrondis. Sa face eſt noire : les poils du deſſus de la tête & du col ſont mêlés de noir & de jaune : ceux des jouës & des côtés du col, ſont aſſez longs, blancs à leur origine, en-

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 11 eſt pollicum; caudæ 15 circiter pollicum. In utroque latere maxillæ inferioris folliculum eſt craſſi nucis juglandis continendæ aptatum. Auriculas habet rotundas; ungues longos & obtuſos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Facies ei eſt nigra : pili partem ſuperiorem capitis & colli tegentes ex nigro & flavo variegati ſunt; qui verò genas & colli latera veſtiunt, ſat longi ſunt, in exortu albi, & dein-

de ex nigro & flavo variegati : qui dorſum cooperiunt ex nigro & rufo variegantur. Propè caudæ exortum, utrinque parva macula eſt alba. Crurum anteriorum pars exterior, & pedes 4 nigreſcunt: crura poſteriora ex fuſco nigricant, paululùm flavo & rufo mixtis : corporis pars inferior, & crurum interior albicant : cauda cineraſcit. Ex muſeo *Realmuriano*.

ſuite mêlés de noir & de jaune : ceux du dos ſont mêlés de noir & de roux. De chaque côté, auprès de l'origine de la queue, eſt une petite tache blanche. L'extérieur des jambes de devant, & les 4 pieds ſont noirs : les jambes de derriere ſont d'un brun noirâtre, mêlé de très peu de jaune & de roux : le deſſous du corps & l'intérieur des jambes eſt blanc ; & la queue griſe. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

10. Le Tamarind.

Cercopithecus pilis cineraſcentibus, nigro mixtis, veſtitus ; caudâ rufâ.

Cercopithecus minimus niger leontocephalus ; auribus elephantinis. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 151.
Cagui major Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 154.
Jonſt. Quadr. p. 99. *Fig. T.* 60.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 227.
Les Congois l'appellent Pongi. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Les Guianois, Tamarind. *Barr.*

Faciem habet ſubrotundam ; os nigrum ; oculos nigros ; auriculas ferè rotundas, nigras, & pilis nudas ; caudam 15 circiter pollices longam, pilis rufis obſitam. Totum corpus veſtitur pilis cineraſcentibus, cum pauco nigro admixto : frons verò pilis nigris, cum cinereo mixtis. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

Il a la face arrondie ; le muſeau, & les yeux noirs ; les oreilles preſque rondes, noires & ſans poils ; la queue longue d'environ 15 pouces, & couverte de poils roux : ceux qui couvrent le corps, ſont aſſez longs, gris, & mêlés d'un peu de noir : ceux du front au contraire ſont noirs, mêlés de gris. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

** 11. LE PETIT SINGE-LION.

Cercopithecus ex albo flavicans, faciei circumferentia ſaturatè rufa.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 7 pouces; & celle de ſa queue de 12 ½ pouces. Il a la tête ronde, couverte de longs poils, & aſſez ſemblable à celle d'un *Lion*; la face nuë, & brune; les yeux roux; les oreilles rondes, nuës, & cachées ſous les poils de la tête; tous les ongles longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui ſont larges, plats & arrondis. Tout ſon corps eſt couvert de poils longs, doux comme de la ſoye, d'un blanc jaunâtre, & luiſants: ceux qui entourent ſa face, ſont d'un roux foncé, ceux de la poitrine d'un roux jaunâtre, & ceux de la queue d'un blanc jaunâtre. Les jambes de devant & les 4 pieds ſont roux, avec un peu de noirâtre mêlé aux pieds de devant. On le trouve au *Bréſil*, d'où il a été apporté en 1754 à *Madame la Marquiſe de Pompadour*, qui l'a actuellement vivant chez elle.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudæ exortum uſque, 7 pollices æquat; caudæ 12 ½ pollices. Caput habet rotundum, longis pilis obſitum, capitis *Leonini* æmulum; faciem glabram & fuſcam; oculos rufos; auriculas rotundas, nudas, ſubque capitis pilis occultatas; ungues omnes longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum poſteriorum pedum latis, planis & rotundatis. Per univerſum corpus veſtitur pilis longis, ſericei inſtar molliſſimis, ex albo flavicantibus, & ſplendentibus: qui faciem cingunt ſunt ſaturatè rufi; qui pectus obtegunt, ex rufo flavicantes; qui verò caudam veſtiunt, ex albo flavicantes. Crura anteriora, pedeſque 4 ſunt rufi, cum pauxillo nigricante in pedibus anticis mixto. Habitat in *Braſiliâ*, unde anno 1754 ad *Dom. de Pompadour* vivus advectus eſt.

** 12. LE

** 12. Le Petit Singe de Para,

Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculiſque rubris ſplendentibus, caudâ caſtanei coloris.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, 7 eſt pollicum; caudæ 12 ½ pollicum. Ungues habet longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum poſteriorum pedum latis, planis, & rotundatis. Pilis longis, ſerici inſtar molliſſimis, ex cinereo albis, argenteis, in toto corpore veſtitur: cauda verò tegitur pilis coloris caſtanei ſplendentis, ad nigredinem accedentis. Facies & auriculæ tinctæ ſunt rubore ità ſplendente, ut naturalis non videatur. Habitat in *Braſiliâ*. Ex muſeo *Realmuriano*.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 7 pouces; celle de ſa queue de 12 ½ pouces. Ses ongles ſont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui ſont larges, plats & arrondis. Tout ſon corps eſt couvert de poils longs, doux comme de la ſoye, d'un gris blanc argenté: ceux qui couvrent ſa queue, ſont d'un marron luſtré, approchant du noir. Toute ſa face & ſes oreilles ſont teintes d'un rouge ſi vif & ſi éclatant, qu'on a peine à croire qu'il ſoit naturel. On le trouve dans le *Bréſil*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

13. Le Singe a queue de Rat.

Cercopithecus in dorſo ſpadiceus, in ventre glaber; caudâ murinâ.

Cercopithecus Americanus minor, *Monkje* dictus. *Seb. Vol. I. p.* 52. *Fig. T.* 33. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Cebus Caput mortuum vulgò. *Klein. Quadr. p.* 88.

Minima eſt hæc ſpecies. Naſum habet ſimum; oculos profundè intrà orbitas ſitos; caput antrorsùm rotundum, atro ſpadiceis pilis, ad

Cette eſpece eſt très petite. Elle a le nez très court; les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites; la tête ronde en devant, & couverte, juſqu'à

la racine du nez, de poils d'un noir qui tire ſur le rouge, un peu plus allongée en arriere, & couverte de poils noirâtres. Sa face eſt blanchâtre ; le bout de ſon nez, & le tour de ſa bouche ſont noirs : beaucoup de rides contribuent à l'enlaidir. Ses oreilles ſont dénuées de poils, aſſez grandes, & ſemblables à celles de l'*homme* : ſes ongles ſont courts & applatis : ſa queue eſt longue, aſſez groſſe, & reſſemble à celle d'un *Rat*. Les poils qui couvrent le dos, ſont d'un rouge moins foncé que celui de la tête. Depuis le menton juſqu'au ventre, & à la partie intérieure des cuiſſes, la peau eſt entierement chauve : la partie extérieure des cuiſſes, les pieds, & les reins ſont couverts de très peu de poils, d'un jaune clair. On le trouve en *Amérique*.

naſi uſque radicem, hiſpidum, retrorsùm verò magis elongatum, pilis nigricantibus obſitum. Facies albicat, exceptis naſi extremitate & oris ambitu, ubi nigreſcit : rugæ plurimæ illam deformem faciunt. Auriculæ ſunt glabræ, majuſculæ, auriculis *humanis* ſimiles ; ungues breves & plani ; cauda longa, craſſiuſcula, caudæ *Murinæ* æmula. Pili dorſum tegentes dilutiùs ſunt ſpadicei, quam qui caput veſtiunt. A mento, per ventrem uſquè, perque internam femorum faciem, calva prorsùs eſt & nuda cutis : lumbos verò, externam femorum partem, & pedes rari obſident pili dilutè flaveſcentes. Habitat in *Americâ*.

** 14. Le Sagouin.

Cercopithecus tæniis tranſverſis alternatim fuſcis & è cinereo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdatis.

Cercopithecus Sagouin Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 160.
Jonſt. Quadr. p. 100. *Fig. T.* 74. [*Fig. bona*].
Euſ. Nieremb. p. 179. *Fig. p.* 177. (*Fig. bona*).
Cercopithecus Braſilianus tertius. Sagouin. *Cluſ. Exot. Fig. p.* 372. (*Fig. bona*).
Simia caudata imberbis, unguibus pollicum ſubrotundis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 8.
Cebus *Sagouin* dictus. *Klein. Quadr. p.* 87. *Fig. T.* 3. (*Fig. bona*).
Galeopithecus, Sagoin à Braſilienſibus nominatus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 96. (*Fig. mala*).
Sagouin. *Euſ. Nieremb. p.* 179. *Fig. p.* 177. (*Fig. mala*).
Jo. de Laet. p. 553.

Cagui minor. *Raj. Syn. Quadr. p.* 154.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 227. [*Fig. ſat bona*].
Caitaia. *Jonſt. Quadr. Fig. p.* 60. (*Fig. ut ſuprà*).

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 7 ½ pollicum; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet ſubrotundas, longis pilis albis circumdatas; ungues omnes longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum poſteriorum pedum brevioribus & rotundatis. Pili totum corpus tegentes, tenuiſſimi ſunt & molliſſimi: qui partem corporis ſuperiorem cooperiunt, ſunt in exortu fuſci, deinde rufi, & tandem ex fuſco & è cinereo albo variegati, itàque diſpoſiti, ut dorſum tæniis tranſverſis alternatim fuſcis & è cinereo albis variegatum appareat: qui verò partem corporis inferiorem obtegunt, ſunt tantùm ex fuſco & cinereo albo variegati: guttur & caput pilis fuſcis veſtiuntur. Suprà naſum, inter oculos, macula ineſt alba. Cauda annulis alternatim ex fuſco nigricantibus & è cinereo albis cingitur. Habitat in *Braſiliâ.*

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 7 ½ pouces; celle de ſa queue de 11 pouces. Ses oreilles ſont rondes, & entourées de longs poils blancs: tous ſes ongles ſont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui ſont courts & arrondis. Tous ſes poils ſont très fins, & très doux au toucher: ceux du deſſus du corps ſont bruns à leur origine, enſuite roux, & enfin variés de brun & de gris blanc, de ſorte que le dos paroît rayé tranſverſalement de ces deux dernieres couleurs: ceux du deſſous du corps, & des jambes ſont de même variés de brun & de gris blanc: la tête & la gorge ſont brunes. Audeſſus du nez, entre les deux yeux, eſt une tache blanche. La queue eſt annelée de brun noirâtre & de gris blanc. On le trouve au *Bréſil.*

15. Le Singe a queue de Lion.

Cercopithecus ex flavo fuſcus, caudâ in floccum deſinente.

Cercopithecus non barbatus primus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 160.
Cluſ. Exot. p. 371.

Simia caudata imberbis fuſco flava, pectore gulâque albis, caudâ floccoſâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp. 9.*
Cebus imberbis primus Cluſii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Tout ſon corps eſt couvert de poils d'une longueur médiocre, d'un jaune brun partout le corps, excepté à la gorge, & à la poitrine, où ils ſont blancs. Sa queue eſt preſque nuë dans toute ſa longueur, excepté ſon extrêmité, qui ſe termine par un bouquet de longs poils.

Per univerſum corpus veſtitur pilis mediocris longitudinis, ex flavo fuſcis in toto corpore, exceptis gutture & pectore, in quibus albicant. Cauda non eſt valdé hirſuta, ſed levis quodammodo; extremitas autem ejus in longiorum pilorum floccum deſinit.

16. Le Singe-Lion.

Cercopithecus collo pectoreque jubatis.

Cercopithecus non barbatus ſecundus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 160. *Cluſ. Exot. p.* 371.
Simia caudata imberbis, collo pectoreque jubatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp.* 11.
Cebus imberbis ſecundus Cluſii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Cette eſpece eſt aiſée à diſtinguer des autres par les poils longs, & blanchâtres, qui couvrent ſon col & ſa poitrine, & qui luy font une criniere ſemblable à celle du *Lion*: c'eſt pourquoi je luy en ai donné le nom. Son muſeau eſt tout à fait brun; & ſa tête eſt couverte de poils blanchâtres.

Facilè ab aliis diſtinguitur hæc ſpecies longis pilis caneſcentibus, collum & pectus tegentibus, jubæ *Leoninæ* inſtar: undè nomen. Roſtrum habet prorsùs fuſcum; caputque caneſcentibus pilis tectum.

** 17. Le Singe verd.

Cercopithecus ex cinereo flaveſcens, genis longis pilis albis obſitis.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſ-

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſ-

que, 15 eſt pollicum; caudæ 14 pollicum. Auriculas habet parvas & rotundas; ungues breves & rotundatos; genas longis pilis albis obſitas. Pars ſuperior capitis & dorſi pilis ex cinereo & flaveſcente variegatis; cauda, latera, & crurum pars exterior pilis cinereis; interior verò crurum, ſicut & tota corporis pars infima, pilis albis veſtiuntur. Ex muſeo *Realmuriano*.

qu'à la queue, eſt de 15 pouces; & celle de ſa queue de 14 pouces. Il a les oreilles petites & rondes; les ongles courts & arrondis; ſes joües ſont couvertes de longs poils blancs: ceux qui couvrent le deſſus de la tête & du dos, ſont mêlez de gris & de jaunâtre: la queue, les côtés, & l'extérieur des jambes ſont gris; & l'intérieur eſt blanc, ainſi que toute la partie inférieure du corps. Il eſt dans le Cabinet de M. *de Reaumur*.

** 18. LE GRAND SINGE DE LA COCHINCHINE.

Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flavicantibus obſitis, torque ex caſtaneo purpuraſcente.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 2 circiter pedum eſt; caudæ unius pedis cum 9 pollicibus. Auriculas habet auriculis *humanis* ſimiles; ungues longos & obtuſos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Torque donatur ex caſtaneo purpuraſcente: facies, poſtica crura, & pedes poſteriores ejuſdem ſunt coloris. Genæ longis pilis ex albo flavicantibus, barbæque æmulis, obſitæ ſunt. Capitis pars ſuperior, corpus, & femora anteriora ſunt cinerea: frons, ſcapularum ſuperior pars, femora poſteriora, & pedes antici nigri; cauda &

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 2 pieds; celle de ſa queue eſt d'un pied 9 pouces. Ses oreilles reſſemblent à celles de l'*homme*: ſes ongles ſont longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui ſont courts & arrondis. Il a un collier d'une couleur de marron pourpré: ſa face, ſes jambes, & ſes pieds de derriere ſont de la même couleur. Ses joües ſont garnies de longs poils d'un blanc jaunâtre, qui luy font comme une eſpece de barbe. Le deſſus de la tête, le corps, & les cuiſſes de devant ſont griſes: le front, le deſſus des épaules, les cuiſſes de derriere, & les

pieds de devant ſont noirs : la queue & les jambes de devant ſont blanches : à la partie poſtérieure du dos, au deſſus de l'origine de la queue, eſt une tache de la même couleur. On le trouve à la *Cochinchine*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur.*

crura anteriora alba : inſuper ad poſticam dorſi partem, ſuprà caudæ exortum, macula eſt ejuſdem coloris. Habitat in *Cochinchinâ.* Ex muſeo *Realmuriano.*

19. Le Singe de Guinée a barbe jaunastre.

Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex albo flavicantibus obſitis, ore cœruleſcente.

Cercopithecus barbatus alius Guineenſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 156.
Jonſt. Quadr. p. 99.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 228.
Simia caudata, genubus auribuſque barbatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 2. *ſp.* 12.
Cebus barbatus alius Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 89.

La couleur de ſes poils, dans la plus grande partie de ſon corps, eſt noirâtre, mêlée d'une couleur d'ombre : ſon ventre eſt d'un gris bleuâtre : ſa queue, depuis la moitié de ſa longueur juſqu'à ſon extrêmité, eſt d'un roux jaunâtre ; ſon muſeau bleuâtre. Ses joües & ſes oreilles ſont couvertes d'une grande quantité de longs poils, d'un blanc jaunâtre, qui luy font une eſpece de barbe. Ses jambes & ſes pieds ſont noirs. On le trouve en *Guinée* & au *Bréſil.*

Pilorum color, in maximâ parte corporis, eſt nigricans, cui umbra admixta ; in ventre autem è cinereo ſubcœruleſcens : cauda, à medietate ad extremitatem uſquè, ex rufo flavicans : os cœruleſcit. In genâ utrâque, uti & ad utramque auriculam, magnam copiam habet pilorum longiorum ex albo flavicantium, magnæ barbæ inſtar. Pedes & crura nigreſcunt. Habitat in *Guineâ* & *Braſiliâ.*

20. Le Singe rouge de Cayenne.

Cercopithecus barbatus ſaturatè ſpadiceus.

Cercopithecus barbatus maximus, ferrugineus, ſtertoroſus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 150.

Les François de la Guiane l'appellent SINGE ROUGE. *Barr.*
Les Guianois, ALAOÜATA. *Barr.*

Maximus eſt, & coloris ſaturatè ſpadicei. Hyoïdis ſtructuræ ſingularis ope clamorem maximum edit. Habitat in *Guianiâ*.

Il eſt fort gros. Sa couleur eſt d'un rouge-bay foncé. Il fait en criant un bruit effroyable par le moyen de l'os hyoïde, qui eſt d'une ſtructure ſinguliere. On le trouve dans la *Guiane*.

21. LE SINGE BLANC A BARBE NOIRE.

Cercopithecus barbatus albus, barbâ nigrâ.

Simia alba, ſeu incanis pilis, barba nigra promiſſa. *Raj. Syn. Quadr. p.* 158.
Cebus Elaurandus Zeylanenſium. *Klein. Quadr. p.* 89.
Les Zeyloniens l'appellent ELEWANDUM. *Raj.*

Pilis veſtitur albis, barbaque nigra promiſſa gaudet. Habitat in *Inſulâ Zeylonenſi*.

Il eſt tout blanc, excepté ſa barbe, qui eſt noire & longue. On le trouve dans l'*Iſle de Zeyla*.

22. LE SINGE NOIR A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus niger, barbâ incanâ.

Cercopithecus niger barbâ incanâ promiſsâ. *Raj. Syn. Quadr. p.* 158.
Klein. Quadr. p. 89.
Les Zeyloniens l'appellent WANDURU. *Raj. Klein.*

Pilis veſtitur nigris, barbâque incanâ promiſſâ datur. Habitat in *Inſulâ Zeylonenſi*.

Il eſt tout noir, excepté ſa barbe, qui eſt blanche & longue. On le trouve dans l'*Iſle de Zeyla*.

23. LE SINGE DE GUINÉE A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus fuſcus, punctis albis inſperſis, barbâ albâ.

Cercopithecus barbatus Guineenſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 156.
Jonſt. Quadr. p. 99. *Fig. T.* 60.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 227. *Fig. p.* 228.

Cebus barbatus. Exquima Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 89.
Les Congois l'appellent Exquima. *Raj. Jonſt. Marcgr.*

Ses poils ſont bruns, picqués de petits points blancs : ceux du dos cependant ſont d'une couleur plus obſcure, ou comme d'une couleur de fer. La partie inférieure de ſon menton & ſon ventre ſont blancs : il a auſſi une barbe d'un beau blanc, compoſée de poils de 2 ou 3 doigts de long. On le trouve en *Guinée* & au *Bréſil*.

Pilos habet fuſcos; ſed per totum dorſum quaſi aduſtos ſeu ferrugineos : fuſcis autem pilis punctulatim inſperſus eſt color albus. Venter albicat, & mentum inferius : barbam quoque egregiè albam habet, pilis 2 aut 3 digitos longis conflatam. Habitat in *Guineâ*, & *Braſiliâ*.

24. Le Singe barbu

Cercopithecus barbatus, ex nigro & fuſco mixtus, pectore & anteriore ventris parte albis, barbâ incanâ mucronatâ.

Cercopithecus barbatus ſecundus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 159. *Cluſ. Exot. p.* 371.
Simia caudata barbata, barbâ canâ, caudâ ſimplici. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 16.
Cebus barbatus ſecundus Cluſii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Tout ſon corps, exceptés ſa poitrine & la partie antérieure de ſon ventre, dont les poils ſont blancs, eſt couvert de poils noirs, mêlés de brun, courts, très liſſes, & très brillants. Il a au menton une barbe blanche, longue d'environ 6 pouces, & qui ſe termine en pointe. Sa queue eſt ſemblable à celle des *Cercopithéques* ordinaires.

Per univerſum corpus, exceptis pectore & ventris parte anteriore albis, veſtitur pilis nigris, fuſco admixto, brevibus, valdè terſis, & nitidis. E mento propendet barba incana, 6 circiter pollices longa, & in mucronem deſinens. Cauda ei ſimilis eſt formæ cum *Cercopithecorum* vulgarium caudis.

25. Le Singe barbu a queue de Lion.

Cercopithecus barbatus, ſuprà ex nigro & fuſco mixtus, infrà albus, barbâ incanâ mucronatâ, caudâ in floccum deſinente.

Cercopithecus barbatus primus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 159. *Cluſ. Exot. Fig. p.* 371. (*Fig. bona*).
Cercopithecus barbatus Cluſii. *Jonſt. Quadr. p.* 99. *Fig. T.* 74. (*Fig. bona*). *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 177. (*Fig. bona*).
Simia caudata barbata, cauda flocсoſa. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 15.
Cebus barbatus primus Cluſii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Magnitudine *Cercopithecos* vulgares majores æquat. Auriculas habet non magnas; nares ſimas; ungues unguibus *humanis* ferè ſimiles; caudam valdé longam, ſatiſque craſſam, cujus extremitas in longiorum pilorum floccum deſinit, *Leoninæ* caudæ inſtar. Superior corporis pars tota nigris pilis tecta eſt, fuſco admixto; inferior verò longioribus pilis albis obſita. E mento propendet barba incana, 9 pollices longa, in mucronem deſinens.

Il eſt de la grandeur des grands *Cercopithéques* ordinaires. Il a les oreilles petites; le nez camus; les ongles preſque ſemblables à ceux de l'*homme*; la queue très longue, aſſez groſſe, & terminée par un bouquet de longs poils, comme celle d'un *Lion*. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt couverte de poils noirs, mêlés de bruns; & la partie inférieure de longs poils blancs. Il a au menton une barbe blanche, longue de 9 pouces, & qui ſe termine en pointe.

26. Le Singe noir d'Egypte.

Cercopithecus barbatus, niger, cæſarie prolixâ nigrâ faciem cingente.

Simia caudata, cæſarie prolixâ faciem cingente. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 13.
Simia callitrix magnitudine magnorum Cynocephalorum. *Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p.* 244. *Fig. T.* 21. (*Fig. bona*).

Magnos *Cynocephalos* magnitudine æmulatur. Per uni-

Il eſt de la grandeur des grands *Cynocéphales*. Il eſt noir par tout

le corps, & ſurtout à ſa face, qui eſt toute entourée de longs poils noirs. On le trouve en *Egypte*.

verſum corpus eſt niger, præſertim in facie, quæ undequaque cæſarie prolixâ nigrorum pilorum circumdatur. Habitat in *Ægyptô*.

27. Le Singe roux d'Egypte.

Cercopithecus barbatus, rufus, facie nigrâ, cæſarie albâ cinctâ.

Simius callitrix. *Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p.* 244. *Fig. T.* 20. *F.* 4.

Il eſt de la grandeur d'un grand *Chat*. Il a la tête petite & ronde; la face ſemblable au viſage de l'*homme*; le corps très éffilé vers les flancs; la queue longue & rouſſe. Tout ſon corps eſt couvert de poils roux: ſa face eſt noire & entourée de tous côtés d'une chevelure blanche; ce qui luy donne l'air d'un vieillard. On le trouve en *Egypte*.

Felem magnam quadamtenùs magnitudine æmulatur. Caput habet parvum & rotundum; faciem vultui *humano* ſimilem; corpus circà ilia gracillimum; caudam longam & rutilam. Per univerſum corpus veſtitur pilis rufis: facies ei eſt nigra, undique cæſarie albâ cincta; undè faciem ſenilem habere videtur. Habitat in *Ægyptô*.

** 28. Le petit Singe du Mexique.

Cercopithecus pilis ex fuſco & rufo veſtitus, facie ultrà auriculas uſque nigrâ & nudâ, vertice longis pilis albis obſito.

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 7 pouces; & celle de ſa queue d'environ 1 pied. Ses oreilles reſſemblent à celles de l'*homme*: ſes ongles ſont longs, crochus & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui ſont

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 7 circiter eſt pollicum; caudæ 1 circiter pedis. Auriculas habet auriculis *humanis* ſimiles; ungues longos, incurvos & acutos, exceptis pollicum pedum poſteriorum unguibus latis, planis & ro-

tundatis. Facies ei eſt nigra & nuda ultrà auriculas uſque: vertex capitis longis pilis albis obſitum eſt. Corporis pars ſuperior veſtitur pilis ex fuſco & rufo variegatis, ferè ut in dorſo *Leporino*; corporis verò inferior pars & pedes 4 pilis candicantibus teguntur. Cauda, ab exortu ad medietatem uſque, pilis rufis, à medietate ad apicem, pilis nigris veſtitur. Habitat in *Mexicô*, undè à *R. P. Bernard Franciſcano* vivus advectus eſt.

larges, plats & arrondis. Sa face eſt noire, & dénuée de poils juſqu'audelà des oreilles : & le ſommet de ſa tête eſt couvert de longs poils blancs. Tout le deſſus de ſon corps eſt couvert de poils variés de brun & de roux, à peu-près comme le dos de nos *Liévres ordinaires* : ceux qui couvrent le deſſous du corps & les 4 pieds ſont blanchâtres. Sa queue, depuis ſon origine juſqu'à la moitié de ſa longueur, eſt rouſſe : le reſte eſt noir. On le trouve au *Méxique*, d'où le *R. P. Bernard Cordelier* l'a apporté vivant.

** 29. Le Belzébut.

Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, caudâ inferiùs versùs apicem pilis deſtitutâ... Belzebut.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudæ exortum, 15 pollices æquat; caudæ 2 pedes; crurum anteriorum, ab eorum exortu ad unguium apicem, unum pedem & 6 pollices : crura poſteriora paris ſunt longitudinis. Ambitus corporis, circà pectus menſuratus, quâ parte craſſius eſt, 1 pedem & 6 lineas attingit. Auriculas habet auriculis *humanis* ſimiles, & nigras. Facies, caput, pars dorſi anterior, partes exteriores femorum anteriorum, femorum & crurum poſterio-

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 15 pouces; celle de ſa queue de 2 pieds; celle de ſes jambes de devant, depuis leur origine juſqu'au bout des ongles, de 1 pied 6 pouces; & celle de ſes jambes de derriere auſſi de 1 pied 6 pouces. Le tour de ſon corps, meſuré à la poitrine, où il eſt le plus gros, eſt de 1 pied 6 lignes. Ses oreilles reſſemblent à celles de l'*homme*, & ſont noires. Sa face, ſa tête, la partie antérieure du dos, les parties extérieures des cuiſſes de de-

vant, & des cuiſſes & des jambes de derriere, ſes jambes de devant, ſes quatre pieds, & ſa queue ſont noirs : la partie poſtérieure du dos eſt d'un brun noir : ſes côtés ſont roux : toute la partie inférieure du corps, ſçavoir la gorge, la poitrine, le ventre, les parties intérieures des cuiſſes de devant, & des cuiſſes & des jambes de derriere ſont d'un blanc ſale & jaunâtre. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : c'eſt le pouce qui manque à ceux de devant. Sa queue ſe termine en pointe, & eſt couverte de poils dans toute ſa longueur, excepté ſa partie inférieure, depuis ſon bout juſqu'au tiers de ſa longueur, qui eſt couverte d'une peau ſillonée, pareille à celle de la plante des pieds : auſſi cette queue luy ſert comme d'une cinquiéme jambe : elle fait l'office de main, & luy ſert pour porter la nourriture à ſa bouche. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

Je lui ai laiſſé le nom de *Belzébut*, qui eſt celui ſous lequel il a paru à Paris aux yeux du Public.

rum, crura anteriora, cauda, & pedes quatuor nigri ſunt : pars dorſi poſterior eſt ex fuſco nigra : latera rufeſcunt : corporis inferior pars tota, guttur ſcilicet, pectus, venter, partes interiores femorum anteriorum, femorum & crurum poſteriorum ex ſordidè albo flavicant. 4 habet in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus verò 5; pollice autem in pedibus anterioribus deſtituitur. Cauda in acumen deſinit, piliſque veſtitur per totam longitudinem, exceptâ parte inferiore ab apice ad tertiam longitudinis partem, quæ cute ſulcatâ, cutis plantæ pedum æmulâ, tegitur; quamobrem cauda ſua, ſicut quinto pede utitur : manuum enim officium præſtat, & hujus ope cibum ori admovet. Ex muſeo *Realmuriano*.

Illum *Belzebut* nomine donavi, ſub quo Pariſiis in Publicum editus eſt.

STIRPS V.

Eæ quæ caudam habent longam, & roſtrum productius.

RACE V.

Ceux qui ont la queue longue, & le muſeau allongé.

CERCOPITHECUS. CYNOCEPHALUS.

LE CERCOPITHÉQUE. CYNOCÉPHALE.

** 1. LE CERCOPITHÉQUE CYNOCÉPHALE.

Cercopithecus Cynocephalus ex virideſcentibus & flavicantibus pilis variegatus.

Cercopithecus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 59. (*Fig. bonâ*).

In omnibus, exceptis caudâ, quâ donatur, & roſtro, roſtri *Canini* inſtar, producto, cum *Simiâ* convenit. Plurimas vidi Cercopithecorum Cynocephalorum ſpecies magnitudine tantùm à ſe invicem diſcrepantes. Habitant in *Africâ*.

Il ne differe du *Singe* que parce qu'il a une queue, & par ſon muſeau allongé comme celui d'un *Chien* : d'ailleurs il luy reſſemble en tout. J'en ai vû pluſieurs, qui ne differoient entr'eux que par la grandeur. On les trouve en *Afrique*.

2. LE MAKAQUE.

Cercopithecus Cynocephalus naribus bifidis, elatis, natibus calvis.

Cercopithecus Angolenſis major, Congenſibus Macaquo, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 155.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 227.
Cercopithecus Angolenſis major, Marcgravii. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 149.
Simia caudata imberbis, naribus elatis, bifidis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 10.
Cebus Angolenſis major, Macaquo Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 89.
Macaquo Congenſium. *Jonſt. Quadr. p.* 100.
Les François de la Guiane l'appellent MAKAQUE. *Barr.*

Corporis longitudo, à capite ad caudam uſque, unius pedis eſt & ampliùs; capitis

La longueur de ſon corps, depuis la tête juſqu'à la queue, eſt de plus d'un pied; celle de

ſa tête de 6 doigts ; celle de ſa queue d'un pied. Ses 4 jambes ſont d'une longueur égale, ſçavoir de 10 doigts chacune. Ses pieds de devant ſont longs de 3 ½ doigts, & ceux de derriere de 5 doigts. Le tour de ſon corps, dans l'endroit où il eſt le plus gros, eſt d'un pied 9 pouces. Il a les narines fenduës en deux, & élevées ; les feſſes chauves. Il porte toujours ſa queue courbée en arc. La couleur des poils de tout ſon corps eſt la même que celle d'un *Loup*. On le trouve dans le Royaume d'*Angola*, & dans la *Guiane*.

6 digitorum ; caudæ unius pedis. Crura 4 æqualis ſunt longitudinis, 10 digitorum ſingula. Pedes anteriores 3 ½ digitos, poſteriores verò 5 longi ſunt. Ambitus corporis maximus unum pedem & 9 digitos æquat. Nares habet bifidas & elatas ; nates calvas. Caudam ſemper geſtat arcuatam. Color pilorum totius corporis colori *Lupi* ſimillimus. Habitat in Regno *Angolenſi*, & *Guianiâ*.

** 3. LE MAGOT, OU TARTARIN.

Cercopithecus Cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obſitâ, naſo violaceo nudo.

Cynocephalus. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 92. *Fig. p.* 93. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 100. *Fig. T.* 59. *ſub iſto nomine*, Cynocephalus ſecundus. (*Fig. bona*).
Cluſ. Exot. *Fig. p.* 370. (*Fig. bona*).
Maimon quorumdam. *Geſn.*

Il eſt environ de la grandeur d'un *Dogue*. Il a à peu-près la forme des *Cercopithéques* ordinaires ; mais il a le corps plus épais & plus fort. Tous ſes poils ſont d'un gris blanchâtre : ceux qui couvrent la partie antérieure du corps, ſont très longs ; les autres ſont courts. Son nez eſt fort gros, dénué de poils, cannelé ſelon ſa longueur, & d'une

Canem Moloſſum magnitudine circiter æquat. Ejuſdem ferè formæ eſt cujus *Cercopithecus* vulgaris ; at in corporaturâ craſſior & validior. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex cinereo albidis, in parte corporis anteriore longiſſimis, in reliquo corpore brevioribus. Naſum habet craſſiſſimum, pilis nudum,

longitudinaliter ſtriatum, & violacei coloris. Habitat in *Aſiâ* & *Africâ*.

couleur violette. On le trouve en *Aſie* & en *Afrique*.

SECTIO II.

Ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur.

UNico Genere, ſcilicet *Pteropi*, conſtituitur hæc Sectio.

XXX.

Genus Pteropi. (Fig. 4.)

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ quatuor (Fig. a, a, a, a.):

Digiti unguiculati,

In anterioribus pedibus membranâ, in alas expansâ, inter ſe connexi, in poſterioribus à ſe invicem ſeparati.

Obſ. 1°. Primo inſpectu, *Pteropus veſpertilionis* Generis eſſe videtur; ſicut ille, pedes habet anteriores in alas expanſos: ab eo tamen differt dentium inciſorum (*Fig.* 4. *a*, *a*.) numero & figura, & roſtro multò productiore quàm *veſpertilionis* roſtrum.

Obſ. 2°. Omnes hujus Generis ſpecies anterioribus cruribus donantur longiſſimis, quorum pedes dividuntur in 5 digitos longos,

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étendue en aîles.

CEtte Section ne contient qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de *la Rouſſette*.

XXX.

Le Genre de la Rouſſette. (Fig. 4.)

Son caractere eſt

D'avoir quatre dents inciſives à chaque mâchoire (Fig. 4. a, a, a, a.):

Les doigts onguiculés,

Joints enſemble par une membrane étendue en aîles dans les pieds de devant, & ſeparés les uns des autres dans ceux de derriere.

Obſ. 1°. Au premier coup d'œil, la *Rouſſette* ſemble être du Genre de la *Chauve-Souris*: comme elle, elle a les pieds de devant étendus en aîles: mais elle en differe par le nombre & la figure de ſes dents inciſives (*Fig.* 4. *a*, *a*.), & par la forme de ſon muſeau, qui eſt beaucoup plus allongé que celui de la *Chauve-Souris*.

Obſ. 2°. Toutes les eſpeces de ce Genre ont les jambes de devant très longues, dont le pied eſt diviſé en 5 doigts longs, & tous (excepté le

pouce qui eſt ſéparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints enſemble par une membrane, qui n'eſt autre choſe qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col juſqu'à l'anus, tout le long des jambes, & juſqu'au bout des doigts des pieds de devant: c'eſt par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les pieds de derriere ſont diviſez en 5 doigts armez d'ongles crochus & très pointus.

omnes (excepto pollice ab aliis ſeparato, incurvoque & valido ungue munito) membranâ inter ſe connexos; quæ membrana nihil aliud eſt quam dorſi cutis continuata, in utroque latere, á collo ad anum uſque, & ſecundùm crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extensâ, cujus ope volitant. Pedes poſtici in 5 digitos incurvis & acutiſſimis unguibus munitos ſunt diviſi.

** 1. La Rousette.

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiuſculis.

Veſpertilio caudâ nullâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 14. *ſp.* 1.
Veſpertilio Cynocephalus Ternatanus. *Klein. Quadr. p.* 61.
Veſpertilio Borſippæ. *Geſn. avi. p.* 772.
Veſpertilio ingens. *Cluſ. Exot. p.* 94.
Canis volans Ternatanus Orientalis. *Seb. Vol. I. p.* 91. *Fig. T.* 57. *Mas F.* 2. *Fœm. F.* 1. [*Fig. optimis*].

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'anus, eſt de 7 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du nez, de 2 pouces 9 lignes. Ses oreilles ſont courtes, & un peu pointues. Elle n'a point de queue. Lorſque la membrane, qui luy ſert à voler, eſt étendue, elle a plus de 3 pieds de long d'un bout à l'autre; elle eſt couverte de très peu de poils: ceux qui couvrent le corps, ſont dans quelques individus d'un roux plus foncé ſur le dos que ſur le ventre, & dans d'autres ils ſont noirs: la partie antérieure de la

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum uſque, 7 ½ pollicum eſt; capitis, à vertice ad naſi extremitatem, 2 pollicum cum 9 lineis. Auriculas habet breves & acutiuſculas. Caudâ caret. Membrana volatui inſerviens extenſa, ab unâ extremitate ad aliam trium pedum longitudinem ſuperat, rariſſimiſque pilis tegitur. Pili corpus tegentes in quibuſdam individuis ſunt rufi, ſaturatiores in dorſo, in ventre dilutiores; in aliis verò nigri: capitis partem anteriorem & roſtrum veſtiunt pili rufi. Habitat in *Borboniâ*,

Borboniâ, & *Ternatanâ* Inſulis.

tête & le muſeau ſont couverts de poils roux. On la trouve dans les Iſles de *Bourbon*, & *Ternate*.

** 2. La Roussette a col rouge.

Pteropus fuſcus, auriculis brevibus acutiuſculis, collo ſuperiore rubro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum uſquè, 5 ½ pollicum; capitis, à vertice ad naſi extremitatem, 1 ½ pollicis. Auriculas habet breves & acutiuſculas. Caudâ caret. Membrana volatui inſerviens, extenſa, ab unâ extremitate ad aliam 2 circiter pedes longa eſt. Per totum corpus veſtitur pilis fuſcis, exceptâ parte colli ſuperiore, quam pili rubri cooperiunt. Habitat in *Borboniâ* Inſulâ. Ex muſeo *Realmuriano*.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'anus, eſt de 5 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du nez, de 1 ½ pouces. Ses oreilles ſont courtes & un peu pointuës. Elle n'a point de queue. Lorſque la membrane, qui luy ſert à voler, eſt étenduë, elle a environ 2 pieds de long d'un bout à l'autre. Tout ſon corps eſt couvert de poils bruns, excepté la partie ſupérieure du col, qui eſt couverte de poils rouges. On la trouve dans l'Iſle de *Bourbon*, d'où elle a été envoyée à M. *de Reaumur*.

3. La Roussette a longues oreilles.

Pteropus auriculis longis, patulis, naſo membranâ antrorsùm inflexâ aucto.

Veſpertilio Cynocephalus maximus, auritus, ex novâ Hiſpaniâ. *Klein. Quadr. p.* 62.
Canis volans maximus, auritus, ex Novâ Hiſpaniâ. *Seb. Vol. I. p.* 92. *Fig. T.* 58. *F.* 1. (*Fig. bona*).

A præcedentibus differt auriculis ſuis longis, patulis &

Elle differe des précédentes par ſes oreilles, qui ſont lon-

gues ; ouvertes, & redreſſées ; & par ſon nez, audeſſus duquel eſt une eſpece de membrane recourbée en avant, comme une corne. On la trouve dans la *Nouvelle Eſpagne.*

arrectis ; & naſo, ſuprà quem extat membrana quædam antrorſùm inflexa, & cornu ſimilis. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ.*

ORDO XIV.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore quatuor, in inferiore ſex; & digitis unguiculatis prædita.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM, ſicut in Ordine præcedente, alia ſunt quorum digiti omnes à ſe invicem omninò ſunt ſeparati; alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Proſimia*: ſecunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur, ſicut *Veſpertilio.*

ORDRE XIV.

LES QUADRUPEDES

Qui ont quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & ſix à l'inférieure; & les doigts onguiculez.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre, comme dans l'Ordre précédent, les uns ont tous les doigts ſéparez les uns des autres; les autres ont ceux des pieds de devant joints enſemble par une membrane étenduë en aîles. Ils ſe diviſent de même en deux Sections: dans la premiere ſont ceux qui ont tous les doigts ſéparez les uns des autres, comme le *Maki*: dans la ſeconde ſont ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étenduë en aîles, comme la *Chauve-Souris.*

SECTIO I.

Ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, ſcilicet *Proſimia.*

SECTION I.

Ceux dont tous les doigts ſont ſeparés les uns des autres.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Maki.*

XXXI.

Le Genre du Maki.

(Fig. 5.).

Son caractere eſt

D'avoir quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure (Fig. 5. a.), & ſix à l'inférieure (Fig. 5. b.):

A chaque pied cinq doigts onguiculés,

Tous ſéparés les uns des autres:

Le pouce bien diſtinct.

Obſ. 1°. Toutes les eſpeces de ce Genre ont les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure (*Fig.* 5. *a*, *a.*) ſéparées par paires & convergentes; celles de la mâchoire inférieure (*Fig.* 5. *b.*) ſont très étroites, toutes contiguës, couchées obliquement, & avancent en avant. Elles ont 12 dents canines, ſçavoir trois de chaque coté à chaque mâchoire (*Fig.* 5. *c.*), leſquelles ſont larges, plattes, & ſe terminent en pointe; & quatre dents molaires de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, & 3 de chaque côté à l'inférieure; en tout 36 dents.

Obſ. 2°. Leurs ongles ſont larges, plats, & terminez par une pointe obtuſe, excepté celui de l'index des pieds de derriere, qui eſt plus étroit & plus long. Leurs pieds de devant ſont l'office de mains.

XXXI.

Genus Proſimiæ.

(Fig. 5.).

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore quatuor (Fig. 5. a.), in inferiore ſex (Fig. 5. b.):

In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati,

Omnes à ſe invicem ſeparati:

Pollex diſtinctus.

Obſ. 1°. Omnium hujus Generis ſpecierum dentes inciſores in maxillâ ſuperiore (*Fig.* 5. *a*, *a.*) ſunt per paria remoti & convergentes; in inferiore (*Fig.* 5. *b.*) verò ſtrictiores, contigui, obliquè inclinati, & prominentes: canini ſunt duodecim, tres utrinque (*Fig.* 5. *c.*) in utrâque maxillâ, lati, plani, & in acumen deſinentes; molares 4 utrinque in maxillâ ſuperiore, tres utrinque in inferiore; ſumma dentium 36.

Obſ. 2°. Ungues habent latos, planos, in acumen obtuſum deſinentes, excepto ungue indicis poſteriorum pedum ſtrictiore, & longiore. Pedibus anterioribus pro manibus utuntur.

** 1. Le Maki.

Proſimia fuſca.

Simia Sciurus lanuginoſus fuſcus, &c. *Gaz. Pet. Fig. T.* 17. *F.* 5. (*Fig. optima*).

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 11 pollicum; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 3 pollicum; caudæ unius pedis cum 4 ½ pollicibus. Roſtrum habet elongatum & acutum; auriculas breves, inque pilis ferè occultatas. Per univerſum corpus veſtitur pilis mollibus, & quaſi laneis, fuſcis in toto corpore, exceptis naſo, gutture, & ventre ſordidè albis: in poſteriore dorſi parte fuſcus paululùm ad rufum tendit. Habitat in *Madagaſcariâ.*

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 11 pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 3 pouces; celle de ſa queue d'un pied 4 ½ pouces. Son muſeau eſt allongé & pointu: ſes oreilles ſont courtes, & preſque cachées dans ſes poils. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & le ventre, qui ſont d'un blanc ſale: le brun tend un peu au roux vers la partie poſtérieure du dos. On le trouve à *Madagaſcar.*

** 2. Le Maki aux pieds blancs.

Proſimia fuſca, naſo, gutture, & pedibus albis.

Magnitudine præcedentem adæquat. Sicut ille, breves habet auriculas, & in pilis ferè occultas; & roſtrum elongatum & acutum. Pilis mollibus, & quaſi laneis, in toto corpore fuſcis, exceptis naſo, gutture & pedibus albis, & ventre ſordidè albo, veſtitur. Ex muſeo *Realmuriano.* Habitat in *Madagaſcariâ.*

Il eſt de la grandeur du précédent. Il a, comme luy, les oreilles courtes, & cachées dans ſes poils; & le muſeau allongé & pointu. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & les 4 pieds, qui ſont blancs, & le ventre qui eſt d'un blanc ſale. Il eſt dans le Cabinet de M. *de Reaumur.* On le trouve à *Madagaſcar.*

** 3. Le Maki aux pieds fauves.

Proſimia fuſca, rufo admixto, facie nigrâ, pedibus fulvis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque,

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à

la queue, eſt de 13 ou 14 pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 3 pouces 3 lignes; & celle de ſa queue d'un pied 5 pouces. Son muſeau eſt allongé & pointu : ſes yeux ſont d'un jaune roux : ſes oreilles ſont longues de 10 lignes, & larges d'environ 1 pouce. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & laineux, bruns pardeſſus le corps, & à la partie extérieure des jambes, & d'un blanc ſale & jaunâtre pardeſſous le corps, & à la partie intérieure des jambes. Sa face & ſon muſeau ſont noirs; ſes 4 pieds fauves : les poils qui couvrent le dos, ſont mêlés d'un peu de rouſsâtre. Il eſt dans le abinet de M. *de Reaumur*. On le trouve à *Madagaſcar*.

13 eſt aut 14 pollicum; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 3 pollicum cum 3 lineis; caudæ unius pedis cum 5 pollicibus. Roſtrum habet elongatum & acutum; oculos ex flavo ruſos; auriculas 10 lineas longas, & uno pollice latas. Per univerſum corpus veſtitur pilis mollibus, & quaſi laneis, in partibus corporis ſuperiore, & crurum exteriore fuſcis, & in partibus corporis inferiore, & crurum interiore ex ſordidè albo flavicantibus. Facies & roſtrum nigreſcunt : pedes 4 ſunt fulvi : pilis fuſcis dorſum tegentibus aliquid rufi admixtum eſt. Ex muſeo *Realmuriano*. Habitat in *Madagaſcariâ*.

** 4. Le Maki a queue annellée.

Proſimia cinerea, caudâ cinctâ annullis alternatim albis & nigris.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt d'environ 1 pied; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 3 pouces; celle de ſa queue d'environ 1 ½ pied. Son muſeau eſt blanchâtre & pointu : ſes oreilles ſont longues de 10 lignes, & larges d'autant, & couvertes de poils blancs. Tout ſon corps eſt couvert de poils

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, unius eſt circiter pedis; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 3 pollicum; caudæ circiter 1 ½ pedis. Roſtrum habet albidum & acutum; auriculas 10 lineas longas, totidem latas, pilis albis obſitas. Univerſum corpus veſtitur pilis longis, mollibus, & quaſi laneis, in par-

tibus corporis ſuperiore, 4 crurum exteriore, & pedibus anterioribus in exortu rufis, deinde cinereis, itàque diſpoſitis ut animal cinereum appareat; in partibus verò corporis inferiore, 4 crurum interiore, & poſterioribus pedibus albis. Cauda annulis alternatìm albis & nigris cingitur. Habitat in *Madagaſcariâ.* Ex museo *Realmuriano.*

longs, doux & laineux : ceux du deſſus du corps, des pieds de devant, & de l'extérieur des 4 jambes ſont roux à leur origine, & terminés de gris, de façon qu'il n'y a que cette derniere couleur qui paroiſſe : ceux du deſſous du corps, des pieds de derriere, & de l'intérieur des 4 jambes ſont blancs. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de blanc. On le trouve à *Madagaſcar.* Il eſt dans le Cabinet de M. *de Reaumur.*

SECTIO II.

Ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, ſcilicet *Veſpertilionis.*

XXXII.

Genus Veſpertilionis. (Fig. 6).

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore quatuor (Fig. 6. a.), in inferiore ſex (Fig. 6. b.);

Digiti unguiculati,

In anterioribus pedibus membranâ, in alas expansâ, inter ſe connexi, in poſ-

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étenduë en aîles.

CETTE Section ne contient qu'un ſeul Genre, qui eſt celui de la *Chauve-Souris.*

XXXII.

Le Genre de la Chauve-Souris. (Fig. 6.).

Son caractere eſt

D'avoir quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure (Fig. 6. a.), & ſix à l'inférieure (Fig. 6. b.);

Les doigts onguiculés,

Joints enſemble par une membrane étenduë en aîles dans les pieds de devant, & ſépa-

rez les uns des autres dans ceux de derriere.

Obſ. 1o. Toutes les eſpeces de ce Genre ont les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure aiguës, & ſéparées par paires : celles du milieu (*Fig.* 6. *d.*) ſont fourchuës, & plus grandes que les extérieures : celles de la mâchoire inférieure (*Fig.* 6. *e.*) ſont toutes contiguës, & échancrées. Le nombre des canines & des molaires varie.

Obſ. 2o. Elles ont les jambes de devant très longues, dont le pied eſt diviſé en longs doigts, & tous (excepté le pouce, qui eſt ſéparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints enſemble par une membrane, qui n'eſt autre choſe qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col juſqu'à l'anus, ou au bout de la queue ; enſuite tout le long des jambes, & juſqu'au bout des doigts des pieds de devant : c'eſt par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les doigts des pieds de derriere ſont ſéparés les uns des autres, & armés d'ongles crochus & très pointus.

Obſ. 3o. Elles ſont cachées pendant tout l'Hyver, & l'Eté pendant le jour, dans des lieux obſcurs & ſouterrains, ou dans des trous d'arbres ; & elles n'en ſortent que vers l'entrée de la nuit.

terioribus à ſe invicem ſeparati.

Obſ. 1o. Omnium hujus Generis ſpecierum dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſunt acuti, & per paria remoti ; intermedii (*Fig.* 6. *d.*) exterioribus majores ſunt & bifurci ; in maxillâ inferiore (*Fig.* 6. *e.*) contigui, omnes emarginati. Dentium caninorum & molarium variat numerus.

Obſ. 2o. Crura habent anteriora longiſſima, quorum pedes dividuntur in digitos longos, omnes (excepto pollice ab aliis ſeparato, incurvoque & valido ungue munito) membranâ inter ſe connexos ; quæ membrana nihil aliud eſt quam dorſi cutis continuata, in utroque latere, à collo ad anum uſque, aut caudæ extremitatem, & ſecundùm crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extenſa, cujus ope volitant. Pedum poſteriorum digiti ſunt à ſe invicem ſeparati, incurviſque & acutiſſimis unguibus muniti.

Obſ. 3o. Locis obſcuris & cavernis ſubterraneis, vel cavis arboribus per æſtatem interdiù, & per totam Hyemem latitant ; crepuſculo tantùm evolant.

** 1. LA GRANDE CHAUVE-SOURIS DE NOTRE PAYS.

Veſpertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis ſimplicibus... VESPERTILIO MAJOR.

Veſpertilio caudatus, ore naſoque ſimplici. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 14. *ſp.* 2.
*Faun. Suec. Linn. N*o. 18.

Veſpertilio

Veſpertilio auriculis binis. *Jonſt. Avi. p.* 34. *Fig. T.* 20. [*Fig. ſat bona*].
Veſpertilio vulgaris. *Klein. Quadr. p.* 61.
Veſpertilio. *Raj. Syn. Quadr. p.* 343.
Geſn. Avi. Fig. p. 766. [*Fig. ſat bona*].
Geſn. Icon. Avi. Fig. p. 17. [*Fig. ſat bona*].
Aldro. Avi. p. 571. *Fig. p.* 576. (*Fig. ſat bonis*).
Charlet. Exer. p. 80.
Sloane. Vol. II. p. 330.
Les Hébreux l'appellent ATALEPH. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, ATALÆPHA. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Νυκτερὶς.
Les Arabes, BAPHAS. *Geſn. Aldro.*
Les Perſes, ANSEB; PERACK. *Geſn. Aldro.*
Les Portugais, MORCEGO, *ou* MURZIEGALO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, NOTTOLA; NOTULA; SPORTEGLIONO; RATTO PENAGO; BARBASTELLO; PIPISTRELLO; VILPISTRELLO. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, NIETOPERSZ. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, NETOPYRZ. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, FLÅDERMUSS, *ou* SPECKMAUSS. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, LÅDERLAPP, *ou* FLÅDERMUS. *Linn.*
Les Smolandois, NATTBLACKA. *Linn.*
Les Anglois, BAT, *ou* FLITTERMOUSE. *Raj.*

Quoad magnitudinem corporis, & pilorum colorem *Soricem* æmulatur. Auriculas habet auriculis *Murinis* ſimiles, ſcilicet ſubrotundas & pellucidas; roſtrum breve & obtuſum; in ſingulis pedibus digitos 5; caudam ſat longam, cum membrana volatui inſerviente connexam: membrana illa extenſa, ab una extremitate ad aliam uno circiter pede longa eſt. Locis obſcuris & cavernis ſubterraneis per æſtatem interdiù, & per totam hyemem latitat; crepuſculo tantùm évolat.

Elle reſſemble à peu-près à la *Souris* par la grandeur de ſon corps, & la couleur de ſes poils. Elle a le muſeau court & obtus: ſes oreilles ſont ſemblables à celles d'un *Rat*, ſçavoir arrondies & tranſparentes: elle a 5 doigts à chaque pied. Sa queue, qui eſt aſſez longue, eſt jointe avec la membrane qui luy ſert à voler: cette membrane étenduë, a environ 1 pied de long d'un bout à l'autre. Elle habite pendant tout l'hyver, & le jour pendant l'Eté dans des lieux obſcurs & ſouterrains; & elle n'en ſort que vers l'entrée de la nuit.

2. La petite Chauve-Souris de Ternate.

Veſpertilio rufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis ſimplicibus... Vespertilio minor Ternatanus.

Veſpertilio Ternatanus auriculis ſimplicibus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Veſpertilio Ternatanus. *Seb. Vol. I. p. 91. Fig. T. 56. Mas F. 3. Fœm. F. 2. [Fig. optimis].*

Elle ne differe de la précédente que par la couleur de ſes poils, qui ſont roux : elle lui reſſemble dans tout le reſte. On la trouve dans l'Iſle de *Ternate*.

A præcedente differt tantùm pilorum colore rufo : in omnibus aliis ei ſimillima eſt. Habitat in *Ternatanâ* Inſulâ.

** 3. La petite Chauve-Souris de notre pays.

Veſpertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus... Vespertilio minor.

Veſpertilio vulgaris auriculis duplicibus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Veſpertilio auriculis quaternis. *Jonſt. Avi. p. 34. Fig. T. 20. (Fig. ſat bonis).*
Veſpertilio. *Aldro. Avi. p. 571. Fig. p. 574, & 575. [Fig. ſat bonis].*

Elle reſſemble en tout à la premiere eſpece ; elle n'en differe que par la grandeur de ſes oreilles, qui ont plus d'un pouce de long, & qui ſont comme doubles.

In omnibus cum ſpecie primâ convenit, exceptis auriculis unius pollicis longitudinem ſuperantibus, & quaſi duplicibus.

4. La grande Chauve-Souris de Ternate.

Veſpertilio ſubrufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus, naſo gemino... Vespertilio major Ternatanus.

Veſpertilio caudatus, naſo foliato, obverſè cordato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 14. ſp. 5.*
Veſpertilio, Rattus Ternatanus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Glis volans Ternatanus. *Seb. Vol. I. p. 90. Fig. T. 56. F. 1. (Fig. optimâ).*

Per univerſum corpus veſtitur pilis ſubrufis ; qui verò partem capitis anteriorem cooperiunt, dilutiſſimè ſunt rufi. Membrana volatui inſerviens, cujus ſuperficies ſuperior raris pilis obſita eſt, inferior verò glabra & nuda, marmoris in modum variegatur. Auriculas habet prægrandes & quaſi duplices ; naſum pariter geminum, extuberantem, & foliacei quid referentem ; in ſingulis pedibus digitos 5. Habitat in Inſulâ *Ternatanâ.*

Tout ſon corps eſt couvert de poils rouſsâtres : ceux qui couvrent la partie antérieure de la tête, ſont d'un roux très clair. La membrane qui luy ſert à voler, eſt comme marbrée, & garnie de quelques poils endeſſus, & nuë en deſſous. Ses oreilles ſont grandes & comme doubles : ſon nez eſt auſſi double, aquilin, & comme exfolié. Elle a 5 doigts à chaque pied. On la trouve dans l'Iſle de *Ternate.*

5. La Chauve-Souris rousse d'Amérique.

Veſpertilio dilutè rufus, pedibus anticis tetradactylis, poſticis pentadactylis... Vespertilio Americanus rufus.

Veſpertilio caudatus, labio ſuperiore bifido. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 14. *ſp.* 3.

Veſpertilio Americanus, capite globoſo, ore leporino. *Klein. Quadr. p.* 61.

Veſpertilio Cato ſimilis Americanus. *Seb. Vol. I. p.* 89. *Fig. T.* 55. *F.* 1. (*Fig. optimâ*).

Pilis dilutè rufis in toto corpore veſtitur. Caput habet globoſum ; orem patulum ; mentum pendulum ; nares rotundas ; auriculas magnas ; caudam cum membranâ volatui inſerviente connexam ; in pedibus anterioribus digitos 4, in poſterioribus verò 5. Habitat in *Americâ.*

Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un roux clair. Elle a la tête ronde ; la bouche large ; le menton pendant ; les narines rondes ; les oreilles grandes ; la queue jointe avec la membrane qui luy ſert à voler ; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. On la trouve en *Amérique.*

6. La Chauve-Souris d'Amérique.

Veſpertilio murini coloris, pedibus anticis tetradactylis, poſticis pentadactylis, naſo criſtato... Vespertilio Americanus.

Veſpertilio caudatus, naſo foliato acuminato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 14. *ſp.* 4.

Veſpertilio Americanus vulgaris, longioribus auriculis, & è naſo erectâ criſtulâ. *Klein. Quadr. p.* 61.

Veſpertilio Americanus vulgaris. *Seb. Vol. I. p.* 90. *Fig. T.* 55. *F.* 2. (*Fig. optimâ*).

Elle reſſemble aſſez par la forme du corps à la premiere eſpece; mais elle a les oreilles plus amples, & plus longues qu'elle. Elle porte ſur le nez une eſpece de petite crête, aſſez ſemblable à un *caſque*: elle n'a point de queue: elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. La couleur de ſon poil eſt un gris de *Souris*. On la trouve en *Amérique*.

Quoad formam corporis ſpeciem primam ſat benè imitatur; majores tamen atque longiores habet auriculas, & è naſo erectam, *Caſſidi* ferè æmulam, criſtulam gerit; caudâ caret: 4 in pedibus anterioribus digitis donatur, in poſterioribus verò 5. Pilorum color eſt *Murinus*. Habitat in *Americâ*.

ORDO XV.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore ſex, in inferiore quatuor; & digitis unguiculatis prædita.

UNICO QUADRUPEDE, *Phocâ* ſcilicet, ſeu *Vitulo-Marino*, conſtituitur hic Ordo.

XXXIII.

Genus Phocæ.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſex, in inferiore quatuor:

In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati,

Membranis inter ſe connexi:

Pedes poſteriores retrorsùm extenſi.

Obſ. Amphibium eſt hoc animal, & diutiùs in mare quàm in terrâ commoratur. 4 dentibus caninis, dentium *Canum* æmulis, præditum eſt, ſcilicet in utrâque maxillâ utrinque unô: dentium molarium variat numerus.

ORDRE XV.

LES QUADRUPEDES

Qui ont ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & quatre à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul QUADRUPEDE, ſçavoir le *Phocas*, ou *Vedu-Marin*.

XXXIII.

Le Genre du Phocas.

Son caractere eſt

D'avoir ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & quatre à l'inférieure:

A chaque pied cinq doigts onguiculés,

Joints enſemble par des membranes:

Les pieds poſtérieurs tournés en arriere.

Obſ. Cet animal eſt amphibie & habite plus la mer que la terre. Il a 4 dents canines ſemblables à celles des *Chiens*, ſçavoir une de chaque côté à chaque mâchoire: le nombre de ſes dents molaires varie.

** 1. Le Phocas, ou Veau-Marin.

Phoca, ſeu Vitulus-Marinus.

Phoca dentibus caninis tectis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 9. ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. N°. 11.
Phoca ſeu Vitulus marinus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 189.
Aldrov. Piſc. p. 722. *Fig. p.* 724. [*Fig. mala*].
Jonſt. Piſc. p. 156. *Fig. T.* 44. [*Fig. mala*].
Phoca. *Klein. Quadr. p.* 93.
Geſn. Piſc. bis Fig. p. 830 [*Fig. ſuperior ſat bona, inferior mala*].
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 164. (*Fig. mala*), *& p. 366. B.* (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. Piſc. p. 48. *N°.* 6.
Vitulus marinus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 68. (*Fig. mala*).
Bell. de Aquat. p. 19. *Fig. p.* 21. [*Fig. mala*].
Veau Marin. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 189. *Fig. Pl.* 27. (*Fig. aſſez bonne*).
Voy. de la B. de Hud. Tom. II. Fig. p. 24. [*Fig. aſſez bonne*].
Kolbe. Tom. III. p. 128.
Chien, ou Veau de mer. *Hiſt. de l'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 165. *Fig. p.* 168. (*Fig. aſſez bonne, exceptez les pieds*).
Loup Marine. *Klein.*
Les Grecs l'appellent Φώκη.
Les Eſpagnols, LOBO MARINO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, VECHIO MARINO. *Geſn. Aldro. Bell.*
Les Genevois, BUO, *ou* BOVE MARINO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, MEER-WOLFF, *ou* MEER-HUND. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, MORSKIECIELE. *Geſn.*
Les Suédois, SIÅL. *Linn.*
Les Norvégeois, KAABE. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Groenlandois, PUSA. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Danois, SEE-HUND. *Charlet.* SÅLHUND. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Hollandois, ZEEHUNDT. *Aldro.*
Les Flamands, SEEHOND. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, SEA CALF, *ou* SOILE. *Raj. Charlet.* SEAL-HUND. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Habitans du Cap de B. Eſp. CHIEN MARIN. *Kolbe.*
Les Amériquains Septentrionaux, LOUP MARINE. *Hiſt. d'Iſl.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 4 pieds de long. Son muſeau eſt oblong : ſes yeux ſont grands, & enfoncés profondé-

Corpus, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 4 circiter pedes longum eſt. Roſtrum habet oblongum ; oculos magnos, in orbitas pro-

fundè demerſos. Caret auriculis externis; ſed non caret foraminibus, quibus ſonum recipit. Collum ei eſt oblongum; pectus latum: crura ſub cute clauſa latitant; pedes ſoli exſeruntur, & extrorsùm apparent; anteriores 4 pollices longi ſunt; poſteriores verò 9: digiti omnes ſingulorum pedum validis membranis inter ſe ſunt connexi, validiſque unguibus muniti. Cauda 3 circiter pollices longa, horizontaliter plana eſt. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, rigidis, cinereis ſplendentibus in dorſo, maculiſque nigricantibus variegatis; in ventre verò ex ſordidè albo flavicantibus: dantur & omninò nigræ. Habitat in mare, quandoque in terrâ.

ment dans leurs orbites. Il n'a point d'oreilles extérieurement; mais à leur place il y a des trous par leſquels il entend; ſon col eſt oblong; ſa poitrine large: ſes jambes ſont tout à fait cachées ſous la peau; il n'y a que les pieds qui paroiſſent; ceux de devant ont 4 pouces de long, & ceux de derriere 9 pouces: tous leurs doigts ſont joints enſemble par de fortes membranes, & armés d'ongles forts. Sa queue a environ 3 pouces de long, & eſt platte horizontalement. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, roides, d'un gris brillant, & marqués de taches noirâtres endeſſus; & d'un blanc ſale & jaunâtre en deſſous: il y en a auſſi de tout à fait noirs. On le trouve dans la mer, & quelque fois à terre.

ORDRE XVI.

LES QUADRUPEDES

Qui ont ſix dents inciſives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre les uns ont les doigts ſéparés les uns des autres; & les autres les ont joints enſemble par des membranes. Ils ſont tous Carnivores. Ils ont quatre dents canines, ſçavoir une de chaque côté à chaque mâchoire : le nombre des dents molaires varie. Ils ſe diviſent en deux Sections. Dans la premiere ſont ceux qui ont les doigts ſéparés les uns des autres, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Belette*, l'*Ours*, &c. Dans la ſeconde, ceux dont les doigts ſont joints enſemble par des membranes, comme la *Loutre*.

ORDO XVI.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ ſex, & digitis unguiculatis prædita.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia ſunt quorum digiti à ſe invicem ſunt ſeparati, alia quorum digiti membranis inter ſe connectuntur. Omnia Carnivora. Quatuor dentibus caninis prædita ſunt, ſcilicet unô utrinque in utrâque maxillâ : dentium molarium variat numerus. In duas ſectiones dividuntur. Prima continet ea quorum digiti à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Canis*, *Felis*, *Muſtela*, *Urſus*, &c. Secunda ea quorum digiti membranis inter ſe connexi ſunt, ut *Lutra*.

SECTION I.

Ceux dont les doigts ſont ſéparés les uns des autres.

CETTE Section contient ſix Genres de QUADRUPEDES, dont les caracteres ſont

SECTIO I.

Ea quorum digiti à ſe invicem ſunt ſeparati.

SEX in illâ Sectione continentur genera QUADRUPEDUM, quorum characteres

racteres à pedibus deſumuntur. Alia quatuor digitis in pedibus anterioribus, & quinque in poſterioribus donantur, ut *Hyæna.* Alia quinque in pedibus anterioribus, & quatuor tantùm in poſterioribus, digitis prædita ſunt, ut *Canis.* Alia in ſingulis pedibus quinque digitos habent: ex his ultimis alia ſunt quorum pollex ab aliis digitis remotus eſt, & ſuperiùs collocatus, ut *Muſtela* : & alia quorum pollex aliis digitis eſt proximus, ut *Meles.* Alia calcaneis incedunt, ut *Urſus.* Alia denique unguibus hamatis & retractilibus prædicta ſunt, ut *Felis.*

tirés des pieds. Les uns ont quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere, comme l'*Hyene.* D'autres ont cinq doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere, comme le *Chien.* D'autres ont 5 doigts à chaque pied : parmi ces derniers, les uns ont le pouce ſéparé des autres doigts, & articulé plus haut, comme la *Belette* : & les autres ont le pouce placé auprès des autres doigts, comme le *Blaireau.* D'autres s'appuyent ſur le talon en marchant, comme l'*Ours.* D'autres enfin ont les ongles crochus, & qui peuvent être retirés, & entierement cachés, comme le *Chat.*

XXXIV.

Genus Hyænæ.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :

Digiti unguiculati in pedibus anterioribus quatuor, in poſterioribus quinque,

Omnes à ſe invicem ſeparati.

XXXIV.

Le Genre de l'Hyene.

Son caractere eſt

D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :

Quatre doigts onguiculés aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere,

Tous ſéparés les uns des autres.

** 1. L'HYENE.

HYÆNA.

Hyæna. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 624. (*Fig. bona, ſi nigra eſſet nec maculata*).
Hyæna, vel Belbus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 75. (*Fig. eadem*).
Zilio Hyæna. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 56. (*Fig. ut ſuprà*).
Animal Necrophagum, ſive Jeſef, ſive Hyæna. *Euſ. Nieremb. p.* 181.
Canis pilis cervicis erectis longioribus. Hyæna. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 8. *ſp.* 4.

Gulo; Boophagus; Magnus vorator; Roſomacha. *Klein. Quadr. p.* 83. *Fig. T.* 5. (*Fig. mala*).
Gulo. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 623. (*Fig. mala*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 78. *Fig. p.* 79. (*Fig. mala*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 178.
Jonſt. Quadr. p. 91. *Fig. T.* 57. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 15.
Roſomacha. *Euſ. Nieremb. p.* 188.
Dabuh Arabum. *Charlet. Exer. p.* 15.
Lupus veſpertinus Julii Capitolini. *Aldro.*
Vultur Quadrupes, Scaligeri. *Klein. Charlet. Jonſt.*
Les Arabes l'appellent ZABO, *ou* DABUH. *Geſn. Jonſt.*
Les Siriens, DABHA, *ou* DAHAB. *Geſn.*
Les Suédois, FILFRAS. *Linn.*
Les Allemands, VILFRAS. *Geſn. Aldro. Jonſt.*
Les Africains, JESEF. *Geſn. Euſ. Nieremb.* SESEF. *Jonſt. Charlet.*

Il eſt de la grandeur & de la figure d'un *Loup*. Il a les oreilles courtes. Tout ſon corps eſt couvert de poils aſſez longs, & noirs. On le trouve en *Afrique*.

Magnitudine & figurâ *Lupum* æmulatur. Breves habet auriculas. Per univerſum corpus veſtitur pilis ſat longis, & nigris. Habitat in *Africâ*.

XXXV.

Le Genre du Chien.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
Cinq doigts onguiculés aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere,
Tous ſéparés les uns des autres.

Obſ. Il arrive quelquefois que les *Chiens domeſtiques* ont 5 doigts à chaque pied; mais cette variété ne peut point induire en erreur, parce qu'on ne la trouve que dans les *Chiens domeſtiques*, qui ſont des animaux trop connus, pour qu'on puiſſe les confondre avec d'autres.

XXXV.

Genus Caninum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :
Digiti unguiculati in pedibus anterioribus quinque, in poſterioribus quatuor,
Omnes à ſe invicem ſeparati.

Obſ. Canes domeſtici quandoque in ſingulis pedibus quinque digitis donantur; quæ varietas in errorem inducere nequit, quoniam reperitur in ſolis *domeſticis Canibus*, animalibus itâ notis, ut nullis aliis confundi poſſint.

** 1. Le Chien.

Canis domesticus.

Canis caudâ (ſiniſtrorsùm) recurvâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 12.
Canis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 175.
Klein. Quadr. p. 68.
Geſn. Quadr. Fig. p. 173. (Fig. bonis).
Geſn. Icon. Quadr. p. 25. Fig. p. 25, 26 & 27. (Fig. bonis).
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 482.
Jonſt. Quadr. p. 122. Fig. T. 69, 70 & 71. (Fig. bonis).
Charlet. Exer. p. 26.
Sloane. Vol. II. p. 329.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 244.
Les François appellent le mâle Chien; *& la femelle*, Chienne.
Les Hébreux l'appellent Keleb. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, Kalba. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes, Kelbe. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Κύων.
Les Saraſins, Kepb, *ou* Kolpb. *Geſn.*
Les Perſes, Sag. *Geſn.* Sig. *Aldro.*
Les Médes, Spaca. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, Perro. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Cane. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, Pes, *ou* Pas. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Hund. *Geſn. Aldro*
Les Suédois, Hund. *Linn.*
Les Anglois, Dog. *Raj.*

Canis eſt animal omnibus ità notum, ut deſcriptione non indigeat.

Le Chien eſt un animal ſi connu de tout le monde, qu'il n'a pas beſoin de deſcription.

Obſ. Omnes *Canum*, quas videmus, differentiæ ſunt tantummodò ejuſdem ſpeciei varietates, non verò ſpecies diſtinctæ.

Obſ. Toutes les differences, que nous remarquons dans les *Chiens*, ne ſont que des variétés de la même eſpece, & point du tout des eſpeces differentes.

** 2. Le Loup.

Canis ex griſeo flaveſcens... Lupus vulgaris.

Canis caudâ incurvâ. Lupus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 2.*

Faun. Suec. Linn. N°. 13.

Lupus vulgaris. *Klein. Quadr. p.* 70.

Charlet. Exer. p. 15.

Lupus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 173.

Geſn. Quadr. p. 716. *Fig. p.* 717. (*Fig. ſat bona*).

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 79. (*Fig. ſat bona*).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 144.

Jonſt. Quadr. p. 89. *Fig. T.* 56. (*Fig. bona*).

Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 219.

Lupus, ſeu Canis ſylveſtris. *Rzac. Auct. p.* 312.

Les François appellent le mâle Loup; *la femelle*, Louve; *& le jeune*, Louveteau.

Les Hébreux l'appellent Zeeb. *Geſn. Aldro.*

Les Chaldéens, Deeba, & Deba. *Geſn. Aldro.*

Les Arabes le mâle, Dib; *la femelle*, Zeebah. *Geſn. Aldro.*

Les Grecs, Λύκος.

Les Sabins, Hirpus. *Aldro.*

Les Eſpagnols, Lobo. *Geſn. Aldro.*

Les Italiens, Lupo. *Geſn. Aldro.*

Les Allemands, Wolff. *Geſn. Aldro. Rzac.*

Les Illyriens, Wlk. *Geſn.*

Les Polonois, Wilk. *Rzac.*

Les Suédois, Warg; Ulf. *Linn.*

Les Anglois, Wolf. *Raj. Geſn.*

Le Loup eſt un animal aſſez connu, pour qu'il n'ait pas beſoin d'une longue deſcription. La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt d'environ 2 pieds 8 pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 7 pouces : ſa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, eſt d'environ 1 pied, 8 pouces. Son muſeau eſt allongé & obtus (en quoi il differe du *Renard*, qui a le muſeau plus pointu) : ſes oreilles ſont aſſez courtes & droites : ſa queue eſt groſſe, & couverte de longs poils. La cou-

Lupus eſt animal ſatis notum, ut amplâ deſcriptione non indigeat. Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, 2 eſt circiter pedum cum 8 pollicibus; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 7 pollicum : à parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, unum pedem & 8 pollices circiter altus eſt. Roſtrum habet elongatum & obtuſum, (quo differt à *Vulpe* roſtro acutiori donato); auriculas ſat breves & erectas; caudam craſſam, pilis longis obſitam. Pilorum color vulgaris eſt ex griſeo flaveſ-

cens, quandoque etiam nigricantibus pilis in dorſo mixtis : in *Septentrionalibus Regionibus* candidiſſimi repeiuntur. Habitat in ſylvis.

leur de ſes poils eſt ordinairement un gris tirant ſur le jaunâtre, quelquefois mêlée de noirâtre ſur le dos ; il y en a de tout à fait blancs dans les *Pays Septentrionaux.* On le trouve dans les bois.

3. Le Loup doré.

Canis flavus... Lupus aureus.

Canis, Lupus aureus dictus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 8. *ſp.* 3.
Lupus aureus, Aſiaticus. *Klein. Quadr. p.* 70.
Lupus aureus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 174.
Geſn. Quadr. p. 717.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 174.
Jonſt. Quadr. p. 91.
Charlet. Exer. p. 15.
Kœmpf. p. 413. *Fig. p.* 407. *F.* 3.
Aſiaticum Animal *Adil* nuncupatum. *Bell. Obſ. p.* 160.
Les Grecs modernes l'appellent Squilachi. *Raj. Klein. Aldro. Bell.*
Les Perſes, Siechaal. *Kæmpf.*
Les Suédois, Jackhals. *Linn.*
Les Flamands, Jakhals. *Kæmpf.*
Les Anglois, Jackcall. *Raj. Klein. Kæmpf.*

Lupo vulgari magnitudine cedit, & *Vulpem* antecellit. Quoad figuram verò *Lupum* æmulatur. Pilorum color eſt eleganter flavus. Habitat in *Ciliciâ*, *Turcicâ*, & universâ *Aſiâ.*

Sa grandeur tient le milieu entre le *Loup* & le *Renard.* Quant à ſa figure, il reſſemble au *Loup.* La couleur de ſes poils eſt d'un beau jaune. On le trouve en *Cilicie*, en *Turquie*, & dans toute l'*Aſie.*

4. Le Loup du Mexique.

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus, tæniis ſubnigris à dorſo ad latera deorsùm hinc inde deductis... Lupus Mexicanus.

Xoloitzcuintli : Lupus Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 479. (*Fig. bona*).

Cuetlachtli, ſeu Lupus Indicus. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 7.
Lupus Indicus. *Euſ. Nieremb. p.* 180.
Les Indiens l'appellent CUETLACHTLI. *Euſ. Nieremb.*

Il eſt de la grandeur du *Loup ordinaire*; mais il a la tête plus groſſe. Il a les yeux agards & étincellants ; les oreilles aſſez longues, & droites; le col gras & épais ; la queue aſſez longue, & point veluë. Il luy ſort de la levre ſupérieure de gros poils, roides comme les picquants fléxibles du *Porc-Epic*, variés de gris & de blanc, & couchés en arriere. La couleur de tout ſon corps eſt griſe, & variée çà & là de taches fauves : ſa tête eſt auſſi griſe, & marquée de bandes tranſverſales noirâtres : il a ſur le front de larges taches fauves ; ſes oreilles ſont griſes : ſon col eſt marqué d'une longue tache fauve : il en a une pareille à la poitrine, & une autre à la partie antérieure du ventre : des bandes noirâtres s'étendent de part & d'autre depuis le dos juſqu'aux côtés. Sa queue eſt griſe, & a vers ſon milieu une tache fauve, qui s'efface peu à peu. Ses jambes & ſes pieds ſont variés de bandes griſes & noirâtres, qui s'étendent du haut au bas. On le trouve dans les endroits chauds de la *Nouvelle Eſpagne*.

Magnitudine *Lupum vulgarem* adæquat ; ſed ampliori capite gaudet. Torvos habet & lucentes oculos; auriculas ſat longas, & erectas; collum obeſum, & craſſum; caudam ſatis longam, non villoſam. Ex ſuperiore labro hirti admodùm pili, retrorsùm flexi, mollioribus *Hyſtricis* aculeis non abſimiles, ex cinereo alboque colore variantes, erumpunt. Color in toto corpore cinereus; maculis tamen ſubinde fulvis variegatus : totum caput cinereum eſt, lineis quibuſdam tranſverſis ſubnigricantibus ornatum ; maculæ latæ coloris fulvi integrum frontem interſtingunt : auriculæ ſunt cinereæ : collum longâ fulvâque maculâ præditum eſt, cui ſimilem in pectore, alteram etiam ſimilem in parte ventris anteriore gerit; tæniæ ſubnigræ, à dorſo ad latera, deorsùm hinc inde deductæ ſunt. Cauda, quæ cinerea eſt, in medio ſubfulvam obtinet maculam, paulatìm evaneſcentem. Crura ac pedes cinereis & nigricantibus lineis, à ſummo ad imum deductis, variegantur. Habitat in calidis *Novæ Hiſpaniæ* locis.

** 5. Le Renard.

Canis fulvus, pilis cinereis intermixtis... Vulpes vulgaris.

Canis caudâ rectâ, extremitate albâ. Vulpes vulgaris. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 6.*
Canis caudâ rectâ, extremitate nigrâ. Vulpes campeſtris. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 5.*
Canis caudâ erectâ. Vulpes fulvus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 14.
Vulpes vulgaris. *Klein. Quadr. p.* 71.
Vulpes. *Raj. Syn. Quadr. p.* 177.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1081. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 88. *Fig. p.* 89. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 195.
Jonſt. Quadr. p. 92. *Fig. T.* 56. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 15.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 231.
Rzac. Auct. p. 324.
Les Hebreux l'appellent Schual. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, Thaal. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes, Thaleb. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Ἀλώπηξ.
Les Eſpagnols, Raposa. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Volpe. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Fuchss. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, Lisska. *Geſn.*
Les Polonois, Lis; Liszka. *Rzac.*
Les Suédois, Råf. *Linn.*
Les Flamands, Vos. *Geſn.*
Les Anglois, Fox. *Raj. Geſn.*

Vulpes eſt animal ità notum, ut amplâ deſcriptione non indigeat. Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, 1 eſt circiter pedis & 8 pollicum; capitis, à vertice ad nares, 5 ½ pollicum; caudæ 15 pollicum. A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 15 aut 16 pollicum altus eſt. Roſtrum habet elongatum & acu-

Le Renard eſt un animal aſſez connu, pour qu'il n'ait pas beſoin d'une longue deſcription. La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt d'environ 1 pied 8 pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'aux narines, de 5 ½ pouces; celle de ſa queue de 15 pouces. Sa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, eſt de 15

ou 16 pouces. Son muſeau eſt allongé & pointu, (en quoi il differe du *Loup*, qui a le muſeau plus obtus). Ses oreilles ſont droites. Sa queue eſt groſſe, & couverte de poils longs & épais: ceux qui couvrent la partie ſupérieure du corps, ſont fauves, mêlés de quelques poils gris; & ceux qui couvrent la partie inférieure, ſont gris. On le trouve dans les bois.

tum, (quo differt à *Lupo*; roſtro obtuſiori prædito); auriculas erectas; caudam craſſam, pilis longis & denſis veſtitam. Pili partem corporis ſuperiorem tegentes, ſunt fulvi, pilis quibuſdam cinereis intermixtis; qui verò partem corporis inferiorem veſtiunt, ſunt cinerei. Habitat in ſylvis.

6. LE RENARD CROISÉ.

Canis fulvus, crucem nigram in dorſo gerens... VULPES CRUCIGERA.

Canis caudâ erectâ. Vulpes cruciatus. *Faun. Suec. Linn.* No. 14.
Vulpes crucigera. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 90. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 221. *Fig. p.* 222. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 93.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 231.
Renard croiſé. *Kolbe. Tom. III. p.* 62.
Les Polonois l'appellent KRZYZAKI. *Rzac.*
Les Suédois, KROSSRÄF. *Linn.*
Les Européens du Cap de B. Eſp. JAKHALS. *Kolbe.*
Les Hottentots, TENLIÇ, *ou* KENLÉE. *Kolbe.*

Il eſt de la grandeur, de la figure, & de la couleur du *Renard ordinaire*: il en differe ſeulement par une bande longitudinale noire, qui s'étend depuis le bout de muſeau juſqu'au bout de la queue, en paſſant pardeſſus la tête & le dos, & une ſeconde tranſverſale, qui paſſe ſur le dos, & s'étend ſur les deux jambes antérieures; de façon que ces deux bandes enſemble, forment

Magnitudine, figurâ & colore *Vulpem vulgarem* æmulatur: ab eâ autem notâ inſigni differt; nam ab ore, per caput & dorſum, ad caudæ apicem uſque, recta, longitudinalis, nigri coloris tænia ducitur, alterâ tæniâ tranſverſâ etiam nigrâ per dorſum & pedes anteriores ductâ; ita ut duæ illæ tæniæ ſimul crucis ſimilitudinem exprimant.

primant. Habitat in *Poloniâ*, *Sueciâ*, &-*Capite B. Spei.*

une croix. On le trouve en *Pologne*, en *Suede*, & au *Cap de Bonne Eſperance.*

7. Le Renard gris.

Canis ex cinereo argenteus... Vulpes cinerea.

Vulpes cinereus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 71.
Renard gris. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 78. [*Fig. très bonne*].
Les Anglois l'appellent Gray Fox. *Cat.*

Magnitudine & figurâ *Vulpem vulgarem* æmulatur : ab eâ autem differt colore qui eſt ex cinereo argenteus. Habitat in *Carolinâ*, & *Virginiâ* in cavis arboribus.

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Renard ordinaire* : il en differe par ſa couleur qui eſt un gris argenté. On le trouve à la *Caroline*, & à la *Virginie* dans des trous d'arbres.

8. Le Renard blanc.

Canis hieme albus, æſtate ex cinereo cœruleſcens... Vulpes alba.

Canis cauda recta unicolore. *a.* Vulpes alba. *b.* Vulpes cœruleſcens. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 8. *ſp.* 7.
Canis caudâ erectâ. Vulpes albus. Vulpes cœruleſcens. *Faun. Suec. Linn.* No. 14.
Vulpes alba. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 220. *Fig. p.* 221. (*Fig. bona*). *Jonſt. Quadr. p.* 93.
Renard blanc. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I p.* 56.
Les Suédois l'appellent Fiåll Racka, *lorſqu'il eſt blanc;* & Blåräf, *lorſqu'il eſt bleuâtre. Linn.*

Magnitudine & figurâ *Vulpem vulgarem* æmulatur : ab eâ autem differt colore, qui æſtate ex cinereo cœruleſcit, hieme verò albus eſt. Habitat in *Septentrionalibus Regionibus.*

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Renard ordinaire* : il en differe par ſa couleur, qui eſt d'un gris bleuâtre en Eté, & blanche en Hiver. On le trouve dans les *Pays du Nord.*

XXXVI.

Le Genre de la Belette.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Tous ſeparés les uns des autres :
Le pouce eloigné des autres doigts, & articulé plus haut.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce Genre ont le corps allongé, & les jambes courtes.

XXXVI.

Genus Muſtelæ.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :
Digiti unguiculati in ſingulis pedibus quinque,
Omnes à ſe invicem ſeparati :
Pollex ab aliis digitis remotus, & altiùs collocatus.

Obſ. Omnia hujus Generis QUADRUPEDA corpus habent gracile, & crura brevia.

** 1. LA BELETTE.

Muſtela ſuprà rutila, infrà alba... MUSTELA VULGARIS.

Muſtela caudæ apice atro. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 5.*
Faun. Suec. Linn. No. 9.
Muſtela vulgaris. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 195.
Klein. Quadr. p. 62.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 307.
Jonſt. Quadr. p. 105. *Fig. T. 64.* (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 20.
Muſtela propriè ſic dicta. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 851. (*Fig. ſat. bona*).
Muſtela. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 99. *Fig. p.* 100. [*Fig. ſat bona*].
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 235.
Les Hebreux l'appellent CHULDAH. *Geſn.*
Les Chaldéens, CHULDA. *Geſn.*
Les Arabes, CALDAH. *Geſn.*
Les Grecs, Γαλεη, *ou* Γαλῆ.
Les Perſes, GURBA. *Geſn.*
Les Eſpagnols, COMADREJA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, DONNOLA; BALLOTTULA; BENULA. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, KOLCZAWA. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, WISELE. *Geſn. Aldro.*
Les Smolandois, WESLA. *Linn. Klein.*
Les Anglois, WEASEL, *ou* WEESEL. *Raj. Geſn. Aldro.*
Les Habitans d'York, FOUMART, *ou* FITCHET. *Raj.*

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, 7 eſt circiter pollicum; caudæ 2 pollicum. Oculos habet parvos & nigros; auriculas breves, ſed latas & ſubrotundas; crura unius pollicis longitudinem non multùm ſuperantia. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, in parte corporis ſuperiore rutilis, in inferiore verò albis. Habitat in agris & ſylvis.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 7 pouces; & celle de ſa queue, de 2 pouces. Elle a les yeux petits & noirs; les oreilles courtes, mais larges & arrondies: ſes jambes n'ont gueres plus d'un pouce de long. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, roux dans la partie ſupérieure du corps, & blancs dans la partie inférieure. On la trouve dans les champs, & dans les bois.

** 2. L'Hermine.

Muſtela hieme alba, æſtate ſuprà rutila infrà alba; caudæ apice nigro.

Muſtela Armellina; Muſtela alba extremâ caudâ nigrâ. *Klein. Quadr. p. 63.*
Muſtela caudæ apice atro. *Faun. Suec. Linn. N*o. 9.
Muſtela candida, ſive Ermineum. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 6.*
Muſtela candida, ſive Animal Ermineum recentiorum. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 198.
Muſtela candida in extremâ caudâ nigricans. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 309. *Fig. p.* 310. [*Fig. ſat bona*].
Muſtela alba. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 852. [*Fig. ſat bona*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 100. (*Fig. ſat bona*).
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 235.
Rzac. Auct. p. 328.
Muſtela tota alba, *Hermellani* dicta. *Jonſt. Quadr. p.* 105.
Muſtela Alpina Junii. *Rzac.*
Hermellanus. *Charlet. Exer. p.* 20.
Les Italiens l'appellent Armelino. *Rzac.*
Les Polonois, Gronostay. *Rzac.*
Les Allemands, Hermelin, *ou* Wyss Wiselin. *Geſn. Rzac.*
Les Suédois, Hermelin, *ou* Lekatt. *Linn.*
Les Norvégeois, Lekat. *Geſn.*
Les Anglois, Ermine, *ou* Stoat. *Raj.*

Figurâ ſuâ *Muſtelam vulgarem* imitatur; ſed eam

Elle reſſemble à la *Belette* par ſa figure; mais elle eſt un peu

plus grande. Elle a les ongles blancs, & le bout de la queue noir. Tout le reſte de ſon corps eſt blanc en Hiver; & en Eté la partie ſupérieure du corps eſt rouſſe, & la partie inférieure eſt blanche. On la trouve en *Ruſſie*, en *Scandinavie*, & dans tous les *Pays du Nord*; & rarement en *France*.

magnitudine ſuperat. Ungues huic albi ſunt, & caudæ apex niger; quo excepto, Hieme in toto corpore alba eſt; æſtate verò in parte corporis ſuperiore rutila, in inferiore verò alba. Habitat in *Ruſsiâ*, *Scandinaviâ*, & in omnibus *Septentrionalibus Regionibus*; in *Galliâ* rariſſima.

** 3. Le Furet.

Muſtela pilis ſubflavis, longioribus caſtaneo colore terminatis, veſtita... Viverra Mas.
Muſtela pilis ex albo ſubflavis veſtita... Viverra Fœmina.

Muſtela ſylveſtris *Viverra* dicta. *Raj. Syn. Quadr. p.* 198.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6, g. 6. ſp. 4.
Muſtela *Viverra* dicta. *Klein. Quadr. p.* 63.
Muſtela ſylveſtris. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 325. *Fig. p.* 327. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 167.
Muſtela ſylveſtris, Ictis. *Rzac, Hiſt. Nat. Pol. p.* 235.
Viverra; Furo; Ictis. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 862. [*Fig. ſat bona*].
Viverra. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 101. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 20.
Furunculus Sipontino. *Rzac.*
Les Grecs l'appellent Κτὶς, *ou* Ικτὶς.
Les Eſpagnols, Huron; Furam. *Geſn.*
Les Polonois, Laska; Lasica Lesna. *Rzac.*
Les Allemands, Frett; Frettel; Furette. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, Ferret. *Raj. Geſn.* Fret; Ferrette. *Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 14 pouces; & celle de ſa queue de 5 pouces. Il a les yeux rouges; les oreilles courtes, larges, & arrondies; & les ongles blancs. Le mâle a le bout du muſeau blanc; la tête jaunâtre; & tout

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 14 eſt pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet rubicundos; auriculas breves, latas & ſubrotundas; & ungues albos. In mare roſtri extremitas alba eſt; caput ſubflavum; & reliquum

corpus pilis ſubflavis, longioribus caſtaneo colore terminatis, veſtitum. Fœmina, quæ mari magnitudine cedit, in parte capitis anteriore alba eſt, & in reliquo corpore ex albo ſubflava. *Africæ* incola eſſe dicitur, indeque ad nos tranſlata.

le reſte du corps couvert de poils jaunâtres, dont les plus longs ſont terminés de marron. La femelle eſt un peu plus petite que le mâle : elle a la partie antérieure de la tête blanche, & tout le reſte du corps d'un blanc jaunâtre. On prétend qu'il nous a été apporté d'*Afrique.*

4. Le Furet des Indes.

Muſtela ex griſeo ruſeſcens... Viverra Indica.

Muſtela Glauca. Mungo. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 9.*
Viverra Indica ex griſeo rufeſcens. *Raj. Syn. Quadr. p.* 198.
Klein. Quadr. p. 63.
Les Portugais l'appellent Mungo. *Raj.*
Les Zeyloniens, Mungathia. *Raj.*

A præcedente differt colore, qui ex griſeo rufeſcit. Habitat in *Indiâ.*

Il differe du précédent par ſa couleur, qui eſt un gris rouſsâtre. On le trouve dans l'*Inde.*

5. Le Furet de Java.

Muſtela ſuprà rufa, infrà dilutè flava, caudæ apice nigricante... Viverra Javanica.

Muſtela Javanica, *Koger Angan* dicta. *Klein. Quadr. p.* 64.
Muſtela Javanica. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig. T.* 48. *F.* 4. (*Fig. bona*).
Les Habitans de Java l'appellent Koger Angan. *Seba.*

Magnitudine & figurâ *Viverram noſtratem* circiter æquat : ab eâ autem colore differt. Pili caput tegentes, ſunt obſcurè ſpadicei; qui dorſum obtegunt, ſunt rufi; qui verò ventrem veſtiunt, dilutè flavi. Cauda in apicem acutum nigricantem deſinit. Habitat in *Javâ.*

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure de *notre Furet* : il en differe par ſa couleur. Les poils qui couvrent ſa tête, ſont d'un rouge-bay obſcur; ceux du dos ſont roux; & ceux du ventre d'un jaune clair. Sa queue ſe termine en une pointe noirâtre. On le trouve à *Java.*

** 6. Le Vison.

Muſtela pilis coloris ſaturatè caſtanei in toto corpore veſtita... Vison.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 15 pouces de long : ſa queue eſt longue de 7 pouces. Ses oreilles ſont très courtes, larges, & arrondies. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un marron foncé. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à M. l'*Abbé Aubry*, qui le conſerve dans ſon Cabinet.

Ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 15 circiter pollices longus eſt : cauda 7 pollices longa. Auriculas habet breviſſimas, latas, & rotundatas. In toto corpore veſtitur pilis coloris ſaturatè caſtanei. Habitat in *Canadâ*. Ex muſeo *Dom. Aubry*.

** 7. La Fouine.

Muſtela pilis in exortu albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture albo... Foyna.

Muſtela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 7.
Martes, aliis Foyna. *Raj. Syn. Quadr. p.* 200.
Martes ſaxorum, non fagorum, ſeu domeſticus. *Klein. Quadr. p. 64.*
Martes domeſtica. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 865. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 97. *Fig. p.* 98. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 332.
Jonſt. Quadr. p. 108. *Fig. T.* 64. (*Fig. bona*).
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 222.
Martes fagina. *Rzac. auct. p.* 314.
Les Italiens l'appellent Foina, *ou* Fouina. *Geſn.*
Les Allemands, Marder; Tach Marder; Huhss Marder; Stein Marder; Bůch Marder. *Geſn. Rzac.*
Les Suédois, Mård. *Linn.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'un pied 5 pouces; & celle de ſa queue de 11 pouces. Elle a les oreilles larges, & arrondies; & la

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, unius eſt pedis & 5 pollicum; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet lata & ſubrotundas; caudam lon-

gis pilis obſitam. Per univerſum corpus, excepto gutture albo, veſtitur pilis in exortu albidis, caſtaneo colore terminatis : qui caudam & 4 crura obtegunt, ex caſtaneo nigricant. Habitat in ſylvis, & circa domos.

queue couverte de longs poils. Tout le corps, excepté la gorge qui eſt blanche, eſt couvert de poils blanchâtres à leur origine, & terminez de marron : ceux qui couvrent les 4 jambes & la queue, ſont d'un marron noirâtre. On la trouve dans les bois, & auprès des maiſons.

** 8. La Marte.

Muſtela pilis in exortu ex cinereo albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture flavo... Martes.

Muſtela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. No. 7.
Muſtela Martes *Klein. Quadr. p. 64.*
Martes *Raj. Syn. Quadr. p 200.*
Aldro. Quadr. dig. viv p. 331.
Charlet. Exer. p. 20.
Martes ſylveſtris. *Geſn. Quadr. p. 867. Fig. p. 866. (Fig. bona).*
Jonſt. Quadr. p. 108.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 222.
Martes abietina. *Rzac. Auct. p. 314.*
Martis altera ſpecies nobilior. *Geſn. Icon. Quadr. p. 99.*
Les Eſpagnols l'appellent Marta. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Marta; Marturo; Martaro; *&* Martorello. *Aldro.*
Les Pelletiers Boulonnois, Martire. *Aldro.*
Les Allemands, Feld Marder; Wild Marder. *Geſn.*
Les Polonois, Kuna. *Aldro. Rzac.*
Les Suédois, Mård. *Linn.*
Les Anglois, Martin, *ou* Martlet. *Raj.*

Magnitudine & figurâ *Foynam* æmulatur; ab eâ autem differt præcipuè gutturis colore flavo. In toto reliquo corpore veſtitur pilis in exortu ex cinereo albidis, caſtaneo colore terminatis. Syl-

Elle reſſemble à la *Fouine* par ſa figure, & ſa grandeur; mais elle en differe principalement par la couleur de ſa gorge, qui eſt jaune. Tout le reſte de ſon corps eſt couvert de poils d'un gris blanchâtre à leur ori-

gine, & terminés de marron. Elle ne ſort gueres des bois. On la trouve en *Canada*, & rarement en *Europe.*

vas rariſſimè deſerit. Habitat in *Canadâ* : in *Europâ* rara.

9. La Marte Zibeline.

Muſtela obſcurè fulva, gutture cinereo... Martes Zibellina.

Muſtela Zibellina; Martes Scythica; Mus Sarmaticus; Mus Scythicus. *Klein. Quadr. p.* 64.
Muſtela Zibellina. *Raj. Syn. Quadr. p.* 201.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 6. *ſp.* 7.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 335.
Jonſt. Quadr. p. 108.
Charlet. Exer. p. 20.
Muſtela Sobella. *Geſn. Quadr. p.* 869.
Rzac. Auct. p. 317.
Muſtela Scythica. *Rzac.*
Ictis Scythica. *Rzac.*
Satherius Ariſtotelis. *Charlet.*
Cebalus Niphi. *Charlet.*
Les Allemands l'appellent Zobel. *Geſn. Rzac.*
Les Polonois & les Illyriens, Sobol. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Suédois, Sabbel. *Linn.*
Les Anglois, Sable. *Raj.*

Elle reſſemble à la *Marte*; mais elle eſt un peu plus petite. Tout ſon corps, excepté ſa gorge qui eſt griſe, eſt couvert de poils d'un fauve obſcur. La partie antérieure de ſa tête, & ſes oreilles ſont d'un gris blanchâtre. On la trouve en *Lithuanie*, dans la *Ruſſie blanche*, dans la partie Septentrionale de la *Moſcovie*, & dans la *Scandinavie.*

Martem figurâ ſuâ imitatur; ſed eâ paulò minor eſt. In toto corpore, excepto gutture cinereo, veſtitur pilis obſcurè fulvis. Capitis pars anterior, & auriculæ ſunt ex albido cinereæ. Habitat in *Lithuaniâ*, *albâ Ruſſiâ*, *Moſcoviæ* Septentrionali Regione, & *Scandinaviâ.*

** 10. Le Putois.

Muſtela pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis, veſtita, oris circumferentiâ albâ... Putorius.

Muſtela flaveſcente nigricans, ore albo, collari flaveſcente. Putorius.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 3.
Faun. Suec. Linn. N°. 8.
Muſtela fœtida. Putorius. *Klein. Quadr. p. 63.*
Putorius. *Raj. Syn. Quadr. p. 199.*
Geſn. Quadr. Fig. p. 868. (Fig. ſat bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 99. [Fig. ſat bona].
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 329. Fig. p. 330. (Fig. ſat bona).
Jonſt. Quadr. p. 107. Fig. T. 64. ſub iſto nomine, Martes. [*Fig. ſat bona*].
Charlet. Exer. p. 20.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 236.
Rzac. Auct. p. 329.
Martes domeſtica Matthioli. *Rzac.*
Les Picards l'appellent Catharet. *Geſn.*
Les Italiens, Foetta. *Geſn.* Puzolo. *Aldro.*
Les Savoyards, Pouttet. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Iltis; Ulk; Buntsing. *Geſn.*
Les Illyriens ou les Bohëmiens, Tchorz. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, Vydra. *Geſn. Aldro.* Tchorz. *Rzac.*
Les Habitans de la Province de Skone, Iller. *Linn.*
Les Anglois, Polecat, *ou* Fitchet. *Raj.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium uſque, 13 eſt pollicum; caudæ 5 ½ pollicum. Auriculas habet breves, latas & ſubrotundas. Per univerſum corpus veſtitur pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis in toto corpore, exceptis lateribus, in quibus colore dilutè caſtaneo terminantur. Tota oris circumferentia alba eſt. Habitat in ſylvis.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 13 pouces; & celle de ſa queue de 5 ½ pouces. Il a les oreilles courtes, larges & arrondies. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un gris blanchâtre à leur origine, & terminés de noirâtre par tout le corps, exceptés aux côtés, où ils ſont terminés de marron clair. Tout le tour de ſa bouche eſt blanc. On le trouve dans les bois.

11. Le Putois rayé.

Muſtela nigra, tæniis in dorſo albis... PUTORIUS STRIATUS.

Muſtela Americana fœtida. *Klein. Quadr. p. 64.*
Putois. *Cat. Tom. II. Fig. p. 62.* [*Fig. tres bonne*].

Il eſt à peu-près de la grandeur du précédent ; mais il a le muſeau un peu plus long. Il eſt noir, avec 5 bandes blanches ſur le dos, dont une s'étend depuis le derriere de la tête, tout le long du milieu du dos juſqu'à la queue, & deux autres de chaque côté, qui luy ſont paralleles. On le trouve dans tout le *Continent Septentrional d'Amérique.*

Præcedentem magnitudine circiter adæquat ; ſed roſtro longiore donatur. Pilis veſtitur nigris, tæniis 5 in dorſo albis, quarum media à cervice, in medio dorſo, ad caudam uſque decurrit, duabus utrinque aliis mediæ parallelis. Habitat in omni *Americæ Septentrionali Regione.*

** 12 L'Ichneumon ou la Mangouste : *Vulgairement* le Rat de Pharaon.

Muſtela pilis ex albido & nigricante variegatis, veſtita... ICHNEUMON : MUS PHARAONIS VULGÒ.

Muſtela Ægyptiaca. Ichneumon, i. e. Inveſtigator. Mus Pharaonis ; Mus Ægypti ; Damula ; Donola ; Muſtela Ægypti peculiaris ; Lutra Ægypti. *Klein. Quadr. p. 64.*
Meles unguibus uniformibus leucophæa. Ichneumon. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 10. ſp. 3.*
Ichneumon. *Raj. Syn. Quadr. p. 202.*
Geſn. Quadr. Fig. p. 635. [*Fig. mala*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 102. [*Fig. malis*].
Jonſt. Quadr. p. 105. Fig. T. 67. (*Fig. mala*)
Charlet. Exer. p. 19.
Bell. de Aquat. p. 44. Fig. p. 45. (*Fig. mala*).
Bell. obſ. Fig. p. 96. (*Fig. mala*).
Ichneumon, ſive Lutra Ægypti. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 298. Fig. p. 301.* [*Fig. mala*].
Ichneumon, ſeu Mus Pharaonis. *Proſp. Alp. Ægypt. p. 234. Fig. T. 14. F. 3.* (*Fig. mala*).
Ichneumon. *Kolbe. Tom. III. p. 52. Fig. p. 4.* (*Fig. mauv.*)

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium uſque, 1 eſt pedis cum 9 pollicibus; caudæ 1 ½ pedis. Anteriora crura, à ventre ad apicem unguium, 5 circiter pollices longa ſunt; poſteriora verò paulò longiora. Auriculas habet breviſſimas, latas, & ſubrotundas; caudam in exortu craſſam, in acumen deſinentem. In toto corpore, excepto ventre ex rufo flavicante, veſtitur pilis, ab exortu ad apicem uſque, ex albido & nigricante variegatis. Habitat in *Ægyptô.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'un pied 9 pouces; & celle de ſa queue de 1 ½ pied. Ses jambes de devant ont environ 5 pouces de long, depuis le ventre juſqu'au bout des ongles; & celles de derriere ſont un peu plus longues. Il a les oreilles très courtes, larges & arrondies; la queue groſſe à ſon origine, & finiſſant en pointe. Tout ſon corps, excepté le ventre, qui eſt d'un roux jaunâtre, eſt couvert de poils variés, depuis leur origine juſqu'à leur extrémité, de noirâtre & de blanchâtre. On le trouve en *Egypte.*

Alia eſt *Ichneumonis* ſpecies, ab iſtâ diſcrepans magnitudine tantùm quâ ei cedit: ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, 13 tantùm pollices longa eſt; & caudæ longitudo 9 pollices æquat. Ex muſeo *Realmurian o.*

Il y en a une ſeconde eſpece, qui ne differe de celle-ci que parce qu'elle eſt beaucoup plus petite: elle n'a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, que 13 pouces de long, & ſa queue 9 pouces. Elle eſt dans le Cabinet de M. *de Reaumur.*

Ichneumon cujus *Seba* deſcriptionem dedit *Vol. I. p.* 66. & figuram *T.* 41. *Fig.* 1. idem cum iſto eſſe videtur. Deſcriptio quam hujus dedit, iſti ſat benè convenit, & figura eum perfectè repræſentat. A *Ceylonenſi Inſulâ* ad eum vivus miſſus eſt.

L'Ichneumon que *Seba* a décrit *Tom. I. p. 66.* & dont il a donné la figure *Pl. 41. Fig. 1.* reſſemble beaucoup à celui-ci. La deſcription luy convient aſſez, & la figure encore mieux. On le luy a envoyé vivant de l'*Iſle de Ceylan.*

** 13. La Genette.

Muſtela caudâ ex annulis alternatim albidis & nigris variegatâ. Genetta.

Muſtela caudâ annulis nigris albidiſque cinctâ. Genetta. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp.* 8.
Genetta, vel Ginetta. *Raj. Syn. Quadr. p.* 201.
Coati, Ginetta Hiſpanis. *Klein. Quadr. p.* 73.
Genetta. *Geſn. Quadr. p.* 619. *Pellis Fig. p.* 1102. [*Fig. bona*].
Geſn. Icon. Quadr. p. 70. *Fig. p.* 71. (*Fig. ſat bona*). *Pellis ibi Fig.* (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 337. *Fig. p.* 339. [*Fig. ſat bona*].
Jonſt. Quadr. p. 109. *Fig. T.* 72. (*Fig. ſat bona*).
Bell. obſ. Fig. p. 76. (*Fig. ſat bona*).
Genetta; Catus Hiſpaniæ, & Genethocatus. *Charlet. Exer. p.* 20.
Les Allemands l'appellent Genithkatz. *Geſn.*
Les Suédois, Desmanskatt. *Linn.*

Elle eſt à peu-près de la grandeur d'un *Chat*; mais elle a le corps plus effilé. Son muſeau eſt allongé, & très pointu: ſes oreilles reſſemblent à celles du *Chat*. Tout ſon corps eſt couvert de poils variés de brun & de blanchâtre, avec des taches noires par tout le corps, exceptés à la tête & aux jambes. Sa queue eſt garnie d'anneaux alternativement noirs & blanchâtres. On la trouve en *Eſpagne*, & en *Turquie*.

Magnitudine *Felem domeſticam* circiter æquat; ſed corpore graciliori donatur. Roſtrum habet elongatum & acutiſſimum; auriculas auriculis *Felinis* ſimiles. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex fuſco & albido variegatis, maculis nigris in toto corpore, exceptis cruribus & capite, diſperſis. Cauda annulis alternatim albidis & nigris cingitur. Habitat in *Hiſpaniâ*, & *Turcicâ*.

XXXVII.

Le Genre du Blaireau.

Son caractere eſt

D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire;

XXXVII.

Genus Melis.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex;

Digiti unguiculati in ſingulis pedibus quinque,
Omnes à ſe invicem ſeparati:
Pollex aliis digitis proximus.

A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres :
Le pouce proche des autres doigts.

** 1. LE BLAIREAU, OU TAISSON.

Meles pilis ex ſordidè albo & nigro variegatis veſtita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegato... MELES.

Meles unguibus anticis longiſſimis. Taxus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 10. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. No. 15.
Taxus, ſive Meles. *Raj. Syn. Quadr. p.* 185.
Meles. *Geſn. Quadr. p.* 778. *Fig. p.* 1103. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 86. (*Fig. bona*).
Rzac. Auct. p. 315.
Taxus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 263. *Fig. p.* 266. (*Fig. mala*).
Jonſt. Quadr. p. 101. *Fig. T.* 64. [*Fig. bona*].
Charlet. Exer. *p.* 18.
Melis, ſive Taxo; Taxus; Taſſus; Blerellus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 233.
Melis ſeu Taxus; Blerellus. *Rzac. Auct. p.* 327.
Coati caudâ brevi; Taxus; Meles. Coati griſeus. *Klein. Quadr. p.* 73.
Les Grecs l'appellent Μελίς.
Les Eſpagnols, TASUGO; TEXON. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, TASSO. *Geſn. Aldro.*
Les Griſons, TASCH. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, TACHS, *ou* DAR. *Geſn. Aldro.* DACHS. *Rzac.*
Les Illyriens, GEZWECZ. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, JAZWIEC; BORSUK; KOT-DZIKI; ZBIK. *Rzac.*
Les Suédois, GRÄF-SVIN. *Linn.*
Les Anglois, BADGER; BROCK, *ou* GRAY. *Raj. Geſn.*
Les Anglois Septentrionaux, PATE. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 2 ½ circiter eſt pedum; caudæ 10 pollicum. Oculos habet parvos pro ratione corporis; auriculas breves, partìm albas, partìm nigras; crura breviſſima; un-

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, eſt d'environ 2 ½ pieds; & celle de ſa queue de 10 pouces. Ses yeux ſont petits; ſes oreilles courtes, partie blanches, & partie noires; ſes jambes très courtes; ſes ongles noirs : ceux

des pieds de devant ſont très longs & forts. Il a immédiatement audeſſous de l'origine de la queue, & audeſſus de l'anus, un large orifice, qui s'ouvre comme une eſpece de petit ſac, peu profond, & qui a la figure d'une petite bourſe : de la ſuperficie intérieure de cette bourſe ſuinte, mais en petite quantité, une ſubſtance blanche, qui a une certaine conſiſtance, & à laquelle je n'ai trouvé aucune odeur particuliere. Tout ſon corps eſt couvert de poils rudes au toucher : ceux qui couvrent la partie ſupérieure du corps, & la queue, ſont d'un blanc ſale à leur origine, & variés de noir & de ce même blanc ſale dans le reſte de leur longueur : ceux qui couvrent la partie inférieure du corps, les 4 jambes, & les 4 pieds ſont noirs. Sa tête eſt variée de larges bandes longitudinales alternativement blanches & noires ; ſçavoir une bande blanche, qui s'étend depuis le nez juſqu'à l'occiput ; audeſſous de celle là, de chaque côté eſt une bande noire, qui s'étend depuis les narines juſqu'au delà des oreilles, en paſſant par les yeux ; & encore audeſſous de ces dernieres eſt une bande blanche de chaque côté, qui s'étend dans toute la longueur des jouës. On le trouve dans les bois.

gues pedum anteriorum longiſſimos & validos, pedum poſteriorum breves, omnes nigros. Statim ſub caudæ exortu, ſuprà anum, latum habet orificium, quod in folliculum aperitur, non admodùm profundum, burſæ aut ſacculi figurâ, ex cujus ſuperficie internâ exſudat, parvâ quidem quantitate, ſubſtantia quædam alba, quâdam conſiſtentiâ prædita, in quâ nullum inſignem odorem reperi. In toto corpore veſtitur pilis ad tactum rigidis : qui partem corporis ſuperiorem obtegunt, ſunt in exortu ſordidè albi, & in reliquâ longitudine ex nigro & ſordidè albo variegati : qui verò partem corporis inferiorem, 4 crura & pedes cooperiunt, ſunt nigri. Caput tæniis latis longitudinalibus alternatìm albis & nigris variegatur ; à naſo ſcilicet ad occipitium uſque, tænia protenditur alba ; infrà eam utrinque, à naribus, per oculos, nigra ultrà auriculas tænia producitur : deindè iterùm inferiùs adhuc utrinque tænia eſt alba, ſecundum genarum longitudinem protenſa. Habitat in ſylvis.

** 2. LE BLAIREAU BLANC.

Meles ſuprà alba, infrà ex albo flavicans... MELES ALBA.

Ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 1 pede cum 9 pollicibus longa eſt. Oculos habet parvos, pro ratione corporis; auriculas breves; crura breviſſima; ungues albos. Per univerſum corpus veſtitur pilis denſiſſimis, in parte corporis ſuperiore albis, in inferiore autem ex albo flavicantibus. Habitat in *Eboraco novo*. Ex muſeo *Realmuriano*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 1 pied 9 pouces de long : ſa queue eſt longue de 9 pouces. Ses yeux ſont petits, à proportion de la grandeur de ſon corps; ſes oreilles courtes ; ſes jambes très courtes ; ſes ongles blancs. Tout ſon corps eſt couvert de poils très épais, blancs dans toute la partie ſupérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. On le trouve dans la *Nouvelle Yorck*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

3. LE BLAIREAU DE SURINAM.

Meles ex ſaturatè ſpadiceo nigricans, caudâ fuſcâ, annulis flavicantibus quaſi cinctâ... MELES SURINAMENSIS.

Ichneumon de Yzquiepatl, ſeu Vulpecula Americana, quæ colore Maizium torrefactum æmulatur. *Seb. vol. I. p.* 68. *Fig. T.* 42. *F.* 1. [*Fig. bona*].
Yzquiepatl, ſeu Vulpecula, quæ Maizium torrefactum colore æmulatur; Hernandezii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 181.
Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 332. (*Fig. non æquè bona*).
Coati Hernandezii. *Klein. Quadr. p.* 72.
Vulpes Indica, *Izquiepotl* dicta. *Jonſt. Quadr. p.* 94.
Les Americains l'appellent QUASJE. *Seba.*

Corporis longitudo 1 ½ circiter eſt pedis. Breves habet auriculas; ſinciput rotundum; roſtrum elongatum; crura brevia; ungues nigros, longos & incurvos. In toto corpore,

La longueur de ſon corps eſt d'environ 1 ½ pied. Il a les oreilles courtes ; le devant de la tête rond ; le muſeau allongé ; les jambes courtes ; les ongles noirs, longs & recourbés. Tout ſon

corps, excepté ſon ventre, qui eſt jaune, eſt couvert de poils d'un marron foncé & noirâtre: la couleur du devant de la tête eſt moins foncée que celle du dos. Sa queue, qui eſt de la longueur de ſon corps, eſt brune, & comme annelée de jaunâtre. On le trouve dans la *Nouvelle Eſpagne*, & à *Surinam*.

Hernandez dit qu'il y en a deux autres eſpeces; l'une appellée *Yzquiepatl*, qui differe du précédent par pluſieurs bandes blanches qu'il a ſur le dos; & l'autre appellée *Conepatl*, qui en differe par une ſeule bande blanche qu'il a de chaque côté, & qui s'étend auſſi ſur la queue.

excepto ventre flaveſcente, veſtitur pilis ex ſaturatè ſpadiceo nigricantibus: ſincipitis color colore dorſi paulò dilutior eſt. Cauda, quæ corporis longitudinem adæquat, fuſca eſt, annuliſque flavicantibus quaſi cincta. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ*, & *Surinamenſi Inſulâ*.

Hernandez alias duas ſpecies refert; quarum una *Yzquiepatl* vocata, à præcedente differt faſciis multis in dorſo candentibus; altera verò *Conepatl* vocata, ab eâ diſcrepans, unicâ tantùm, utrinque ductâ, candente faſciâ, perque caudam ipſam eodem modo delatâ.

4. La Civette.

Meles faſciis & maculis albis, nigris, & rufeſcentibus variegata... Civetta.

Meles unguibus uniformibus cinerea. Zibethica. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 10. ſp. 2.*
Coati, Civetta vulgò. *Klein. Quadr. p. 73.*
Animal Zibethicum. *Raj. Syn. Quadr. p. 178.*
Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 580. & 581. (Fig. ſat bonis).
Animal Zibethi. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 340. Fig. p. 343. [Fig. ſat bona].*
Jonſt. Quadr. p. 109. Fig. T. 72. (Fig. ſat bona).
Charlet. Exer. p. 20.
Felis Zibethi. *Geſn. Quadr. Fig. p. 948. (Fig. ſat bona).*
Catus aut Felis Zibethi. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 72. & 126. [Fig. ſat bonis].*
Catus Zibethicus Scaligeri. *Jonſt. Charlet.*
Hyæna odorifera Zibethum gignens, quæ Civetta vulgò. *Jonſt. Quadr. p. 151. Fig. T. 73. (Fig. ſat bona).*
Hyæna veteribus nuncupata, nunc autem Civetta. *Bell. Obſ. Fig. p. 94. (Fig. ſat bona).*

Civette,

Civette. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 159. *Fig. Pl.* 23. [*Fig. très bonne*].

Les Suédois l'appellent ZIBET. *Linn.*

Les Anglois, CIVET CAT. *Raj.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 2 eſt pedum & 5 pollicum. Caput habet ſtrictum; roſtrum elongatum; oculos parvos, longos & nigros; auriculas auricularum *Felinarum* circiter æmulas, ſed minores & obtuſiores; crura breviſſima, anteriora præſertim, quæ à ventre ad unguium apicem uſque 5 tantùm pollices longa ſunt; ungues nigros, rectos & obtuſos. Caput & crura pilis brevibus obſita ſunt: in reliquo corpore veſtitur pilis duorum generum; alii enim ſunt breves, molles, *lanæ* inſtar criſpi, & ex cinereo fuſci; alii multò longiores, ex albo, nigro, & ruſeſcente variegati: unde fit ut corporis pars ſuperior faſciis & maculis magnitudine inæqualibus, aliis albis, aliis nigris, aliis ruſeſcentibus variegata videatur. Naſi extremitas eſt nigra; roſtrum album. In quolibet capitis latere maxima eſt macula nigra, in quâ oculus ſitus eſt. Pili partem capitis ſuperiorem tegentes, ex albo & nigro variegati ſunt: unde pars iſta griſea apparet. Auriculæ

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 pieds 5 pouces. Elle a la tête étroite; le muſeau long; les yeux petits, noirs & longs; les oreilles à peu-près ſemblables à celles des *Chats*, mais moins pointuës, & plus petites; les jambes très courtes, ſurtout celles de devant, qui n'ont que 5 pouces depuis le ventre juſqu'au bout des ongles, leſquels ſont noirs, droits & obtus. Sa tête & ſes jambes ſont couvertes de poils courts: tout le reſte de ſon corps eſt couvert de deux ſortes de poils; l'un court, doux, friſé comme de la *laine*, & d'un gris brun; & l'autre beaucoup plus long, & varié de blanc, de noir, & de rouſsâtre: de là vient que le deſſus du corps de l'animal paroît varié de bandes & de taches de différentes grandeurs, les unes blanches, les autres noires, & les autres rouſsâtres. Le bout du nez eſt noir, & le muſeau blanc. Il y a deux grandes taches noires, une de chaque côté de la tête, dans leſquelles ſont les yeux. Le deſſus de la tête paroît gris, par le meſlange du blanc & du noir, dont chaque poil eſt varié. Les oreil-

les ſont noires en dehors & bordées de blanc, & garnies en dedans d'un long poil blanc. La gorge, le ventre, & les 4 pieds ſont noirs. La queue eſt noire par deſſus, & mêlée d'un peu de blanc par deſſous. L'ouverture qui conduit aux receptacles, où s'amaſſe la matiere odorante, eſt immédiatement audeſſous de l'anus, & a 3 pouces de long; & lorſqu'on la dilate, elle a plus de 1 ½ pouce de large. Les ſacs qui ſervent à la ſécrétion de cette matiere odorante, ſont très bien décrits dans *les Mem. de l'Académie*, à l'endroit cité cydeſſus. On la trouve à la *Chine*, & dans la *Nouvelle Eſpagne*.

extùs nigræ, albo circumdatæ, intùs longis pilis albis obſitæ ſunt: guttur, venter, & pedes 4 nigri. Cauda in parte ſuperiore eſt nigra, in inferiore verò ex albo variegata. Statim infrà anum orificium habet 3 pollices longum, cumque dilatatur 1 ½ pollice & ampliùs latum: quod orificium in receptacula, in quibus colligitur ſubſtantia quædam odorata, conducit. Optimam vide folliculorum, hujus ſubſtantiæ odoratæ ſecretioni inſervientium, deſcriptionem, apud *Academicos Pariſienſes*, loco ſuprà citato. Habitat in *Sinenſi Regione*, & *Novâ Hiſpaniâ*.

XXXVIII.

Le Genre de l'Ours.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres:
De s'appuyer ſur le talon en marchant.

XXXVIII.

Genus Urſinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex:
Digiti unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati:
Pedes calcaneis incedentes.

** 1. L'Ours.

Urſus niger, caudâ unicolore... Ursus.

Urſus caudâ abruptâ. Urſus vulgò. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 4. ſp.* 1.
*Faun Suec. Linn. N*o. 2.
Urſus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 171.
Klein. Quadr p. 82.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1065. (*Fig. ſat bona*).

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 65. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 117. *Fig. p.* 119. (*Fig. ut ſuprà*).
Jonſt. Quadr. p. 86. *Fig. T.* 55. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 14.
Muſ. Worm. p. 318.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 225.
Rzac. Auct. p. 321.
Ours. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 83, *Fig. Pl.* 9. (*Fig. très bonne, excepté le nez qui eſt trop court*).
Les Hébreux l'appellent DOB. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, DUBA. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes, DUBBE. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Ἄρκτος.
Les Italiens, & les Eſpagnols, ORSO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, BÄR, *ou* BEER. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Bohëmiens, NEDWED. *Geſn.*
Les Polonois, WEWER. *Geſn.* NIEDZWIEDZ. *Rzac. Klein.*
Les Suédois, BIÖRN. *Linn.*
Les Anglois, BEAR. *Raj. Geſn.*

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, 5 ½ pedum eſt; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pedis & 5 pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet, pro mole corporis, valdè exiguos; auriculas ſat breves, verſùs apicem rotundatas; crura brevia; in ſingulis pedibus digitos 5 validis, incurvis, & nigris unguibus munitos; pollice minimo, & ab aliis digitis non remoto. In toto corpore veſtitur pilis longis & denſis, in aliquibus nigris, in aliis ex fuſco nigricantibus, & in aliis ex nigro & argenteo mixtis. Habitat in *Alpibus*, inque *Germaniâ*, *Poloniâ*, *Lithuaniâ*, *Ruſſiâ*, *Moſcoviâ*, *Nor-*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 5 ½ pieds; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 1 pied 5 pouces; & celle de ſa queue de 5 pouces. Ses yeux ſont très petits, à proportion de la grandeur de ſon corps; ſes oreilles aſſez courtes & arrondies vers le bout; ſes jambes courtes. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles forts, crochus, & noirs: le pouce eſt le plus petit, & n'eſt point ſéparé des autres doigts. Tout ſon corps eſt couvert de poils longs & épais, noirs dans quelques uns, dans d'autres d'un brun noirâtre, & dans d'autres mêlés de noir & d'argentré. On le trouve dans les *Alpes*, en *Allemagne*,

en *Pologne*, en *Lithuanie*, en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, en *Norvege*, & dans tous les Pays du *Nord*.

vegiâ, & in omnibus *Septentrionalibus* Regionibus.

** 2. L'Ours blanc.

Urſus albus, caudâ unicolore... Ursus albus.

Urſus albus Martenſii. *Klein. Quadr. p.* 82.
Urſus albus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 120.
Jonſt. Quadr. p. 88.
Muſ. Worm. p. 319.
Ours blanc. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 47.
Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p. 56. *Fig. Tom. II. p.* 24. (*Fig. bonne*).

Il differe du précédent par ſa tête qui eſt plus longue, par ſon col qui eſt beaucoup plus mince, & par ſa couleur qui eſt blanche. On le trouve dans le *Nord*.

A præcedente differt capite longiore, collo multò graciliore, & colore, qui albus eſt. Habitat in *Septentrionalibus* Regionibus.

3. L'Ours de la Baye de Hudson.

Urſus caſtanei coloris, caudâ unicolore, roſtro pedibuſque nigris... Ursus Freti Hudsonis.

Coati Urſulo affinis Americanus. *Klein. Quadr. p.* 74.
Petit Ours, ou Louveteau. *Edwars. Tom. II. Fig. p.* 103. (*Fig. bonne*).
Quickhatch, ou Wolverenne. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. Fig. p.* 58. (*Fig. bonne*).
Quickhatch. *Cat. App. p.* 29.

Il eſt un peu plus grand qu'un *Loup ordinaire*. Ses yeux ſont petits & noirs; ſes oreilles courtes & rondes : ſa queue eſt d'une longueur médiocre, & paroît plus petite à ſon origine que vers ſon bout, où elle eſt couverte de plus longs poils. Il a le muſeau & les 4 pieds noirs; le devant de la tête blanchâtre;

Magnitudine *Lupum vulgarem* paululùm ſuperat. Oculos habet parvos & nigros; auriculas breves & rotundas; caudam mediocris longitudinis, in exortu tenuiorem quàm versùs extremitatem, in quâ longioribus pilis obſita eſt. Roſtrum & pedes 4 ſunt nigri; ſinciput albidum; gut-

tur album, maculis nigris variegatum; reliquum corpus caſtanei coloris, in dorſo ſaturatioris. Habitat in *Freto Hudſonis.*

la gorge blanche, marquée de noir : tout le reſte de ſon corps eſt d'un châtain plus foncé ſur le dos qu'ailleurs. On le trouve à la *Baye de Hudſon.*

** 4. Le Coati.

Urſus caudâ annulatim variegatâ... Coati.

Urſus caudâ elongatâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 4. ſp. 2.*
Vulpi affinis Americana *Raj. Syn. Quadr. p.* 179.
Sloane. Vol. II. p. 329.
Coati Braſilienſium. *Klein. Quadr. p.* 72.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 228. [*Fig. ſat bona*].
Coati. *Jonſt. Quadr. p.* 95.
Muſ. Worm Fig p. 319. (*Fig. optima*).
Cuati. *Jo. de Laët. p.* 553.
Vulpes Americana, *Mapach* dicta. *Charlet. Exer. p.* 15.
Mapach. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 74. [*Fig. ſat bona exceptis pedibus*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 175. (*Fig. eadem ut ſuprà*).
Mapach, ſeu Animal cuncta prætentans manibus. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 1.
Coati ſimplement dit. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 23.
Raccoon. *Cat. App. p.* 29.
Les Indiens l'appellent Mapach. *Euſ. Nieremb.*
Les Guianois, Quachy. *Barr.*

Longitudine corporis *Felem* circiter adæquat; craſſitie verò eam multùm ſuperat. Caput habet latum; roſtrum acuminatum; maxillam inferiorem ſuperiore breviorem; oculos exiguos; auriculas breves & ſubrotundas; crura brevia; in ſingulis pedibus digitos quinque ſat longos, acutis unguibus munitos; pedes poſteriores anterioribus majores; plantam pedum pilis omninò deſtitutam. In totò corpore, exceptis quatuor

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Chat*; mais il a le corps beaucoup plus gros. Il a la tête large; le muſeau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la ſupérieure; les yeux petits; les oreilles courtes & arrondies; les jambes courtes; à chaque pied cinq doigts aſſez longs, armés d'ongles aigus. Ses pieds de derriere ſont plus grands que ceux de devant. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps, exceptés ſes quatre pieds, qui

ſont couverts de poils courts, eſt couvert de poils longs & épais, gris & terminés de noir ſur le dos, & roux & terminés de gris ſur le ventre. Son muſeau eſt d'un blanc ſale, excepté une bande tranſverſale noire, qui paſſe par les yeux. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de blanc jaunâtre. (Il y en a dont tout le poil eſt d'un roux brun : ils ont auſſi la queue annelée). Ses pieds de devant luy ſervent de mains; ſoit qu'il s'en ſerve, comme les *Chiens*, pour tenir ce qu'il mange; ſoit pour le porter à ſa bouche, comme l'*Ours*. On le trouve en *Amérique*.

pedibus pilis brevibus tectis; veſtitur pilis longis & denſis, cinereis apice nigro in dorſo, in ventre verò in exortu rufis in exitu cinereis. Facies ei ſordidè albicat, excepta areola tranſverſa nigra, per oculos ducta. Cauda annulis cingitur alternatim nigris & ex albo flavicantibus. (Sunt qui in toto corpore veſtiuntur pilis ex rufo fuſcis : cauda ipſorum annulatim etiam variegatur.) Pedibus anterioribus velut manibus utitur; ſive, more *Canis*, anterioribus pedibus teneat cibum; ſive, ſicut *Urſus*, cibum ori admoveat. Habitat in *Americâ*.

** 5. Le Coati-Mondi.

Urſus naſo producto & mobili, caudâ unicolore... Coati-Mondi.

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 15 pouces; & celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, d'environ 6 pouces. Il a le nez fort long, & mobile comme celuy d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la ſupérieure; les oreilles courtes & rondes; à chaque pied 5 doigts armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds de

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 15 circiter eſt pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 6 circiter pollicum. Naſum habet longiſſimum, naſi *Porcini* inſtar mobile; maxillam inferiorem ſuperiore multò breviorem; auriculas breves & rotundas; in ſingulis pedibus digitos 5 nigris, longis & incurvis unguibus munitos. Pedum anteriorum digiti digi-

tis pedum poſteriorum paulò ſunt longiores: plantæ pedum pilis omninò denudatæ. In toto corpore veſtitur pilis brevibus ex cinereo fuſcis. Pili caudæ ejuſdem ſunt coloris. Apud D. *Liévre* Diſtillatorem hoc Animal vidi.

devant ſont un peu plus longs que ceux de derriere. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, d'un gris brun : ceux de ſa queue ſont de la même couleur. Je l'ai vû chez M. *Lievre* Diſtillateur.

** 6. Le Coati-Mondi a queue annelée.

Urſus naſo producto & mobili, caudâ annulatim variegatâ.

Vulpes minor roſtro ſuperiori longiuſculo, caudâ annulatim ex nigro & rufo variegatâ. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. p.* 167.
Coati Mondi Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 180.
Klein. Quadr. p. 72.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 228.
Taxus Suillus. *Aldrov. Quadr. dig. viv. Fig. p.* 267. (*Fig. ſat bonâ.*)
Coati Mondi. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 17. *Fig. Pl.* 37. (*Fig. très bonne.*)

Longitudo corporis, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 16 eſt pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 6 ½ pollicum. Caudam habet toto corpore longiorem; naſum longiſſimum, naſi *Porcini* inſtar mobile; maxillam inferiorem ſuperiore multò breviorem; oculos valdè exiguos; auriculas rotundas, extùs pilis breviſſimis veſtitas, intùs verò pilis longis & albidis obſitas; in ſingulis pedibus digitos 5 nigris, longis & incurvis unguibus munitos; pedum anteriorum digitos digitis poſteriorum pedum paulò lon-

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 16 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 6 ½ pouces. Sa queue eſt plus longue que tout ſon corps. Il a le nez fort long, & mobile comme celuy d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la ſupérieure; les yeux très petits; les oreilles rondes, & garnies en dehors de poils fort courts, & en dedans de poils plus longs & blanchâtres; 5 doigts à chaque pied, armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds de devant ſont un peu plus longs

que ceux de derriere. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, variés de roux & de noir dans la partie ſupérieure du corps, & tout à fait roux dans la partie inférieure. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de roux. On le trouve en *Amérique*.

giores; plantam pedum pilis omninò denudatam. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, in parte corporis ſuperiore ex rufo & nigro variegatis, in inferiore verò omninò rufis. Cauda ex rufo & nigro annulatìm variegatur. Habitat in *Americâ*.

XXXIX.

Le Genre du Chat.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
Les doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres :
Les ongles crochus, & qui peuvent être retirés & cachés entierement.

Obſ. Toutes les eſpeces de ce Genre ont la tête ronde; le muſeau court; & la langue garnie de pointes, qui la rendent fort rude au toucher. Toutes auſſi, exceptés les deux dernieres, ont la queue très longue.

XXXIX.

Genus Felinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :
Digiti unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati :
Ungues hamati, & retractiles.

Obſ. Omnes hujus generis ſpecies capite rotundo; roſtro brevi; & linguâ aculeis ſcabrâ donantur. Omnes etiam, exceptis duabus ultimis, caudâ longiſſimâ gaudent.

** 1. Le Chat Domestique.

Felis domestica.

Felis caudâ elongatâ, auribus æqualibus. Catus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 5. *ſp.* 6.
Faun. Suec. Linn. N° 3.
Catus Domeſticus; Felis Domeſtica. *Klein. Quadr. p.* 75.
Felis Domeſtica, ſeu Catus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 170.
Sloane. Vol. II. p. 329.
Felis, ſeu Catus Domeſticus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 244.
Felis Domeſtica. *Jonſt. Quadr. p.* 126. *Fig. T.* 72. (*Fig. bona.*)

Charlet.

Charlet. Exer. p. 20.
Feles, vel Catus. *Geſn. Quadr. p.* 344. *Fig. p.* 345. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 28. (*Fig. bona.*)
Felis. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 564.
Les Hebreux l'appellent CATUL, & SCHANAR, *ou* SCHUNARA. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Αἴλȣρος.
Les Saraſins, KATT. *Geſn.*
Les Eſpagnols, GATO, *ou* GATA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, GATTA, *ou* GATTO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, KATZ. *Geſn.*
Les Illyriens, KOCZKA. *Geſn.*
Les Polonois, KOC. *Rzac.*
Les Suédois, KATTA. *Linn.*
Les Anglois, CAT. *Raj. Geſn. Aldro.*

Felis eſt animal omnibus ità notum, ut deſcriptione non indigeat.

Le Chat eſt un animal trop connu pour qu'il ſoit néceſſaire de le décrire.

** 2. LE CHAT SAUVAGE.

Felis pilis ex fuſco, flavicante, & albido variegatis veſtita; caudâ annulis alternatim nigris & ex ſordidè albo flavicantibus cincta.... FELIS SYLVESTRIS.

Catus ſylveſtris ferus, vel feralis; Eques arborum. *Klein. Quadr. p.* 75.
Catus ſylveſtris. *Geſn. Quadr. p.* 353.
Geſn. Icon. Quadr. p. 97.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 217.
Felis ſylveſtris. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 582. *Fig. p.* 583. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 127. *Fig. T.* 72. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 21.
Eques arborum, Germanis. *Geſn. Aldro.*
Les Hebreux l'appellent ZIIM. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, GATO MONTÉS. *Geſn.*
Les Allemands, WILDE KATZE, *Rzac.*
Les Polonois, KOT DZIKI; ZBIK. *Rzac.*

Figurâ ſuâ *Felem domeſticam* æmulatur; ſed magnitudine eam paululùm antecellit. In pedibus anterioribus 5 digitis donatur, in poſterioribus verò 4 tantùm : pollex,

Il reſſemble par ſa figure au *Chat domeſtique*; mais il eſt un peu plus grand. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux derriere : le pouce, dans les pieds de devant, eſt éloigné des

autres doigts, & articulé plus haut. Tout ſon corps eſt couvert de poils variés de brun, de jaunâtre, & de blanchâtre : le brun domine ſur le dos, & le blanchâtre ſous le ventre. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de blanc ſale & jaunâtre, & eſt terminée de noir. On le trouve dans les forêts.

in anticis pedibus, ab aliis digitis eſt remotus, & altiùs collocatus. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex fuſco, flavicante, & albido variegatis : dorſum fuſcius eſt ; venter verò magis albidus. Cauda annulis alternatìm nigris & ex ſordidè albo flavicantibus cingitur, nigroque colore terminatur. Habitat in ſylvis.

3. Le Chat sauvage tigré.

Felis ex griſeo flaveſcens, maculis nigris variegata... Felis sylvestris tigrina.

Felis ſylveſtris tigrinus, ex Hiſpaniolâ. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig.* T. 48. *F.* 2. (*Fig. bona*).
Feles fera tigrina. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 153.
Catus *Tepe Maxtlaton* dictus, Tigrinus, ex Hiſpaniolâ. *Klein. Quadr. p.* 75.
Tepe Maxtlaton. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 9.
Maraguao, ſive Maracaia. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 233.
Chat-Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 50.
Les Eſpagnols l'appellent Tepe Maxtlaton. *Seba.*
Les François de la Guiane, Chat-Tigre. *Barr.*
Les Guianois, Malakaya. *Barr.*

Il eſt de la grandeur du *Chat domeſtique*. Il a les yeux grands & noirs ; les oreilles courtes & arrondies ; la queue longue & pointuë. Tout ſon corps eſt d'un gris jaunâtre, marqué de taches noires. On le trouve au *Cap de Bonne Eſpérance*, & en *Amérique*.

Magnitudine *Felem domeſticam* adæquat. Ingentes habet & nigros oculos ; auriculas breves & ſubrotundas ; caudam longam & acutam. Color totius corporis eſt ex griſeo flavicans, maculis nigris inſperſis. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, & *Americâ*.

** 4. Le Chat d'Angora.

Felis pilis longiſſimis toto corpore veſtita... Felis Angorensis.

Felis caudâ elongatâ, auribus penicilliformibus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 5. ſp. 5.*

Figurâ ſuâ *Felem domeſticam* imitatur : ab ea autem differt pilis longiſſimis, quibus corpus veſtitur. Habitat in *Angorâ.*

Il reſſemble au *Chat domeſtique* par ſa figure : il en differe ſeulement par ſes poils qui ſont tres longs. On le trouve à *Angora.*

** 5. LE LION.

Felis caudâ in floccum deſinente... LEO.

Felis caudâ elongatâ, floccosâ, thorace jubato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 5. ſp. 1.*

Leo. *Raj. Syn. Quadr. p.* 162.
Klein. Quadr. p. 81.
Geſn. Quadr. Fig. p. 642. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 66. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 2. *Fœm. Fig. p.* 6. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 78. *Fig. T.* 50. & 51. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 14.
Muſ. Worm. p. 317.
Bont. Ind. ori. p. 55.

Lion. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. Le Mâle p.* 3. *Fig. Pl.* 1. *La Femelle p.* 19. *Fig. Pl.* 3. (*Fig. très bonnes*).
Kolbe. Tom. III. p. 2. *Fig. p.* 4. *F.* 1. & 2. (*Fig. bonnes*).

Les François appellent le mâle LION ; *& la femelle*, LIONNE.
Les Latins, le mâle, LEO ; *& la femelle*, LEÆNA.
Les Hebreux, LABI ; LAISCH ; ARI ; ARIECH ; GUR ; *&* KEPHIR. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, ARIAVAN. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Λέων.
Les Arabes, ASAD. *Geſn. Aldro.*
Les Perſes, GEHAD. *Geſn. Aldro.*
Les Saraſins, SEBEY. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, LEON. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, LEONE. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands & les Illyriens, LEW. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, LEYON. *Linn.*
Les Anglois, LION. *Raj. Geſn. Aldro.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, 7 ½ pedes æquat; altitudo, à parte ſuperiore

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 7 ½ pieds; & ſa hauteur, depuis la

partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, de 4 $\frac{1}{2}$ pieds. Sa queue eſt très longue, & eſt terminée par un bouquet de poils. Sa tête eſt groſſe : ſes yeux ſont brillants ; ſes oreilles courtes & arrondies. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. La couleur de ſes poils eſt fauve dans la partie ſupérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. Lorſqu'il eſt vieux, ſon col & ſa poitrine ſont couverts d'une très longue criniere.

La femelle eſt beaucoup plus petite que le mâle; & quelque vieille qu'elle ſoit, elle n'a jamais de criniere.

On le trouve en *Aſie* & en *Afrique*.

dorſi ad terram, 4 $\frac{1}{2}$ pedes. Caudam habet longiſſimam, in pilorum floccum deſinentem ; caput craſſum ; ſplendentes oculos ; auriculas breves & ſubrotundas ; in pedibus anterioribus 5 digitos, in poſterioribus 4 tantùm. Pilorum color in parte corporis ſuperiore eſt fulvus, in inferiore ex albo flavicans. Cum ſeneſcit animal, collum ipſius & pectus jubâ longiſſimâ ornantur.

Fœmina mare multò minor eſt ; & quamquàm ſenectutem adepta fuerit nunquam jubata eſt.

Habitat in *Aſiâ* & *Africâ*.

** 6. LE TIGRE.

Felis flava, maculis longis nigris variegata... TIGRIS.

Felis caudâ elongatâ, maculis virgatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 5. ſp. 2.*
Tigris. *Raj. Syn. Quadr. p.* 165.
Klein. Quadr. p. 78.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1060. (*Fig. ſat bona, excepto capite*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 66. *Fig. p.* 67. (*Fig. eadem*).
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 101. *Fig. p.* 104. (*Fig. eadem*).
Jonſt. Quadr. p. 84. *Fig. T.* 54. (*Fig. eadem*).
Charlet. Exer. p. 14.
Bont. Ind. ori. p. 52. *Fig. p.* 53. (*Fig. eadem*).
Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 5. *Fig. p.* 50. (*Fig. mauv.*).
Les Grecs l'appellent Τίγρις.
Les Eſpagnols, TIGRE. *Aldro.*
Les Italiens, TIGRE, *ou* TIGRA. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, TIGERTHIER. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, TIGER. *Linn.*
Les Anglois, TIGER. *Raj.*
Les Habitans de Java, RADJA OUTANG. *Bont.*

Magnitudine *Leoni* cedit. Splendentes habet & lucidos oculos; auriculas breves & ſubrotundas; caudam, caudæ *Leoninæ* inſtar, longiſſimam. In toto corpore veſtitur pilis brevibus, quorum color eſt flavus, longis maculis nigris variegatus. Habitat in *Aſiâ* & *Africâ*.

Il eſt un peu plus petit que le *Lion*. Ses yeux ſont brillants, & pleins de feu; ſes oreilles courtes & arrondies; ſa queue très longue, comme celle du *Lion*. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, dont la couleur eſt jaune & variée de taches noires & longues. On le trouve en *Aſie* & en *Afrique*.

7. Le Tigre Royal.

Felis in dorſo fulva, in lateribus ſubcinerea, in ventre alba, maculis longis nigris variegata... Tigris Regia.

Tigris quam Luſitani *Tigre Royal* appellant. *Klein. Quadr. p.* 80.
Tigre de la grande eſpece, que les Portugais appellent *Tigre Royal. Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 287.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, 4 eſt pedum cum 9 pollicibus; capitis, ab occipitio ad caudæ extremitatem, 14 pollicum; caudæ 2 ½ pedum. Corporis altitudo, à parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 3 circiter pedum. Color eſt in dorſo fulvus; in lateribus ſubcinereus; in ventre albus: totumque corpus longis maculis nigris variegatur. Habitat in *Braſiliâ*.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 4 pieds 9 pouces; celle de ſa queue de 2 ½ pieds; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 14 pouces; & ſa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, d'environ 3 pieds. La couleur de ſon dos eſt fauve: celle des côtés tire ſur le gris; & le ventre eſt blanc: & en outre tout le corps eſt varié de longues bandes noires. On le trouve au *Bréſil*.

** 8. Le Tigre d'Amérique.

Felis flaveſcens, maculis nigris orbiculatis, quibuſdam roſam referentibus, variegatâ... Tigris Americana.

Pardus, an Lynx Braſilienſis, *Jaguara* dicta, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 168.

Tigris Americana, Jaguara Braſilienſis. *Klein. Quadr. p.* 80.

Jaguara Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 235.

Jaguara. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103.

Tlatlauhqui occlòtl, ſeu Tigris Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 498. (*Fig. ſat bona*).

Gros Tigre de la Guiane. *Des March. Tom. III. p.* 299.

Tigre. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 3. *Fig. Pl.* 1. (*Fig. très bone*).

Les Portugais l'appellent Onça. *Raj. Klein. Marcgr. Piſon.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 4 pieds; celle de ſa queue de 2 ½ pieds; celle de ſes jambes de devant, depuis la poitrine juſqu'au bout des doigts, de 1 ½ pied; & celle des jambes de derriere, depuis le ventre juſqu'au bout des doigts, de 1 pied 10 pouces. Il a la tête groſſe; les yeux petits, brillants, & pleins de feu; les oreilles petites & arrondies; une barbe pareille à celle d'un *Chat*; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt jaunâtre, variée de taches noires, dont quelques unes ſont aſſemblées de façon qu'elles repréſentent une *roſe*; & la partie inférieure eſt blanche, variée auſſi de taches noires. Les poils ſont courts dans les adultes; & dans les jeunes ils ſont plus

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium uſque, 4 eſt pedum; caudæ 2 ½ pedum; crurum anteriorum, à pectore ad digitorum apicem uſque, 1 ½ pedis; & crurum poſteriorum, à ventre ad apicem digitorum, 1 pedis cum 10 pollicibus. Caput habet craſſum; oculos parvos, ſplendentes & lucidos; auriculas breves & ſubrotundas; barbam barbæ *Felinæ* æmulam; in pedibus anterioribus digitos 5, in poſterioribus verò 4. Tota corporis pars ſuperior flaveſcit, maculiſque nigris, quibuſdam ita diſpoſitis ut *roſam* quodam modo referant, variegatur; & pars corporis inferior alba eſt, maculis etiam nigris variegata. Pili in adultioribus breves ſunt; in junioribus verò longiores, & pau-

lulùm criſpi. Habitat in *Americâ.*

longs, & un peu friſés. On le trouve en *Amérique*.

9. Le Tigre noir.

Felis nigra, maculis nigris ſaturatioribus variegata... Tigris nigra.

Tigris Jaguarete, Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 81.
Jaguarete Braſilienſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 169.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 235.
Jaguarete. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103.
Onçe, eſpece de Tigre. *Des March. Tom. III. p.* 300.
Les Portugais l'appellent Onça. *Raj. Marcgr. Piſon.*

Magnitudine *Juvencum annuum* adæquat; & figurâ ſuâ *Tigridem Americanam* æmulatur. In toto corpore veſtitur pilis brevibus, ſplendentibus, nigris, cum umbrâ mixtis, cumque maculis coloris nigri ſaturatioris in corpore diſperſis. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ.*

Il eſt de la grandeur d'un *Veau d'un an*, & de la figure du *Tigre d'Amérique*. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, d'un noir ondé & luſtré, varié de taches d'un noir plus foncé. On le trouve dans la *Guiane*, & dans le *Bréſil*.

10. Le Tigre-Barbet, ou Tigre frisé.

Felis pilis criſpis veſtita, maculis nigris variegata... Tigris crispa.

Loup Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 60.

Pilis criſpis, *Canis Aquatici* modo, in toto corpore veſtitur; & maculis nigris, *Tigridis* inſtar, variegatur. Habitat in *Capite Bon. Spei.*

Tout ſon poil eſt friſé, comme celuy d'un *Barbet*; & il eſt marqué de taches noires, comme un *Tigre*. On le trouve au *Cap de Bonne-Eſpérance*.

11. Le Tigre rouge.

Felis ex flavo rufeſcens, mento & infimo ventre albicantibus... Tigris fulva.

Tigris fulvus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 166.
Tigris Cuguacu arana Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 81.
Cuguacu arana Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 169.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 235.
Cuguacu ara. *Piſon. Hiſt. Nat. p.* 103.
Les Portugais l'appellent Tigre. *Raj. Klein. Marcgr.*
Les François de la Guiane, Tigre rouge. *Barr.*

Il eſt de la grandeur & de la figure du *Tigre d'Amérique* : il en differe par ſa couleur, qui eſt un jaune rouſsâtre, plus foncé ſur le dos qu'ailleurs. Le deſſous de la mâchoire inférieure, & le bas ventre ſont un peu blanchâtres. Tous ſes poils ſont courts. On le trouve dans la *Guiane* & dans le *Bréſil*.

Magnitudine & figurâ cum *Tigride Americanâ* planè convenit : ab eâ autem colore ex flavo rufeſcente, in dorſo obſcuriore, differt. Sub mento albicat paululùm, ut & in infimo ventre. Pilos habet in toto corpore breves. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

** 12. Le Leopard.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris, in dorſo orbiculatis, in ventre longis, variegata... Leopardus.

Felis caudâ elongatâ, maculis ſuperioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 5. ſp.* 3.
Pardalis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 166.
Pardus. *Klein. Quadr. p.* 78.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 64. *Fig. p.* 68. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 14.
Panthera, ſeu Pardalis; Pardus; Leopardus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 936. (*Fig. ſat bona*).
Panthera; Pardalis; Varia; Africana; Leopardus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 67. (*Fig. ſat bona*).
Pardus; Leopardus. *Jonſt. Quadr. p.* 81. *Fig. T.* 53. [*Fig. bona*].
Pardus; Panthera. *Proſp. Alp. Ægypt. p.* 237, *Pullus. Fig. T.* 15. *F.* 2. (*Fig. ſat bona*).
Leopardus, ſeu Panthera. *Bont. Ind. Ori. p.* 55.

Pardalion

Pardalion Ariſtotelis. *Aldro. Klein.*
Varia Latinis. *Raj. Klein. Geſn.*
Africana Plinio. *Raj. Klein.*
Lupus Canarius, vel Luparius Gazæ. *Klein.*
Leopard. *Kolbe. Tom. III. p.* 5.
Panthére. *Kolbe. Tom. III. p.* 5.
Les Hebreux l'appellent NAMER. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, NIMRA. *Geſn.*
Les Grecs, Πανθὴρ; *le mâle*, Παρδος; *la femelle*, Παρδαλις.
Les Eſpagnols, LEONPARDAL, *ou* LEONPARDO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, LEONPARDO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, LEPPARD. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, LEWHART. *Geſn.*
Les Suédois, PANTER. *Linn.*
Les Anglois, LEOPARD. *Raj.* LYBARDE, *ou* LEPARDE. *Geſn. Aldro.*

Magnitudine *Tigridem Americanam* circiter æquat, & figurâ æmulatur : ab eâ autem differt colore ſuo, & figurâ & diſpoſitione macularum. Color autem corporis eſt ex albo flavicans, maculis nigris, in ventre longis, in dorſo orbiculatis, ſed omnibus à ſe invicem ſeparatis, & *roſas* nullo modo referentibus, variegatus. In pedibus anterioribus digitos habet 5, in poſterioribus 4 tantùm. Habitat in *Africâ* & *Indiâ Orientali*.

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Tigre d'Amérique* : il en differe par ſa couleur, & l'arrangement & la figure de ſes taches. Sa couleur eſt un blanc jaunâtre, varié de taches noires, longues ſous le ventre, & arrondies ſur le dos, mais toutes ſéparées les unes des autres, & qui ne repréſentent point des *roſes*. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. On le trouve en *Afrique* & dans les *Indes Orientales*.

13. LE CHAT-PARD.

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans, maculis nigris, in dorſo longis, in ventre orbiculatis, variegata... CATUS-PARDUS.

Felis caudâ elongatâ, maculis ſuperioribus virgatis, inferioribus punctatis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 5. *ſp.* 4.
Pardus caudâ brevi. *Klein. Quadr. p.* 78.
Catus Pardus, ſive Catus Montanus Americanorum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 169.
Tlacoozclotl; Tlalocelotl; Catus Pardus Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex.*

Fig. p. 512. (*Fig. ſat bona*).

Chat-Pard. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 109. *Fig. Pl.* 13. (*Fig. bonne*).

Les Anglois l'appellent CAT A MOUNTAIN. *Raj.*

Les Suédois, WILLKATT. *Linn.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 ½ pieds; celle de ſa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'au bout des doigts des pieds de devant, eſt de 1 ½ pied. Sa figure extérieure eſt parfaitement ſemblable à celle du *Chat*. Sa queue ſeulement eſt moins longue, à proportion de la grandeur de ſon corps, que celle du *Chat*. La couleur de tout ſon corps, exceptés le ventre & l'intérieur des jambes de devant, qui ſont d'un blanc jaunâtre, & le deſſous de la gorge & de la mâchoire inférieure, qui ſont blancs, eſt rouſſe, variée de taches noires, longues ſur le dos, & rondes ſur le ventre & les jambes. Ses oreilles ſont rayées tranſverſalement de bandes très noires. On le trouve dans les forêts d'*Amérique*.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, eſt 2 ½ pedum; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte ſuperiore dorſi ad apicem digitorum pedum anteriorum, 1 ½ pedis. Figura corporis externa *Felem* per omnia refert, cauda dumtaxat excepta, quæ, pro ratione magnitudinis animalis, brevior eſt quàm in *Fele*. Color totius corporis, exceptis ventre & interiori crurum parte ex albo flavicantibus, & maxillæ inferioris parte inferiore & gutture albis, eſt rufus, maculis nigris, in dorſo longis, in ventre & cruribus orbiculatis, variegatus. Auriculas habet tæniis tranſverſis nigerrimis ornatas. Habitat in *Americæ* ſylvis.

14. LE CHAT-CERVIER.

Felis alba, maculis nigris variegata, caudâ brevi... CATUS CERVARIUS.

Felis caudâ truncatâ, corpore albo maculato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 5. *ſp.* 8.

Lynx colore albo, maculis nigris, caudâ truncatâ. Act. Upſal. *Kleini Quadr. p.* 77.

Les Pruſſiens l'appellent KATZ-LUCHS. *Klein.*
Les Suédois, KATTLO. *Linn. Klein.*

Caudam habet brevem; inque toto corpore albus eſt, maculis nigris variegatus. Habitat in *Canadâ.*

La couleur de tout ſon corps eſt blanche, variée de taches noires; & il a la queue courte. On le trouve en *Canada.*

15. LE LOUP-CERVIER.

Felis auricularum apicibus pilis longiſſimis præditis, caudâ brevi... LYNX.

Felis caudâ truncatâ, corpore rufeſcente maculato. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 5. *ſp.* 7.
Faun. Suec. Linn. No. 4.
Lynx Aldrovandi. *Klein. Quadr. p.* 77.
Lynx. *Raj. Syn. Quadr. p.* 166.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 90. *Fig. p.* 92. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p 83. *Fig. T.* 71. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 14.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 222.
Lynx; Lupus Cervarius; Chaus; Raphius. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 73. *Fig. p.* 74. (*Fig. ſat bona, excepto capite*).
Lynx, ſeu Lupus Cervarius. *Rzac. Auct. p.* 313.
Lupus Cervarius; Lynx; Chaus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 769. (*Fig. eadem*).
Lupus Cervarius. *Gaz. Rup. Beſl. Fig. T.* 13. (*Fig. bona*).
Lupus Armenius. *Rzac.*
Lynx. *Kolbe. Tom. III. p.* 63.
Loup-Cervier. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 127. *Fig. Pl.* 17. (*Fig. très bonne*).
Les Grecs l'appellent Λύγξ. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, LYNCE. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, LUPO GATTO. *Beſl.*
Les Italiens, les Griſons, & les Savoyards, LUPO CERVERO, *ou* CERVEIRO. *Geſn.*
Les Allemands, LUCHS, *ou* LWS. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Pruſſiens, LUCHS. *Geſn.*
Les Illyriens, LUPO CERVIRO. *Geſn.*
Les Polonois, RYS; OSTROWIDZ. *Rzac.*
Les Suédois, WARGLO. *Linn.*
Les Anglois, OUNCE. *Raj.* LUZARNE. *Geſn.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 2 eſt pedum cum 4 pollicibus; capitis, ab extremi-

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 pieds 4 pouces; celle de ſa tête, depuis

le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 7 pouces; & celle de ſa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à l'extrémité des pieds de devant, eſt de 1 pied 8 pouces. Ses yeux ſont brillants & pleins de feu. Sa tête & ſes oreilles reſſemblent à la tête & aux oreilles d'un *Chat* : au bout de chaque oreille il a une houppe de poils fort longs. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. Les Loups-Cerviers varient beaucoup en couleur : les uns ſont mêlés confuſément de noir, de gris, & de roux : d'autres ſont roux dans toute la partie ſupérieure du corps, & marqués de taches noires; & dans la partie inférieure d'un gris cendré, auſſi marqués de taches noires, mais moins foncées, plus grandes, & en plus petite quantité.

On le trouve en *Italie*, en *Allemagne*, en *Pologne*, en *Lithuanie*, en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, en *Suéde*, en *Aſie*, en *Afrique* & en *Canada*.

L'Animal que M. *Charleton* a décrit *Exer. p.* 21, ſous le nom de *Siyah-Ghuſh*, & dont il a donné la Figure *p.* 23, me paroît être de cette eſpece.

tate roſtri ad occipitium, 7 pollicum; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte dorſi ſuperiore ad extremitatem pedum anteriorum, 1 pedis & 8 pollicum. Fulgentes & lucidos habet oculos; caput & auriculas capiti & auriculis *Felinis* ſimiles : in auricularum apicibus faſciculus extat pilis longiſſimis conflatus. Pedes anteriores in 5 digitos, poſteriores in 4 tantùm fiſſi ſunt. Lynces coloribus multùm variant : alii enim ex nigro, cinereo, & rufo confusè mixti ſunt : alii in parte corporis ſuperiore rufi, maculis nigris variegati; & in parte inferiore cinerei, maculis pariter nigris, ſed dilutioribus, majoribus, minùſque frequentibus, etiam variegati.

Habitat in *Italiâ*, *Germaniâ*, *Poloniâ*, *Lithuaniâ*, *Ruſſiâ*, *Moſcoviâ*, *Sueciâ*, *Aſiâ*, *Africâ* & *Canadâ*.

Animal à Dom. *Charleton* *Exer. p.* 21. deſcriptum, ſub iſto nomine *Siyah-Ghush*, & figuratum *p.* 23, *Lyncis* ſpecies mihi videtur.

SECTIO II.

Ea quorum digiti membranis inter ſe connectuntur.

UNICO Genere, *Lutræ* ſcilicet, conſtituitur hæc Sectio.

XL.

Genus Lutræ.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :

In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati,

Membranis inter ſe connexi.

Obſ. Omnia hujus Generis Quadrupeda Amphibia ſunt, piſcibuſque victitant.

SECTION II.

Ceux dont les doigts ſont joints enſemble par des membranes.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui de la *Loutre.*

XL.

Le Genre de la Loutre.

Son caractere eſt

D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :

A chaque pied cinq doigts onguiculés,

Joints enſemble par des membranes.

Obſ. Toutes les eſpeces de ce Genre ſont Amphibies, & ſe nourriſſent de Poiſſons.

** 1. LA LOUTRE.

Lutra caſtanei coloris... LUTRA.

Lutra digitis æqualibus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 7. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 10.
Lutra. *Raj. Syn. Quadr. p.* 187.
Klein. Quadr. p. 91.
Geſn. Quadr. p. 775. *Fig. p.* 776. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 85. [*Fig. bona*].
Geſn. Piſc. Fig. p. 608. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 292. *Fig. p.* 295. (*Fig. mala*).
Jonſt. Quadr. p. 104. *Fig. T.* 68. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 18.
Bell. de aquat. p. 31. *Fig. p.* 32. (*Fig. bona*).
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 221.
Lutra, vel Lytra, vel etiam Lutris. *Geſn. Icon. Aquat. Fig. p.* 353. (*Fig. bona*).

Lutra, ſeu Canicula aquatica. *Rzac. Auct. p.* 313.
Canis fluviatilis Aetii. *Geſn. Aldro. Jonſt.*
Loutre. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 1. *p.* 151. *Fig. Pl.* 21. (*Fig. très bonne*).
Les Grecs l'appellent Ἔνυδρις.
Les Eſpagnols, NUTRIA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, LODRA; LODRIA; LOUTRA. *Geſn. Aldro.*
Les Savoyards, LEURE. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens & les Polonois, WYDRA. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Suédois, UTTER. *Linn.*
Les Anglois & les Allemands, OTTER. *Raj. Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 pieds 2 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, eſt de 5 pouces; & celle de ſa queue de 1 ½ pied. Ses yeux ſont très petits; ſes oreilles très courtes, rondes, & placées plus bas que les yeux; ſes jambes très courtes. Elle a à chaque pied 5 doigts, tous joints enſemble par des membranes: le pouce eſt plus court que les autres doigts. Toute la partie ſupérieure du corps, la queue & les jambes ſont d'un marron plus ou moins foncé. La gorge, l'eſtomach, & le ventre ſont d'un gris blanc. On la trouve aux bords des eaux.

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 2 eſt pedum cum 2 pollicibus; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 5 pollicum; caudæ 1 ½ pedis. Oculos habet valdè exiguos; auriculas breviſſimas, rotundas, infrà oculos poſitas; crura breviſſima; in ſingulis pedibus digitos 5, omnes membranis inter ſe connexos; pollice aliis digitis breviore. Pilorum color in parte corporis ſuperiore, caudâ & cruribus eſt caſtaneus, in aliis dilutior, in aliis ſaturatior. Guttur, pectus, & venter ex cinereo albicant. Habitat in ripis aquarum.

2. LA LOUTRE DU BRÉSIL.

Lutra atri coloris, maculâ ſub gutture flavâ... LUTRA BRASILIENSIS.

Lutra pollice digitis breviore. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 7. *ſp.* 2.
Lutra nigricans, caudâ depreſſâ & glabrâ. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 155.
Lutra Braſilienſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 189.
Klein. Quadr. p. 91.

Jiya, quæ & Carigueibeju appellatur à Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 234.
Jiya, ſive Carigueibeju. *Jonſt. Quadr. p.* 104. *Fig. T.* 60.
Carygueibeju. *Charlet. Exer. p.* 19.
Loutre, ou Cariguebeju. *Des March. Tom. III. p.* 306.
Les Portugais l'appellent LOUTRA. *Raj. Marcgr.*

Præcedenti magnitudine cedit; eam autem figurâ æmulatur. Oculos habet nigros, & rotundos; auriculas breves, ſubrotundas, & infrà oculos poſitas; in ſingulis pedibus digitos 5 (*m*) unguibus fuſcis & acutis munitos; pollice aliis digitis breviore. In toto corpore veſtitur pilis atris, exceptis qui caput obtegunt, qui ſunt obſcurè fuſci, & maculâ ſub gutture flavâ. Habitat in *Braſiliâ.*

Elle eſt un peu plus petite que la précédente; mais elle luy reſſemble par ſa figure. Ses yeux ſont noirs & ronds; ſes oreilles courtes, arrondies, & placées plus bas que les yeux. Elle a à chaque pied 5 doigts (*m*) armés d'ongles bruns & aigus; le pouce eſt plus court que les autres doigts. Tout ſon corps eſt couvert de poils noirs, exceptés ceux de la tête qui ſont d'un brun foncé, & une tache jaune, qu'elle a ſous la gorge. On la trouve au *Bréſil.*

(*m*) Utrùm digiti membranis inter ſe connexi ſint, prorsùs ignoro: ſi reverà ſint ſeparati, in hoc Genere Animal iſtud non eſt reponendum.

(*m*) Je ne ſçais ſi ſes doigts ſont joints enſemble par des membranes: s'ils ne l'étoient pas, elle ne ſeroit pas de ce Genre.

ORDRE XVII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

CET Ordre ne contient qu'un ſeul Genre, qui eſt celui de la *Taupe*.

XLI.

Le Genre de la Taupe. (Fig. 7).

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure (Fig. 7. a.), huit à l'inférieure (Fig. 7. b.):
Les doigts onguiculés:
La plante des pieds de devant tournée en dehors.

Obſ. Toutes les eſpeces de ce Genre vivent ſous terre, & y font des tanieres, dans leſquelles elles ſe cachent.

ORDO XVII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore ſex, in inferiore octo; & digitis unguiculatis prædita.

UNICO Genere, *Talpæ* ſcilicet, conſtituitur hic Ordo.

XLI.

Genus Talpæ. (Fig. 7).

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſex (Fig. 7. a.), in inferiore octo (Fig. 7. b.):
Digiti unguiculati:
Plantæ pedum anteriorum extrorsùm verſæ.

Obſ. Omnes hujus Generis ſpecies ſub terrâ vitam agunt, ibique cuniculos condunt, in quibus deliteſcunt.

** 1. LA TAUPE.

Talpa caudata, nigricans, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... TALPA VULGARIS.

Talpa caudata. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 13. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 17.

Talpa

Talpa noſtras, nigra communiter. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa. *Raj. Syn. Quadr. p.* 236.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1055. [*Fig. ſat bona*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 449. *Fig. p.* 451. *No.* 2. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 118. *Fig. T.* 66. [*Fig. ſat bona*].
Charlet. Exer. p. 25.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 236.
Taupe. *Kolbe. Tom. III. p.* 51.
Les Grecs l'appellent Ασπαλαξ.
Les Eſpagnols, TOPO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, TALPA. *Geſn. Aldro.*
Les Boulonnois, TOPINARA. *Aldro.*
Les Suiſſes, SCHÄR, *ou* SCHÄRMUS. *Geſn.*
Les Allemands, MULWERF. *Geſn. Aldro.* MAUL-WURFF. *Rzac.*
Les Illyriens, KRTICZE. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, KRET. *Rzac.*
Les Suédois, MULLVAD. *Linn.*
Les Smolandois, SURCK. *Linn.*
Les Flamands & les Hollandois, MOLL, *ou* MOLLMUSS. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, MOLE, *ou* MOLDWRAP, *ou* WANT. *Raj. Geſn. Aldro.*

Corporis longitudo, ab extremitate naſi ad caudæ exortum, 5 eſt circiter pollicum; capitis, ab extremitate naſi ad occipitium, 1 ½ pollicis. Caudam habet breviſſimam; oculos ſeminis *Millii* magnitudine, nigros, & ſub pilis occultos; naſum 4 lineis ultrà maxillam ſuperiorem prominentem; crura breviſſima; pedes anteriores poſterioribus latiores, & ad humum fodiendum aptatos; in ſingulis pedibus digitos 5, validis unguibus munitos, præſertim in anticis pedibus. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, denſis, ſerici inſtar molliſſimis, & ni-

La longueur de ſon corps, depuis le bout du nez juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 5 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du nez juſqu'à l'occiput, de 1 ½ pouce. Sa queue eſt très courte. Ses yeux ſont gros comme un grain de *millet*, noirs, & cachés ſous les poils. Son nez avance de 4 lignes au-delà de la mâchoire ſupérieure. Ses jambes ſont très courtes: ſes pieds de devant ſont plus larges que ceux de derriere, & propres à fouiller la terre. Elle a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles forts, ſurtout ceux des pieds de devant. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, épais, doux comme de la ſoye, & noi-

râtres. On la trouve ſous terre dans les champs, les prés, & les jardins.

gricantibus. Habitat ſub terrâ in agris, pratis & hortis.

** 2. La Taupe blanche.

Talpa caudata, alba, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... Talpa alba.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn.* N°. 17.
Talpa coloris albi. *Raj. Syn. Quadr. p.* 236.
Talpa noſtras albi coloris. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa alba noſtras. *Seb. Vol. I. p.* 51. *Fig. T.* 32. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Talpa alba. *Rzac. Auct. p.* 329.
Les Polonois l'appellent Kret. *Rzac.*

Elle eſt de la grandeur, & de la figure de la précédente : elle n'en differe que par ſa couleur qui eſt blanche. On la trouve auſſi ſous terre dans les champs, les prés, & les jardins.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmulatur : ab eâ autem differt colore, qui in toto corpore albus eſt. Habitat, ut illa, ſub terrâ in agris, pratis, & hortis.

3. La Taupe variée.

Talpa caudata, ex albo & nigro variegata, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... Talpa variegata.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn.* N°. 17.
Talpa maculata, Ooſt-friſia. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I. p. 68. *Fig. T.* 41. *F.* 4. (*Fig. bona*).

Elle differe des précédentes, parce qu'elle eſt un peu plus grande, & que tout ſon corps eſt comme marbré de taches noires & de taches blanches.

A præcedentibus differt magnitudine quâ eas paululùm antecellit, & colore, qui in toto corpore maculis albis & maculis nigris, marmoris in modum, variegatur.

Obſ. Je crois que ces trois Taupes ne ſont que des variétés de la même eſpece.

Obſ. Tres Talpæ præcedentes ejuſdem ſpeciei varietates mihi videntur.

4. La Taupe de Virginie.

Talpa caudata, nigricans, ex ſaturatè purpureo mixta, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... Talpa Virginiana.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn. N°.* 17.
Talpa nigra Virginiana. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa Virginianus niger. *Seb. Vol. I. p.* 51. *Fig. T.* 32. *F.* 3. (*Fig. bona*).

Magnitudine & figurâ *Talpam vulgarem* æmulatur : ab eâ tantùm differt colore pilorum, qui nigricantès ſunt, ſplendentes, & ſaturatè purpureo coruſcantes. Habitat in *Virginiâ*.

Elle eſt de la grandeur & de la figure de la *Taupe ordinaire* : elle en differe ſeulement par la couleur de ſon poil qui eſt noirâtre, luiſant, & mêlé d'un pourpre foncé. On la trouve en *Virginie*.

5. La Taupe rouge d'Amérique.

Talpa caudata, ex dilutè cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, poſticis tetradactylis... Talpa Americana rufa.

Talpa rubra Americana. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I. p. 51. *Fig. T.* 32. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Magnitudine & figurâ corporis *Talpam vulgarem* æmulatur; ab eâ autem differt figurâ pedum, quorum anteriores in 3 tantùm fiſſi ſunt digitos, quorum exterior unguem gerit validiſſimum, longum, acutum, & parumper incurvum; medius minor, minore etiam ungue munitus eſt; interior verò minimus. Pedes poſteriores in 4 abeunt digitos æqualibus ferè unguibus armatos. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex dilutè

Elle eſt de la grandeur de la *Taupe ordinaire* : elle luy reſſemble par la figure de ſon corps; mais elle en differe par celle de ſes pieds, dont ceux de devant n'ont que trois doigts, dont l'extérieur eſt muni d'un ongle très fort, long, pointu, & un peu recourbé; le doigt du milieu eſt plus petit, ainſi que ſon ongle; & le doigt intérieur eſt très petit. Les pieds de derriere ont chacun 4 doigts armés d'ongles preſque égaux. Tout ſon corps eſt couvert de poils

d'un roux tirant ſur un cendré clair. On la trouve en *Amérique*.

cinereo rufis. Habitat in *Americâ*.

6. La Taupe dorée de Siberie.

Talpa ecaudata, ex viridi aurea, pedibus anticis tridactylis, poſticis tetradactylis... Talpa Siberica aurea.

Talpa ecaudata. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 13. *ſp.* 2.
Talpa Sibericus verſicolor, *Aſpalax* dictus. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I, p. 51. *Fig. T.* 32. *Mas F.* 4. *Fœmina F.* 5. [*Fig. bonis*].

Elle eſt à peu près de la grandeur de la *Taupe ordinaire*; elle en differe parce qu'elle a le nez beaucoup plus court, qu'elle n'a point de queue, & par la figure de ſes pieds, qui ſont ſemblables à ceux de la précédente. Tout ſon corps eſt marqueté de diverſes couleurs, parmi leſquelles domine l'or & le verd. On la trouve en *Siberie*.

Magnitudine *Talpam vulgarem* circiter æquat; ab eâ autem differt naſo multò breviore, caudæ defectu, & figurâ pedum pedibus præcedentis ſimilium. In toto corpore variis refulget coloribus, quos inter præcipuè emicat ex viridi aureus. Habitat in *Siberiâ*.

ORDO XVIII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore decem, in inferiore octo; & digitis unguiculatis donata.

UNICO Genere, *Philandri* ſcilicet, hic ordo, ſicut & præcedens, conſtituitur.

XLII.

Genus Philandri.

Hujus character eſt

Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore decem, in inferiore octo:

In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati:

Pollex diſtinctus.

Obſ. 1o. Omnes hujus Generis ſpecies caudam habent caudæ *Murinæ* æmulam, & longiſſimam, exceptâ ſpecie ultimâ, quæ breviſſimâ caudâ donatur.

Obſ. 2o. In maxillâ ſuperiore 10 ſunt dentes inciſores, quorum 2 intermedii aliis ſunt majores; in maxillâ inferiore octo tantùm: prætereà in utrâque maxillâ den-

ORDRE XVIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont dix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans le précédent, qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Philandre*.

XLII.

Le Genre du Philandre.

Son caractere eſt

D'avoir dix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, huit à l'inférieure:

A chaque pied cinq doigts onguiculés:

Le pouce bien diſtinct.

Obſ. 1o. Toutes les eſpeces de ce Genre ont une queue ſemblable à celle d'un *Rat*, & très longue, excepté la derniere, qui l'a très courte.

Obſ. 2o. Elles ont toutes à la mâchoire ſupérieure 10 dents inciſives, dont les 2 du milieu ſont plus grandes que les autres; & 8 à la mâchoire inférieure: elles ont en outre à chaque

mâchoire pluſieurs dents canines de chaque côté, & enſuite pluſieurs dents molaires dont le nombre varie.

Obſ. 3°. Leurs pieds ſont conformés de même que ceux des *Singes*. Comme eux, elles s'appuyent ſur le talon en marchant. Leurs ongles ſont aigus.

tes canini plures utrinquè, & deinde molares etiam plures utrinquè, quorum variat numerus.

Obſ. 3°. Pedes habent pedibus *Simiarum* ſimiles; *Simiarumque* inſtar ſuper calcanea incedunt. Unguibus acutis donantur.

** 1. LE PHILANDRE.

Philander ſaturatè ſpadiceus in dorſo, in ventre flavus, maculis ſuprà oculos flavis... PHILANDER.

Philander, Opaſſum, ſeu Carigueia Braſilienſis. *Seb. Vol. I. p.* 56. *Fig. T.* 36. *Mas F.* 1. *Fœmina F.* 2. *Pullus F.* 3. (*Fig. optimis*).
Didelphis mammis intrà abdomen. Poſſum. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 23. *ſp.* 1.
Mus Marſupialis ſylveſtris Braſilienſis. *Klein. Quadr. p.* 59.
Carigueya Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 182.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 222. (*Fig. mala*).
Carigueya. *Jonſt. Quadr. p.* 94. *Fig. T.* 63. [*Fig. mala*].
Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p. 323. [*Fig. mala*].
Carigue, vel Sarigoy. *Jo. de Laët. p.* 82.
Opaſſum. *Jo. de Laët. p.* 82.
Opoſſum. *Cat. App. p.* 29.
Tlaquatzin. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 73. [*Fig. ſat bona, ſi pilus brevior eſſet*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 156. (*Fig. utſuprà*).
Hernand. Hiſt. Mex. p. 330.
Vulpes major putoria, caudâ tereti & glabrâ. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 166.
Semivulpa. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 981. (*Fig. ficta*). (*n*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 90. (*Fig. eadem*).
Jonſt. Quadr. Fig. T. 58. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p. 223. (*Fig. etiam ficta*).
Carigoy, vel Sarigoy Lerii. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Jupatiima nonnullis. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Manicou du P. Feuillée. *Klein.*
Les Portugais l'appellent ROPOZA. *Raj.*
Les Anglois, POSSUM. *Raj.*
Les François de la Guiane, PUANT. *Barr.*
Les Guianois, AOUARÉ. *Barr.*

(*n*) Les Figures qu'ont donné de cet animal *Geſner*, *Jonſton*, & *Aldrovande*, ne lui reſſemblent en aucune façon, ni même à aucun *Quadrupede* connu.

(*n*) Figuræ, quas hujus animalis dederunt *Geſnerus*, *Jonſtonus*, & *Aldrovandus*, nullo modo id repræſentant, nec etiam ullum *Quadrupedem* notum.

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 8 circiter eſt pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 3 pollicum; caudæ 1 pedis. Crura anteriora 3 pollices longa ſunt; poſteriora verò paulò plus 4 pollices. Roſtrum habet acuminatum; maxillam ſuperiorem ultrà inferiorem paulò prominentem; parvos, rotundos, & lucidos oculos; auriculas longas, latas, glabras, ad tactum molliſſimas, tenuiſſimas & tranſlucidas, *Vulpinarum* inſtar erectas; barbam *Felinam*, nigris conflatam ſetis, cujuſmodi & in genis & ſuprà oculos habentur. Cauda, ab exortu ad tertiam longitudinis partem, pilis obſita eſt; in reliquâ longitudine ſquamulis tegitur, caudamque *Murinam* æmulatur. Pili ſaturatè ſpadicei partem corporis ſuperiorem obtegunt; qui verò oris ambitum, ventrem, & crura cooperiunt, ſunt flavi. Caput pilis fuſcis veſtitur, & ſuprà utrumque oculum macula ineſt flava. Habitat in *Americâ*.

Hujus ſpeciei fœmina in infimo ventre, propè crura poſteriora, ſacculum habet, cujus orificium 2 $\frac{1}{2}$ pollices longum eſt, in quo mammæ

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 8 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 3 pouces; celle de ſa queue de 1 pied; celle de ſes jambes de devant de 3 pouces; & celle des jambes de derriere d'un peu plus de 4 pouces. Son muſeau eſt pointu; ſa mâchoire ſupérieure un peu plus longue que l'inférieure: ſes yeux ſont petits, ronds & brillants; ſes oreilles longues, larges, ſans poils, douces au toucher, très minces, tranſparentes, & droites comme celles d'un *Renard*. Il a une barbe ſemblable à celle d'un *Chat*, composée de ſoyes noires: il a auſſi de pareilles ſoyes aux jouës, & pardeſſus les yeux. Sa queue eſt couverte de poils depuis ſon origine juſqu'au tiers de ſa longueur; le reſte eſt couvert de petites écailles, & ſemblable à la queue d'un *Rat*. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt d'un rouge-bay foncé: le tour de ſa gueule, ſon ventre, & ſes jambes ſont jaunes. Sa tête eſt brune, & il a au-deſſus de chaque œil une tache jaune. On le trouve en *Amérique*.

La femelle de cette eſpece a à la partie inférieure du ventre, auprès des jambes de derriere, une eſpece de ſac, dont l'ouverture a environ 2 $\frac{1}{2}$ pouces, dans

lequel ſont renfermées les mammelles, & où elle met ſes petits nouvellement nez.

includuntur, & in quem fœtus, poſtquàm editi ſunt, recipit.

2. Le Philandre Oriental.

Philander ſaturatè fuſcus in dorſo, in ventre flavus, maculis ſuprà oculos flavis.., Philander Orientalis.

Philander Orientalis. *Seb. Vol. I. p.* 61. *Fig. T.* 38. *F.* 1. (*Fig. optima*).
Mus Marſupialis. *Klein. Quadr. p.* 59.
Les Indiens l'appellent Pelandor-Aroe ; *ſelon Fr. Valentin. Seba.*

Il reſſemble parfaitement au précédent par la figure de toutes ſes parties ; mais il eſt beaucoup plus grand. La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 11 pouces ; & celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 4 pouces ; le reſte à proportion. La partie ſupérieure de ſon corps eſt d'un brun foncé ; & l'inférieure eſt jaune : il a auſſi une tache jaune pardeſſus chaque œil. On le trouve aux *Indes Orientales.*

Omnium partium figurâ præcedenti ſimillimus eſt ; ab eo autem differt magnitudine quâ eum antecellit. Corporis enim longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 11 pollices circiter æquat ; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 4 pollices ; reliquæ partes ſervatâ proportione longæ ſunt. In parte corporis ſuperiore ſaturatè fuſcus eſt ; in inferiore flavus : & ſuprà utrumque oculum macula eſt flava. Habitat in *Indiâ Orientali.*

Sa femelle a, comme celle du précédent, à la partie inférieure du ventre ce petit ſac, dans lequel elle renferme ſes petits nouvellement nez.

Hujus ſpeciei fœmina, ſicut & præcedentis, in infimo ventre ſacculo donatur, in quem fœtus, poſtquàm editi ſunt, recipit.

3. Le Philandre d'Amboine.

Philander atro ſpadiceus in dorſo, in ventre ex albido cinereo flavicans, maculis ſuprà oculos obſcurè fuſcis... Philander Amboinensis.

Philander maximus Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 64. Fig. T. 39. (Fig. optima).*
Didelphis mammis intra abdomen. Poſſum. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 1.*
Mus Marſupialis maximus Orientalis. *Klein. Quadr. p. 59.*
On l'appelle à Amboine Coes-Coes. *Seba.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ initium uſque, 13 eſt circiter pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 4 ½ pollicum. Caudam habet longiſſimam, ſquamis rhomboideis in totâ longitudine tectam; roſtrum valdè elongatum; auriculas latas, & arrectas; barbam barbæ præcedentium æmulam. Pili partem corporis ſuperiorem tegentes, longi ſunt, ſetacei, atro ſpadicei; & ad ventris latera utrinquè paulò dilutiorem acquirunt colorem: qui verò partem corporis inferiorem veſtiunt, ſunt ex albido cinereo flavicantes. Suprà utrumque oculum macula eſt obſcurè fuſca. Habitat in *Ambionenſi Inſulâ.*

Hujus ſpeciei fœmina, ſicut & præcedentium fœminæ, in infimo ventre ſacculo

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 13 pouces; & celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 4 ½ pouces. Sa queue eſt très longue, & toute couverte d'écailles rhomboïdes. Son muſeau eſt fort allongé. Ses oreilles ſont larges, & élevées. Il a une barbe pareille à celle des précédents. Les poils qui couvrent la partie ſupérieure de ſon corps, ſont longs & ſoyeux, & d'un rouge-bay noirâtre; & cette couleur s'éclaircit un peu de chaque côté, en s'approchant du ventre: ceux qui couvrent la partie inférieure, ſont d'un blanchâtre qui tire un peu ſur le jaune cendré. Il a au deſſus de chaque œil une tache d'un brun foncé. On le trouve à l'*Iſle d'Amboine.*

La femelle de cette eſpece a auſſi à la partie inférieure du ventre ce petit ſac, dans lequel

elle met ſes petits nouvellement nez.

Obſ. Je ne ſçais ſi les eſpeces ſuivantes ont le caractere de ce Genre: je ne les ai jamais vûes; & les Auteurs qui les ont décrites, n'ont point déterminé le nombre de leurs dents inciſives. Aucune de ces eſpeces n'a à la partie inférieure du ventre ce petit ſac propre à renfermer les petits nouvellement nez; mais, à ce ſac près, elles reſſemblent aſſez aux eſpeces précédentes. La forme de leur tête & de leur muſeau, celle de leur queue, de leurs pieds, qui ont chacun 5 doigts, & dont le pouce eſt très diſtinct, ſont à peu près les mêmes. D'ailleurs elles ont à peu près la même façon de vivre; ce qui m'a déterminé à les placer dans ce Genre, juſqu'à ce que de plus exactes obſervations nous ayent inſtruit de leur vrai caractere.

donatur, in quem fœtus recenter natos recipit.

Obſ. Utrùm ſpecies ſequentes hujus Generis characterem habeant prorsùs ignoro: eas nunquam vidi; auctoreſque, qui earum deſcriptionem dederunt, nullam de numero dentium inciſorum mentionem fecerunt. Nullæ in infimo ventre ſacculum habent, ad fœtus recenter natos includendos, comparatum; in omnibus verò aliis, ſolo ſacculo excepto, cum præcedentibus ſpeciebus ſatis benè conveniunt. Forma capitis, roſtri, caudæ, & pedum in 5 digitos fiſſorum, pollice diſtincto, eſt ferè eadem. Prætereà, eodem ferè modo victitant; ob quas rationes, eas in hoc Genere repoſui, uſque dum exactis obſervationibus ipſarum characteris veram cognitionem habeamus.

4. Le Philandre du Brésil.

Philander pilis in exortu albis, in extremitate nigricantibus veſtitus... Philander Brasiliensis.

Taijbi Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 185.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 223.
Mus Tlaquatzin, ſeu Taijbi Braſilienſibus. *Klein. Quadr. p.* 59.
Tlaquatzin, ſeu Taijbi Braſilienſibus dicta. *Seb. Vol. I. p.* 57. *Fig. T.* 36. *F.* 4. [*Fig. bona*].
Taijbi. *Jonſt. Quadr. p.* 95.
Les Portugais l'appellent Cachorro domato. *Raj. Jonſt. Marcgr. Seba.*
Les Flamands, Boschratte. *Raj. Marcgr.*

Son corps eſt long de 14 doigts, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue. Son muſeau eſt pointu: ſes yeux ſont noirs, & à fleur de tête; ſes oreilles arrondies, denuées de

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 14 eſt digitorum. Orem habet acutum; nigros & prominentes oculos; auriculas ſubrotundas, glabras, & te-

nuiſſimas; barbam barbæ *Felinæ* æmulam; caudam longiſſimam, ab exortu ad tertiam circiter longitudinis partem, pilis in exortu albis in extremitate nigricantibus obſitam, reliquâ longitudine ſquamulis tectâ. Per univerſum corpus veſtitur pilis in exortu albis ſplendentibus, in extremitate nigricantibus, & magis quidem in dorſo, maximè tamen in cruribus. Habitat in *Braſiliâ.*

poils, & fort minces. Il a une barbe ſemblable à celle d'un *Chat.* Sa queue, qui eſt très longue, eſt couverte, depuis ſon origine environ juſqu'au tiers de ſa longueur, de poils blancs à leur origine & terminés de noirâtre; le reſte eſt couvert de petites écailles. Les poils, qui couvrent tout ſon corps, ſont d'un blanc éclattant à leur origine, & leur extrémité eſt noirâtre : cette derniere couleur eſt plus foncée ſur le dos, & beaucoup plus encore ſur les jambes. On le trouve au *Bréſil.*

5. Le Philandre d'Amérique.

Philander ſaturatè ſpadiceus in dorſo, in ventre dilutè flavus; pedibus albicantibus... PHILANDER AMERICANUS.

Mus Scalopes. *Klein. Quadr. p.* 58.
Mus ſylveſtris Americanus, *Scalopes* dictus. *Seb. Vol. I. p.* 48. *Fig. T.* 31. *Mas F.* 1. *Fœmina F.* 2. (*Fig. bonis*).
Scalopes. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 416.
Les Braſiliens l'appellent MARMOSA. *Seba.*

Magnitudine *Rattum* circiter æquat. Roſtrum habet elongatum, & in acumen deſinens; magnos & nigros oculos; auriculas latas, pendulas, rariſque dumtaxat pilis obſitas. Promiſſus myſtax labium ſuperius ornat. Cauda eſt longiſſima, omninò pilis deſtituta, & in extremo ſpiraliter intorta. Superior corporis pars, & oculorum circumferentia ſunt ſaturatè ſpa-

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Rat.* Son muſeau eſt allongé, & ſe termine en pointe : ſes yeux ſont grands & noirs; ſes oreilles larges, pendantes, garnies ſeulement de quelques poils clair-ſemés. Il a à la lévre ſupérieure une longue mouſtache. Sa queue eſt très longue, & tout à fait denuée de poils; & ſon extrémité eſt roulée en ſpirale. La partie ſupérieure du corps, & le tour des yeux ſont

d'un rouge-bay foncé: le ventre & le front ſont d'un jaune clair: ſes pieds ſont ſans poils, & blanchâtres. On le trouve en *Amérique*.

diceæ; venter autem cum fronte dilutè flavus: pedes glabri ſunt & albicantes. Habitat in *Americâ*.

6. Le Philandre d'Afrique.

Philander ſaturatè ſpadiceus in dorſo, in ventre ex albo flavicans, cauda ex ſaturatè ſpadiceo maculata... Philander Africanus.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus Africanus, *Kayopollin* dictus. *Klein. Quadr. p.* 58.
Seb. Vol. I. p. 49. *Fig. T.* 31. *F.* 3. [*Fig. bona*].
Mus Indicus, dictus *Coyopollin. Charlet. exer. p.* 25. *No.* 5.
Animal caudimanum, ſeu Coyopollin. *Euſ. Nieremb. p.* 158.
Coyopollin. *Jonſt. Quadr. p.* 118.
Fern. Hiſt. N. Hiſp. p. 10.

Il eſt de la grandeur, & de la figure du précédent; il a ſeulement la tête plus groſſe, ainſi que la queue, qui eſt toute tachetée de rouge-bay foncé. Ses oreilles ſont très minces & tranſparentes. La partie ſupérieure de ſon corps eſt d'un rouge-bay foncé; ſon ventre d'un blanc jaunâtre; & ſes jambes & ſes pieds ſont blancs. On le trouve en *Afrique*.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmulatur; paulò tamen craſſius ejus caput eſt; ita & cauda tantillùm craſſior & ex ſaturatè ſpadiceo maculata. Auriculæ tenuiſſimæ ſunt & tranſlucidæ. Corporis pars ſuperior ſaturatè ſpadicea eſt; venter ex albo flavicans; cruraque & pedes albi. Habitat in *Africâ*.

7. Le Philandre de Surinam.

Philander ex rufo helvus in dorſo, in ventre ex flavo albicans... Philander Surinamensis.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus ſylveſtris Americanus, catulos ſuos ſuprà dorsum ferens. *Klein. Quadr. p.* 58.
Mus ſeu ſorex ſylveſtris Americanus. *Seb. Vol. I. p.* 49. *Fig. T.* 31. *Mas F.* 4. *Fæmina F.* 5. [*Fig. bonis*].

Magnitudine, & figurâ præcedentes æmulatur. Mirè lucidos habet oculos; auriculas nudas & rigidas; prolixam in labio ſuperiore barbam; & ſuprà quemlibet oculum binas ſetas quaſi *Suillas*; caudam glabram, in extremo ſpiraliter intortam, maculis ſaturatè ſpadiceis per totam longitudinem diſperſis, in mare tantùm, non quidem in fœminâ. Corporis pars ſuperior ex rufo helva eſt: venter, pedes, roſtrum, & frons ex flavo albicant: & oculorum ambitus eſt ſaturatè fuſcus. Ungues omnes pedum anteriorum, ſicut & ungues pollicum pedum poſteriorum, breves ſunt & obtuſi, reliquis unguibus acutis. Habitat in *Surinamenſi Inſulâ*.

Il eſt de la grandeur, & de la figure des précédents. Ses yeux ſont brillants; ſes oreilles dénuées de poils, & roides. Il a à la lévre ſupérieure une longue barbe; & ſur chaque œil deux poils ſemblables à des ſoyes de *Cochon*. Sa queue eſt nuë, roulée en ſpirale à ſon extrémité, & marquetée, dans le mâle ſeulement, de taches d'un rouge-bay foncé. La partie ſupérieure du corps eſt d'un roux tirant ſur le rouge clair: le ventre, les pieds, le muſeau & le front ſont d'un jaune blanchâtre: & le tour des yeux eſt d'un brun foncé. Tous les ongles des pieds de devant, & ceux des pouces des pieds de derriere ſont courts & obtus, & les autres ſont aigus. On le trouve à *Surinam*.

8. Le Philandre a grosse teste.

Philander ex rufo luteus in dorſo, in ventre ex flavo albicans, capite craſſo... PHILANDER CAPITE CRASSO.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 23. *ſp.* 2.
Mus Americanus major, agreſtis, capite grandi. *Klein. Quadr. p.* 58.
Mus ſeu ſorex Americanus, major agreſtis, capite grandi. *Seb. Vol. I. p.* 50. *Fig. T.* 31. *F.* 8. (*Fig. bona*).

Caput habet craſſum, latum, & albicans; auriculas ingentes & glabras; prolixam in labio ſuperiore barbam. Dorſum eſt ex rufo luteum: venter verò, cauda, crura-

Il a la tête groſſe, large & blanchâtre; les oreilles grandes & ſans poils; une longue barbe à la lévre ſupérieure. Son dos eſt d'un roux qui tire ſur le jaune: ſon ventre, le deſſous de

ſa queue & de ſes jambes ſont d'un jaune blanchâtre. On le trouve en *Amérique*.

que ſubtùs ex flavo albicant. Habitat in *Americâ*.

9. Le Philandre a courte queue.

Philander obſcurè rufus in dorſo, in ventre helvus, caudâ brevi & craſſâ... PHILANDER CAUDA BREVI.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus ſylveſtris Americanus. *Seb. Vol. I. p. 50. Fig. T. 31. F. 6.* (*Fig. bona*).

Il eſt de la grandeur, & de la figure du *Philandre de Surinam*. Ses oreilles ſont denuées de poils. Il a à la lévre ſupérieure une longue barbe; & ſur chaque œil deux poils ſemblables à des ſoyes de *Cochon*. Sa queue eſt courte & groſſe. Tous ſes ongles ſont aigus. Son dos eſt d'un roux foncé; ſon ventre d'un roux pâle: ſon muſeau & ſon front ſont d'un jaune blanchâtre; & le tour de ſes yeux eſt d'un brun foncé. On le trouve en *Amérique*.

Magnitudine & figurâ *Philandrum Surinamenſem* æmulatur. Glabras habet auriculas; prolixam in labio ſuperiore barbam; & ſuprà quemlibet oculum binas ſetas, quaſi *Suillas*; caudam brevem & craſſam; ungues omnes acutos. Obſcurè rufus eſt in dorſo; in ventre verò helvus: roſtrum & frons ex flavo albicant; & oculorum ambitus eſt ſaturatè fuſcus. Habitat in *Americâ*.

FIGURARUM Explicatio.

Figura 1. Caput Armadilli Guianenſis. *a*, *a*, dentes ipſius molares.

Fig. 2. Caput Muſaranei. *a*, *a*, dentes inciſores ſuperiores. *b*, *b*, dentes inciſores inferiores. *c*, *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 3. Caput Erinacei. *a*, dentes inciſores ſuperiores. *b*, dentes inciſores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 4. Caput Pteropi. *a*, *a*, *a*, *a*, dentes inciſores. *b*, *b*, *b*, dentes canini.

Fig. 5. Caput Proſimiæ. *a*, *a*, *a*, dentes inciſores ſuperiores. *b*, *b*, dentes inciſores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 6. Caput Veſpertilionis Minoris. *a*, dentes inciſores ſuperiores. *b*, dentes inciſores inferiores. *c*, dentes canini. *d*, dens inciſorius ſuperior intermedius ope microſcopii auctus. *e*, dens inciſorius inferior etiam ope microſcopii auctus.

Fig. 7. Caput Talpæ. *a*, dentes inciſores ſuperiores. *b*, dentes inciſores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

EXPLICATION des Figures.

Figure 1. Tête de l'Armadille de Cayenne. *a*, *a*, ſes dents molaires.

Fig. 2. Tête de la Muſaraigne. *a*, *a*, ſes dents inciſives ſupérieures. *b*, *b*, ſes dents inciſives inférieures. *c*, *c*, *c*, ſes dents canines.

Fig. 3. Tête du Hériſſon. *a*, ſes dents inciſives ſupérieures. *b*, ſes dents inciſives inférieures. *c*, *c*, ſes dents canines.

Fig. 4. Tête de la Rouſſette. *a*, *a*, *a*, *a*, ſes dents inciſives. *b*, *b*, *b*, ſes dents canines.

Fig. 5. Tête du Maki. *a*, *a*, *a*, ſes dents inciſives ſupérieures. *b*, *b*, ſes dents inciſives inférieures. *c*, *c*, ſes dents canines.

Fig. 6. Tête de la Petite Chauve-Souris de notre pays. *a*, ſes dents inciſives ſupérieures. *b*, ſes dents inciſives inférieures. *c*, ſes dents canines. *d*, une des dents inciſives ſupérieures intermediaires groſſie à la loupe. *e*, une des dents inciſives inférieures auſſi groſſie à la loupe.

Fig. 7. Tête de la Taupe. *a*, ſes dents inciſives ſupérieures. *b*, ſes dents inciſives inférieures. *c*, *c*, ſes dents canines.

TABLE

après la Page 295.



Ant. Humblot del.

Maisonneuve sculp.

TABLE
DES QUADRUPEDES,
Selon l'Ordre dans lequel ils ſont rangés dans cet Ouvrage.

ORDRE I.
SECTION I.

I. *Genre du Fourmiller.*

1. LE Fourmiller *Tamanoir.*
2. Le Fourmiller.
3. Le Fourmiller aux longues oreilles.
4. Le Petit Fourmiller.

SECTION II.

II. *Genre du Pholidote.*

1. Le Pholidote.
2. Le Pholidote à longue queue.

ORDRE II.
SECTION I.

III. *Genre du Pareſſeux.*

1. Le Pareſſeux.
2. Le Pareſſeux de Ceylan.

SECTION II.

IV. *Genre de l'Armadille.*

1. L'Armadille.
2. L'Armadille Oriental.
3. L'Armadille des Indes.
4. L'Armadille du Mexique.
5. L'Armadille du Bréſil.
6. L'Armadille de Cayenne.
7. L'Armadille d'Afrique.

ORDRE III.

V. *Genre de l'Elephant.*

1. L'Elephant.

VI. *Genre de la Vache-Marine.*

1. La Vache-Marine.
2. Le Lamantin.

ORDRE IV.

VII. *Genre du Chameau.*

1. Le Chameau.
2. Le Dromadaire.
3. Le Chameau du Perou.
4. La Vigogne.

ORDRE V.
SECTION I.

VIII. *Genre de la Giraffe.*

1. La Giraffe.

IX. *Genre du Bouc.*

1. Le Bouc. La Chevre domeſtique.
2. La Chevre d'Angora.
3. Le Bouc-Eſtain.
4. La Petite Chevre d'Amérique.
5. Le Petit Chamois d'Amérique.
6. Le Chamois, ou l'Yzard.
7. La Gazelle des Indes.
8. La Gazelle.
9. La Gazelle du Bezoar.

Pp

10. La Gazelle d'Afrique.
11. La Gazelle de la Nouvelle Eſpagne.
12. La Chevre du Levant.
13. La Chevre de Sirie.
14. La Chevre de la Nouvelle Eſpagne.
15. La Chevre de Créte.

X. *Genre du Bellier.*

1. La Brebis Domeſtique.
2. La Brebis à large queue.
3. La Brebis à longue queue.
4. La Brebis d'Afrique.
5. La Brebis de Guinée.

XI. *Genre du Bœuf.*

1. Le Bœuf Domeſtique.
2. Le Buffle d'Afrique.
3. L'Aurochs.
4. Le Buffle.
5. Le Biſon blanc.
6. Le Biſon.
7. Le Biſon d'Amérique.
8. Le Bœuf ſauvage.

SECTION II.

XII. *Genre du Cerf.*

1. Le Cerf.
2. Le Cerf d'Allemagne.
3. Le Cerf de Canada.
4. Le Cerf de Groënland.
5. Le Chevreuil.
6. Le Karibou.
7. Le Daim.
8. Le Rhenne.
9. L'Elan.

SECTION III.

XIII. *Genre du Chevrotain.*

1. Le Chevrotain des Indes.
2. Le Chevrotain de Guinée.
3. Le Chevrotain de Surinam.
4 Le Chevrotain d'Afrique.
5. Le Muſc.

ORDRE VI.

XIV. *Genre du Cheval.*

1. Le Cheval.
2. Le Zébre, ou l'Âne rayé.
3. L'Aſne.
4. Le Mulet.
5. L'Aſne ſauvage.

ORDRE VII.

XV. *Genre du Cochon.*

1. Le Cochon Domeſtique.
2. Le Cochon de la Chine.
3. Le Sanglier.
4. Le Cochon de Guinée.
5. Le Sanglier des Indes Orientales.
6. Le Sanglier du Mexique.

ORDRE VIII.

XVI. *Genre du Rhinoceros.*

1. Le Rhinoceros.

ORDRE IX.

XVII. *Genre du Cabiai.*

1. Le Cabiai.

ORDRE X.

XVIII. *Genre du Tapir, ou Manipouris.*

1. Le Tapir, ou Manipouris.

ORDRE XI.

XIX. *Genre de l'Hippopotame.*

1. L'Hippopotame.

ORDRE XII.

SECTION I.

XX. *Genre du Porc-Epic.*

1. Le Porc-Epic.
2. Le Porc-Epic de la Nouvelle Eſpagne.
3. Le Porc-Epic de la Baye de Hudſon.
4. Le Porc-Epic d'Amérique.
5. Le Grand Porc-Epic d'Amérique
6. Le Porc-Epic des Indes Orientales.

SECTION II.

XXI. *Genre du Caſtor.*

1. Le Caſtor, ou le Biévre.
2. Le Caſtor blanc.
3. Le Rat muſqué.
4. Le Rat muſqué de Canada.

XXII. *Genre du Liévre.*

1. Le Liévre.
2. Le Liévre blanc.
3. Le Liévre noir.
4. Le Lapin de notre pays.
5. Le Riche.
6. Le Lapin d'Angora.
7. Le Liévre du Bréſil.

XXIII. *Genre du Lapin.*

1. Le Lapin de Java.
2. L'Agouty.
3. Le Lapin d'Amérique.
4. Le Pak.
5. Le Lapin de Norvege.
6. Le Lapin d'Allemagne.
7. Le Lapin des Indes.
8. Le Lapin du Bréſil.

XXIV. *Genre de l'Ecureuil.*

1. L'Ecureuil.
2. L'Ecureuil blanc de Siberie.
3. L'Ecureuil noir.
4. L'Ecureuil varié.
5. L'Ecureuil d'Amérique.
6. L'Ecureuil de Virginie.
7. L'Ecureuil du Bréſil.
8. L'Ecureuil de la Nouvelle Eſpagne.
9. L'Ecureuil de la Caroline.
10. L'Ecureuil Palmiſte: *vulgairement* Rat Palmiſte.
11. L'Ecureuil de Barbarie.
12. L'Ecureuil volant.
13. L'Ecureuil volant de Siberie.
14. L'Ecureuil volant de Virginie.

XXV. *Genre du Loir.*

1. Le Loir.
2. Le Lérot.
3. Le Croque-noix.
4. La Marmotte de Bahama.
5. La Marmotte d'Amérique.
6. La Marmotte de Pologne.
7. La Marmotte des Alpes.
8. La Marmotte de Straſbourg.

XXVI. *Genre du Rat.*

1. Le Rat.
2. La Souris.
3. Le Rat de bois.
4. Le Grand Rat des champs.
5. La Souris d'Amérique.
6. Le Rat d'Amérique.
7. Le Rat blanc de Virginie.
8. Le Rat de Norvege.
9. Le Mulot.
10. Le Rat Oriental.
11. Le Rat d'eau.
12. Le Petit Rat des champs.

SECTION III.

XXVII. *Genre de la Muſaraigne.*

1. La Muſaraigne.
2. La Muſaraigne du Bréſil.

SECTION IV.

XXVIII. *Genre du Hériſſon.*

1. Le Hériſſon.

2. Le Hériſſon de Siberie.
3. Le Hériſſon de Malacca.
4. Le Hériſſon d'Amérique.

ORDRE XIII.

SECTION I.

XXIX. *Genre du Singe.*

Race I. Le Singe.
1. Le Singe.
2. L'Homme des bois.
3. Le Singe de Ceylan.

Race II. Le Singe Cynocéphale.
1. Le Singe Cynocéphale.
2. Le Singe Cynocéphale de Ceylan.

Race III. Le Babouin.
1. Le Babouin.

Race IV. Le Cercopithéque.
1. Le Sapajou brun.
2. Le Sapajou noir.
3. Le Sapajou cornu.
4. Le Sapajou à queue de Renard.
5. Le Petit Singe Négre.
6. Le Singe de Guinée.
7. Le Singe muſqué.
8. Le Sapajou jaune.
9. Le Singe varié.
10. Le Tamarind.
11. Le Petit Singe-Lion.
12. Le Petit Singe de Para.
13. Le Singe à queue de Rat.
14. Le Sagouin.
15. Le Singe à queue de Lion.
16. Le Singe-Lion.
17. Le Singe verd.
18. Le Grand Singe de la Cochinchine.
19. Le Singe de Guinée à barbe jaunâtre.
20. Le Singe roux de Cayenne.
21. Le Singe blanc à barbe noire.
22. Le Singe noir à barbe blanche.
23. Le Singe de Guinée à barbe blanche.
24. Le Singe barbu.
25. Le Singe barbu à queue de Lion.
26. Le Singe noir d'Egypte.
27. Le Singe roux d'Egypte.
28. Le Petit Singe du Mexique.
29. Le Belzébut.

Race V. Le Cercopithéque Cynocéphale.
1. Le Cercopithéque Cynocéphale.
2. Le Makaque.
3. Le Magot, ou Tartarin.

SECTION II.

XXX. *Genre de la Rouſſette.*
1. La Rouſſette.
2. La Rouſſette à col rouge.
3. La Rouſſette à longues oreilles.

ORDRE XIV.

SECTION I.

XXXI. *Genre du Maki.*
1. Le Maki.
2. Le Maki aux pieds blancs.
3. Le Maki aux pieds fauves.
4. Le Maki à queue annelée.

SECTION II.

XXXII. *Genre de la Chauve-Souris.*
1. La Grande Chauve-Souris de notre pays.
2. La Petite Chauve-Souris de Ternate.
3. La Petite Chauve-Souris de notre pays.
4. La Grande Chauve-Souris de Ternate.
5. La Chauve-Souris rouſſe d'Amérique.
6. La Chauve-Souris d'Amérique.

ORDRE XV.

XXXIII. *Genre du Phocas.*

1. Le Phocas, ou Veau-Marin.

ORDRE XVI.

SECTION I.

XXXIV. *Genre de l'Hyene.*

1. L'Hyene.

XXXV. *Genre du Chien.*

1. Le Chien.
2. Le Loup.
3. Le Loup doré.
4. Le Loup du Mexique.
5. Le Renard.
6. Le Renard croiſé.
7. Le Renard gris.
8. Le Renard blanc.

XXXVI. *Genre de la Belette.*

1. La Belette.
2. L'Hermine.
3. Le Furet.
4. Le Furet des Indes.
5. Le Furet de Java.
6. Le Viſon.
7. La Fouine.
8. La Marte.
9. La Marte Zibeline.
10. Le Putois.
11. Le Putois rayé.
12. L'Ichneumon, ou la Mangouſte; *vulgairement*, le Rat de Pharaon.
13. La Genette.

XXXVII. *Genre du Blaireau.*

1. Le Blaireau, ou Taiſſon.
2. Le Blaireau blanc.
3. Le Blaireau du Surinam.
4. La Civette.

XXXVIII. *Genre de l'Ours.*

1. L'Ours.
2. L'Ours blanc.
3. L'Ours de la Baye de Hudſon.
4. Le Coati.
5. Le Coati-Mondi.
6. Le Coati-Mondi à queue annelée.

XXXIX. *Genre du Chat.*

1. Le Chat Domeſtique.
2. Le Chat ſauvage.
3. Le Chat ſauvage tigré.
4. Le Chat d'Angora.
5. Le Lion.
6. Le Tigre.
7. Le Tigre Royal.
8. Le Tigre d'Amérique.
9. Le Tigre Noir.
10. Le Tigre-Barbet, ou le Tigre friſé.
11. Le Tigre rouge.
12. Le Leopard.
13. Le Chat-Pard.
14. Le Chat-Cervier.
15. Le Loup-Cervier.

SECTION II.

XL. *Genre de la Loutre.*

1. La Loutre.
2. La Loutre du Bréſil.

ORDRE XVII.

XLI. *Genre de la Taupe.*

1. La Taupe.
2. La Taupe blanche.
3. La Taupe variée.
4. La Taupe de Virginie.
5. La Taupe rouge d'Amérique.
6. La Taupe dorée de Siberie.

ORDRE XVIII.

XLII. *Genre du Philandre.*

1. Le Philandre.

2. Le Philandre Oriental.
3. Le Philandre d'Amboine.
4. Le Philandre du Bréſil.
5. Le Philandre d'Amérique.
6. Le Philandre d'Afrique.
7. Le Philandre de Surinam.
8. Le Philandre à groſſe tête.
9. Le Philandre à courte queue.

TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre: la lettre R, la Race: & la lettre E, l'Eſpece.

A.

	G.	E.
Agneau,	10	1.
Agouti,	23	2.
Agouty,	23	2.
Aſne,	14	3.
— Rayé,	14	2.
— Sauvage,	14	2.
—	14	5.
Armadille,	4.	
—	4	1.
— D'Afrique,	4	7.
— Du Bréſil,	4	5.
— De Cayenne,	4	6.
— Des Indes,	4	3.
— Du Mexique,	4	4.
— Oriental,	4	2.
Aurochs,	11	3.

B.

	G.	R.	E.
Babouin,	29	3.	
—	29	3	1.
Belette,	36		
—	36		1.
Bellier,	10		
—	10		1.
Belzébut,	29	4	29.
Bête à la grande dent,	6		1.
Biche,	12		1.
— Des Bois,	12		5.
— Des Paletuviers,	12		5.
Biévre,	21		1.
Biſon,	11		6.
— Amériquain,	11		7.
— D'Amérique,	11		7.
— Blanc,	11		5.
Blaireau,	37.		
—	37		1.
— Blanc,	37		2.
— De Surinam,	37		3.
Bœuf,	11.		
—	11		1.
— Domeſtique,	11		1.
— Marin,	6		2.
— Sauvage,	11		8.
Bouc,	9		
—	9		1.
Bouc-Eſtain,	9		3.
Brebis,	10		1.
— D'Afrique,	10		4.
— Domeſtique,	10		1.
— De Guinée,	10		5.
— A l'arge queue,	10		2.
— A longue queue,	10		3.
Buffle,	11		4.
—	11		7.
— D'Afrique,	11		2.

C.

	G.	R.	E.
Cabiai,	17.		
—	17		1.
Caſtor,	21.		
—	21		1.
— Blanc,	21		2.
Cercopithéque,	29	4.	
— Cynocéphale,	29	5.	
—	29	5	1.

	G.	E.
Cerf,	12.	
—	12	1.
— D'Allemagne,	12	2.
— De Canada,	12	3.
— De Groënland,	12	4.
Chameau,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Du Perou,	7	3.
Chamois,	9	6.
— (Petit) d'Amérique,	9	5.
Chat,	39.	
— D'Angora,	39	4.
— Cervier,	39	14.
— Domeſtique,	39	1.
— Epineux,	20	4.
— Pard,	39	13.
— Sauvage,	39	2.
— Sauvage tigré,	39	3.
— Tigre,	39	3.
Chauve-Souris,	32	
— D'Amérique,	32	6.
— (Grande) de notre pays,	32.	1.
— (Grande) de Ternate,	32	4.
— (Petite) de notre pays,	32	3.
— (Petite) de Ternate,	32	2.
— Rouſſe d'Amérique,	32	5.
Cheval,	14.	
—	14	1.
— Marin,	19	1.
— Ongre,	14	1.
Chevre,	9	1.
— D'Angora,	9	2.
— De Congo,	13	1.
— De Créte,	9	15.
— Domeſtique,	9	1.
— Du Levant,	9	12.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9	14.
— (Petite) d'Amérique,	9	4.
— Privée,	9	1.
— De Sirie,	9	13.

	G.	E.
Chevreau,	9	1.
Chevreuil,	12	5.
— Du Bréſil,	12	5.
Chevrotain,	13.	
— D'Afrique,	13	4.
— De Guinée,	13	2.
— Des Indes,	13	1.
— De Surinam,	13	3.
Chien,	35.	
—	35	1.
— Marin,	33	1.
— De mer,	33	1.
Chienne,	35	1.
Civette,	37	4.
Coati,	38	4.
— Mondi,	38	5.
—	38	6.
— Mondi à queue annelée,	38	6.
— Simplement dit,	38	4.
Cochon,	15.	
—	15	1.
— De la Chine,	15	2.
— Domeſtique,	15	1.
— D'Eau,	17	1.
— De Guinée,	15	4.
— d'Inde,	23	7.
— Noir,	15	6.
— De Terre,	1	1.
Croque-Noix,	25	3.

D.

	G.	E.
DAim,	12	7.
— D'Eſpagne,	12	7.
— De Groënlande,	12	4.
— De Virginie,	12	7.
Diable de Java,	2	1.
— De Tajoan,	2	2.
Dromadaire,	7	2.

E

	G.	E.
ECureuil,	24.	
—	24	1.

— D'Amérique,

	G.	E.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Siberie,	24	2.
— Du Bréſil,	24	7.
— De la Caroline,	24	9.
— (Grand) Gris,	24	6.
— Noir,	24	3.
— De la Nouvelle Eſpagne,	24	8.
— Palmiſte,	24	10.
— De Terre,	24	9.
— Varié,	24	4.
— De Virginie,	24	6.
— Volant,	24	12.
— Volant de Siberie,	24	13.
— Volant de Virginie,	24	14.
Elan,	9	7.
—	12	9.
Elant,	12	9.
Elephant,	5.	
—	5	1.

F.

	G.	E.
Faon,	12	1.
Fouine,	36	7.
Fourmiller,	1.	
—	1	2.
— Aux longues oreilles,	1	3.
— (Petit)	1	4.
— *Tamanoir*,	1	1.
Furet,	36	3.
— De Java,	36	5.
— Des Indes,	36	4.

G.

	G.	E.
Gazelle,	9	8.
— D'Afrique,	9	10.
— Du Bezoar,	9	9.
— Des Indes,	9	7.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9	11.
Genette,	36	13.
Giraffe,	8.	
—	8	1.

H.

	G.	R.	E.
Haſe,	22		1.
Hériſſon,	28.		
—	28		1.
— D'Amérique,	28		4.
— De Malacca,	28		3.
— De Siberie,	28		2.
Hermine,	36		2.
Hippopotame,	19.		
—	19		1.
Homme des bois,	29	1	2.
Hyene,	34.		
—	34		1.

I.

	G.	E.
Ichneumon,	36	12.
— De Yzquiepatl,	37	3.
Jument,	14	1.

K.

	G.	E.
Karibou,	12	6.

L.

	G.	E.
Lamantin,	6	2.
Lapin,	23.	
—	22	4.
— D'Allemagne,	23	6.
— D'Amérique,	23	3.
— D'Angora,	22	6.
— De Bahama,	25	4.
— Du Bréſil,	23	8.
— De Java,	23	1.
— Des Indes,	23	7.
— De Norvege,	23	5.
— De Notre pays,	22	4.
Lapreau,	22	4.
Laye,	15	3.
Leopard,	39	12.
Lérot,	25	2.
Lévraut,	22	1.
Lezard de Cluſius,	2	2.

	G.	E.
— Ecaillé,	2	1.
— Ecailleux,	2	1.
— Des Indes Orientales,	2	2.
Liévre,	22.	
—	22	1.
— Blanc,	22	2.
— Du Bréſil,	22	7.
— De Java,	23	1.
— Noir,	22	3.
Lion,	39	5.
Lionne,	39	5.
Loir,	25.	
—	25	1.
Loup,	35	2.
— Cervier,	36	15.
— Doré,	35	3.
— Marine,	33	1.
— Du Mexique,	35	4.
— Tigre,	39	10.
Loutre,	40.	
—	40	1.
—	40	2.
— Du Bréſil,	40	2.
Louve,	35	2.
Louveteau,	35	2.
—	38	3.
Linx,	39	15.

M.

	G.	R.	E.
Magot,	29	5	3.
Makaque,	29	5	2.
Maki,	31.		
—	31		1.
— Aux pieds blancs,	31		2.
— Aux pieds fauves,	31		3.
— A queue annelée,	31		4.
Mange-Fourmis,	1		1.
Mangeur de Fourmis,	1		2.
— (Gros)	1		1.
— (Petit)	1		4.
Mangouſte,	36		12.
Manicou,	42		1.
Manipouris,	18.		
—	18		1.

	G.	E.
Marcaſſin,	15	3.
Marmotte,	25	7.
— Des Alpes,	25	7.
— Amériquaine,	25	5.
— D'Amérique,	25	5.
— De Bahama,	25	4.
— De Pologne,	25	6.
— De Straſbourg,	25	8.
Marte,	36	8.
— Zibeline,	36	9.
Mouton,	10	1.
— De Perou,	7	3.
Mule,	14	4.
Mulet,	14	4.
Mulot,	26	9.
Muſaraigne,	27.	
—	27	1.
— Du Bréſil,	27	2.
Muſc,	13	5.

O.

	G.	E.
ORignal,	12	9.
Ours,	38.	
—	38	1.
— De la Baye de Hudſon,	38	3.
— Blanc,	38	2.
— (Petit)	38	3.

P.

	G.	E.
PAk,	23	4.
Panthere,	39	12.
Pareſſeux,	3.	
—	3	1.
— De Ceylan,	3	2.
Philandre,	42.	
—	42	1.
— D'Afrique,	42	6.
— D'Amboine,	42	3.
— D'Amérique,	42	5.
— Du Bréſil,	42	4.
— A courte queue,	42	9.
— A Groſſe tête,	42	8.

	G.	E.
— Oriental,	42	2.
— De Surinam,	42	7.
Phocas,	33.	
—	33	1.
Pholidote,	2.	
—	2	1.
— A longue queue,	2	2.
Porc,	15	1.
Porc-Epic,	20.	
—	20	1.
— D'Amérique,	20	4.
— De l'Amérique Septentrionale,	20	3.
— De la Baye de Hudſon,	20	3.
— (Grand) d'Amérique,	20	5.
— Des Indes Orientales,	20	6.
— De la Nouvelle Eſpagne,	20	2.
Porte-Corne,	16	1.
Poulain,	14	1.
Puant,	42	1.
Putois,	36	10.
—	36	11.
— Rayé,	36	11.

R.

	G.	E.
Rat,	26.	
—	26	1.
— D'Amérique,	26	6.
— Blanc de Virginie,	26	7.
— De Bois,	26	3.
— D'Eau,	26	11.
— (Grand) des Champs,	26	4.
— Muſqué,	21	3.
—	21	4.
— Muſqué de Canada,	21	4.
— De Norvege,	26	8.
— Oriental,	26	10.
— Palmiſte,	24	10.
— (Petit) des Champs,	26	12.
— De Pharaon,	36	12.
— De Pont,	24	12.
— De Tartarie,	24	12.

	G.	E.
Renard,	35	5.
— Amériquain,	1	1.
— Blanc,	35	8.
— Croiſé,	35	6.
— Gris,	35	7.
Rhenne,	12	8.
Rhinoceros,	16.	
—	16	1.
Riche,	22	5.
Rouſſette,	30.	
—	30	1.
— A col rouge,	30	2.
— A longues oreilles,	30	3.

S.

	G.	R.	E.
Sagouin,	29	4	14.
Sanglier,	15		3.
— Appellé *Pecaris*,	15		6.
— Des Indes Orientales,	15		5.
— Du Mexique,	15		6.
Sapajou Brun,	29	4	1.
— Cornu,	29	4	3.
— Jaune,	29	4	8.
— Noir,	29	4	2.
— A queue de Renard,	29	4	4.
Singe,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Barbu,	29	4	24.
— Barbu à queue de Lion,	29	4	25.
— Blanc à barbe noire,	29	4	21.
— De Ceylan,	29	1	3.
— Cynocéphale,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocéphale de Ceylan,	29	2	2.
— [Grand] de la Cochinchine,	29	4	18.
— De Guinée,	29	4	6.
— De Guinée à barbe blanche,	29	4	23.
— De Guinée à barbe jaunâtre,	29	4	19.

	G.	R.	E.
— Lion,	29	4	16.
— Muſqué,	29	4	7.
— Noir à barbe blanche,	29	4	22.
— Noir d'Egypte,	29	4	26.
— [Petit] Lion,	29	4	11.
— [Petit] du Mexique,	29	4	28.
— [Petit] Negre,	29	4	5.
— [Petit] de Para,	29	4	12.
— A queue de Lion,	29	4	15.
— A queue de Rat,	29	4	13.
— Rouge,	29	4	20.
— Rouge de Cayenne,	29	4	20.
— Roux d'Egypte,	29	4	27.
— Varié,	29	4	9.
— Verd,	29	4	17.
Souris,	26		2.
— D'Amérique,	26		5.

T.

	G.	R.	E.
TAiſſon,	37		1.
Tamanoir,	1		1.
Tamarind,	29	4	10.
Tapir,	18.		
—	18		1.
Tartarin,	29	5	3.
Taupe,	41.		
—	41		1.
— Blanche,	41		2.
— Dorée de Siberie,	41		6.
— Rouge d'Amérique,	41		5.
— Variée,	41		3.
— De Virginie,	41		4.
Taureau,	11		1.
Tigre,	39		6.

	G.	E.
—	39	8.
—	39	11.
— D'Amérique,	39	8.
— Barbet,	39	10.
— (Eſpece de),	39	9.
— Friſé,	39	10.
— De la grande eſpece,	39	7.
— (Gros) de la Guiane,	39	8.
— (Loup)	39	10.
— Noir,	39	9.
— Rouge,	39	11.
— Royal,	39	7.
Truye,	15	1.

V.

	G.	E.
VAche,	11	1.
— Marine,	6.	
—	6	1.
Veau,	11	1.
— Marin,	33.	
—	33	1.
— De Mer,	33	1.
Verrat,	15	1.
Vigogne,	7	4.
Viſon,	36	6.

Y.

	G.	E.
YZard,	9	6.

Z.

	G.	E.
ZÉbre,	14	2.

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus deſignat; Litteræ ST, Stirpem, & Littera S, Speciem.

A.

	G.	ST.	S.
ABada,	16		1.
Acanthio terreſtris,	28		1.
Acanthion aculeis longiſſimis,	28		3.
— Cauda prælonga &c,	20		6.
— Criſtatus,	20		1.
— Echinatus,	28		2.
—	28		4.
— Vulgaris noſtras,	28		1.
Acbar,	26		2.
Acbera,	26		2.
Acuti,	23		2.
Adil,	35		3.
Æber,	15		1.
Ælg,	12		9.
Afi,	29	1	1.
Africana,	39		12.
Agarone,	10		1.
Agilis,	35		1.
Agna,	10		1.
Agneau,	10		1.
Agnello,	10		1.
Agno,	10		1.
Agnus,	10		1.
Agouti,	23		2.
Agouty,	23		2.
Aguti,	23		2.
Ahu,	9		6.
Ai.	3		1.
Aial,	12		1.
Aiala,	12		1.
Aiatochtli,	4		5.

	G.	ST.	S.
Aiela,	12		1.
Aielet,	12		1.
Ail,	10		1.
Αἴλουρος,	39		1.
Αἴξ,	9		1.
Akbar,	25		1.
Akbera,	25		1.
Alaoüata,	29	4	20.
Alce,	12		9.
— Vera & legitima,	12		9.
Alces,	12		9.
Aleph,	11		1.
Algazel,	9		8.
— Ex Aphrica,	9		10.
Αλκη,	12		9.
Αλωπηξ,	35		5.
Ana,	10		1.
Ane,	14		3.
— Rayé,	14		2.
— Sauvage,	14		2.
—	14		5.
Animal, (Aſiaticum)	35		3.
— Bezoarticum Orientale,	9		9.
— Caudimanum,	42		6.
— Cuncta prætentans manibus,	38		4.
— (Elegantiſſimum)	29	1	3.
— Ermineum recentiorum,	36		2.
— (Exoticum)	4		3.
— Magnum,	12		9.
— Moſchiferum,	13		5.

	G.	ST.	S.
— Ex Moſcovia,	21		3.
Muſci,	13		5.
— Necrophagum,	34		1.
— Zibethi,	37		4.
— Zibethicum,	37		4.
Animalculum Cynocephalum Ceylonicum,	29	2	2.
Anſe,	9		1.
Anſeb,	32		1.
Ant-Bear, (Great)	1		1.
— [Leſſer]	1		2.
Anta,	18		1.
Aouaré,	42		1.
Ape,	29	1	1.
Aper,	15		3.
— Agreſtis,	15		3.
— Indicus,	15		5.
—	15		6.
— Mexicanus,	15		6.
— Mexicanus Moſchiferus,	15		6.
— Orientalis,	15		5.
Aperea,	23		8.
Arctomys Paleſtinæ,	25		8.
Arctopithecus,	3		1.
—	29	3	1.
Ari,	39		5.
Ariavan,	39		5.
Ariech,	39		5.
Aries,	10.		
—	10		1.
— Albus Judeorum,	10		5.
— Cretenſis,	9		15.
— Cretenſis Strepſiceros,	9		15.
— Guineenſis,	10		5.
— Orientalis,	10		2.
Ariete,	10		1.
Ἄρκτος,	38		1.
Armadille,	4.		
—	4		1.
— D'Afrique,	4		7.
— Du Bréſil,	4		5.
— De Cayenne,	4		6.

	G.	S.
— Des Indes,	4	3.
— Du Mexique,	4	4.
— Oriental,	4	2.
Armadillo,	4	1.
—	4	2.
—	4	4.
—	4	5.
—	4	6.
— Africanus,	4	7.
— Braſilianus,	4	5.
— Guianenſis,	4	6.
— Indicus,	4	3.
— Mexicanus,	4	4.
— Nothus,	4	7.
— Orientalis,	4	2.
— (Weſle-Headed)	4	1.
Armelino,	36	2.
Armodillo,	2	1.
— Africanus,	4	7.
— Americanus,	4	6.
— Orientalis,	4	2.
Armodillus ſquamatus major,	2	1.
Arneba,	22	1.
Arnebet,	22	1.
Arneph,	22	1.
Aroe, [Pelandor]	42	2.
Aſad,	39	5.
Aſbecha,	14	1.
Aſiaticum Animal,	35	3.
Aſiniferus,	14	5.
Aſinus,	14	3.
— Biformis,	14	4.
— Domeſticus,	14	3.
— Hybridus,	14	4.
— Sylveſtris,	14	5.
Aſna,	14	3.
Aſno,	14	3.
Aſpalax,	41	6.
Ἀσπάλαξ,	41	1.
Aſs, (Wild)	14	5.
Aſſapanick,	24	12.
Aſſe,	14	3.
Ataleph,	32	1.
Atalepha,	32	1.

	G.	ST.	S.
Aver-Ochs,	11		3.
Aurochs,	11		3.
Ayotochtli,	4		4.

B.

	G.	ST.	S.
Babi-Roeſa,	15		5.
Babian,	29	3	1.
Babio,	29	3	1.
Baboon,	29	3	1.
Babouin,	29	3.	
—	29	3	1.
Babuino,	29	3	1.
Babyrouſſa,	15		5.
Bactrianus,	7		1.
Badger,	37		1.
Bäffwer,	21		1.
Baiel,	14		1.
Bakar,	11		1.
Ballottula,	36		1.
Baphas,	32		1.
Bär,	38		1.
Barah,	10		1.
Barbaſtello,	32		1.
Bardato,	4		4.
Barg,	15		1.
Baris,	29	1	2.
Barrus,	5		1.
Bat,	32		1.
Baviaan,	29	3	1.
Bauwol,	11		4.
Bawol,	11		4.
Beal,	14		4.
Bear,	38		1.
Beaver,	21		1.
Beccho,	9		1.
Beer,	38		1.
Behemot,	19		1.
Belbus,	34		1.
Belette,	36.		
—	36		1.
Bellier,	10.		
—	10		1.
Belzébut,	29	4	29.
Benula,	36		1.

	G.	S.
Beſangerah,	22	4.
Beſchet,	7	1.
Bête à la grande dent,	6	1.
Bevaro,	21	1.
Bever,	21	1.
Bevero,	21	1.
Biber,	21	1.
Biche,	12	1.
— Des Bois,	12	5.
— Des Paletuviers,	12	5.
Bicho Vergonhoſo,	2	2.
Bievre,	21	1.
Biörn,	38	1.
Biſem-Muſs,	27	1.
Biſemreech,	13	5.
Biſemthier,	13	5.
Biſon,		6.
— Amériquain,	1	7.
— D'Amérique,	11	7.
— Blanc,	11	5.
Biſon,	11	3.
—	11	6.
— Albus,	11	5.
— Albus Calydonius,	11	5.
— Albus Scoticus,	11	5.
— Americanus,	11	7.
— Indicus,	11	7.
— Jubatus,	11	6.
— Scoticus,	11	5.
Βισων,	11	6.
Bivaro,	21	1.
Blaireau,	37.	
—	37	1.
— Blanc,	37	2.
— De Surinam,	37	3.
Blåräf,	35	8.
Blerellus,	37	1.
Boar,	15	1.
— (Wild)	15	3.
Bobak,	25	6.
Bobr,	21	1.
Bock,	9	1.
Bœuf,	11.	
—	11	1.
— Domeſtique,	11	1.

	G.	S.
— Marin,	6	2.
— Sauvage,	11	8.
Bomarin,	19	1.
Βόνασος,	11	8.
Bonaſus,	11	8.
Boophagus,	34	1.
Borſuk,	37	1.
Bos,	11.	
—	11	1.
— Africanus Bellonii,	11	2.
— Domeſticus,	11	1.
— (Elegans & Parvus Africanus)	11	2.
— (Exiguus Africanus)	11	2.
Boſchratte,	23	8.
—	42	4.
Βούβαλος,	11	4.
Bouc,	9.	
—	9	1.
Bouc-Eſtain,	9	3.
Bove Marino,	33	1.
Βοῦς,	11	1.
Bradypus &c,	3.	
Bandhirts,	12	2.
Brebis,	10	1.
— D'Afrique,	10	4.
— Domeſtique,	10	1.
— De Guinée,	10	5.
— A large queue,	10	2.
— A longue queue,	10	3.
Brock,	37	1.
Bubalus,	11	2.
—	11	4.
— Africanus,	11	2.
— Veterum,	11	2.
— Vulgaris,	11	4.
Büch Marder,	36	7.
Buck,	12	7.
Bue,	11	1.
Buey,	11	1.
— (Pege)	6	2.
Bufalo,	11	4.
Bufano,	11	4.
Buffel,	11	4.
— (Wilde)	11	8.

	G.	S.
Buffelus,	11	4.
Buffes,	11	3.
Buffle,	11	4.
—	11	7.
— D'Afrique,	11	2.
Bugill,	11	4.
Buk,	15	1.
Bulges,	11	3.
Bull,	11	1.
Buntſing,	36	10.
Buo Marino,	33	1.
Bupotamus,	19	1.
Burro do Matto,	14	2.
Buſan,	9	1.
Buyrezio,	11	1.
Buz,	9	1.

C.

	G.	ST.	S.
Caaigoara,	15		6.
Caballus Marinus,	19		1.
Cabiai,	17.		
—	17		1.
Cabionara,	17		1.
Cabra,	9		1.
Cabrito,	9		1.
Cabron,	9		1.
Cabronzillo Montés,	12		5.
Cachorro Domato,	42		4.
Cagui Major,	29	4	10.
— Minor,	29	4	14.
Caitaia,	29	4	7.
—	29	4	14.
Caitaja,	29	4	7.
Caldah,	36		1.
Calf,	11		1.
—	12		1.
— (Sea)	33		1.
Camel,	7		1.
—	7		2.
Camello,	7		1.
Camelo Congener,	7		4.
Camelopardalin,	8		1.
Camelopardalis,	8		1.
Camelopardalus,	8		1.

Camelus,

	G.	S.
Camelus,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Arabica,	7	2.
— Dromas,	7	2.
— Indicus,	8	1.
— Laniger,	7	4.
— Minimus,	7	2.
— Peruanus,	7	3.
—	7	4.
— Spurius,	7	3.
Camorcia,	9	6.
Campagnoli,	26	4.
—	26	12.
Camuza,	9	6.
Cane,	35	1.
Canicula aquatica,	40	1.
Canis,	35.	
—	35	1.
— Domeſticus,	35	1.
— Fluviatilis,	40	1.
— Pilis cervicis erectis, &c,	34	1.
— Ponticus,	21	1.
— Sylveſtris,	35	2.
— Volans ex Novâ Hiſpania,	30	3.
— Volans Ternatanus Orientalis,	30	1.
Caper,	9	1.
— Mambrinus,	10	5.
— Montanus Alberti,	9	3.
Capra,	9	1.
— &c,	13	1.
—	13	4.
— Bezaartica,	9	9.
— Bezoartica,	9	9.
— Cretenſis,	9	15.
— Domeſtica,	9	1.
— Fera Varroni,	9	3.
— Indica,	9	13.
— Mambrina,	9	13.
— Montés,	9	6.
— Moſchi,	13	5.
— Novæ Hiſpaniæ,	9	14.

	G.	ST.	S.
— Orientalis,	9		12.
— Parva Americana,	9		4.
— Pazahartica,	9		9.
— Strepſiceros,	9		8.
— Sylveſtris Africana,	13		4.
— Syriaca,	9		13.
Caprea,	9		6.
—	12		5.
— Groenlandica,	12		4.
— Plinii,	12		5.
Capreolus,	12		5.
— Braſilianus,	12		5.
— Marinus,	12		5.
— Moſchi,	13		5.
Capricerva,	9		9.
Capricornus,	9		3.
Capriola,	12		5.
Capriolo,	12		5.
— Del Muſco,	13		5.
Capybara,	17		1.
Care,	14		3.
Carigoy,	42		1.
Carigue,	42		1.
Cariguebeju,	40		2.
Carigueibeju,	40		2.
Carigueya,	42		1.
— Braſilienſis,	42		1.
Carnero,	10		1.
Carnevoca,	26		2.
Carygueibeju,	40		2.
Caſtor,	21.		
—	21		1.
— Blanc,	21		2.
Caſtor,	21.		
—	21		1.
— Albus,	21		2.
— Cauda lineari tereti,	26		11.
Cat,	39		1.
— (Civet)	37		4.
— A Mountain,	39		13.
Cataph,	29	1	1.
Cataphractus,	4.		
Catharet,	36		10.
Çatul,	39		1.

	G.	ST.	S.
Catus,	39		1.
— Cervarius,	39		14.
— Domeſticus,	39		1.
— Feralis,	39		2.
— Hiſpaniæ,	36		13.
— Montanus Americanorum,	39		13.
— Pardus,	39		13.
— Pardus Mexicanus,	39		13.
— Sylveſtris,	39		2.
— Sylveſtris ferus,	39		2.
— *Tepe Maxtlaton* dictus,	39		3.
— Tigrinus,	39		3.
— Zibethi,	37		4.
— Zibethicus,	37		4.
Cavallo,	14		1.
Cavia Aguti,	23		2.
— Aperea,	23		8.
— Bahamenſis,	25		4.
— Cobaya,	22		7.
—	23		7.
— Hudſonis,	20		3.
— Javenſis,	23		1.
— Paca,	23		4.
— Surinamenſis,	23		3.
Cavretto,	9		1.
Cavriola,	12		5.
Cavriolo,	12		5.
Cay,	29	4	5.
Cebalus,	36		9.
Cebus Angolenſis major,	29	5	2.
— Barbatus,	29	4	23.
— Barbatus alius Guineenſis,	29	4	19.
— Barbatus primus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	24.
— Caput mortuum,	29	4	13.
— Elaurandus,	29	4	21.
— Guariba,	29	4	2.
— Imberbis primus Cluſii,	29	4	15.

	G.	ST.	S.
— Imberbis ſecundus Cluſii,	29	4	16.
— Moſchum redolens Braſilienſis,	29	4	7.
— Papio,	29	3	1.
— *Sagouin* dictus,	29	4	14.
— Simiolus Ceylonicus,	29	4	8.
— Tertius Guineenſis,	29	4	6.
Cenalfa,	5		1.
Cercopithecus,	29	4.	
—	29	5	1.
— Americanus minor,	29	4	13.
— Angolenſis major,	29	5	1.
— Barbatus alius Guineenſis,	29	4	19.
— Barbatus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus Guineenſis,	29	4	23.
— Barbatus maximus &c,	29	4	20.
— Barbatus primus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	24.
— Braſilianus primus,	29	4	7.
— Braſilianus ſecundus,	29	4	5.
— Braſilianus tertius,	29	4	14.
— *Caitaja* dictus,	29	4	7.
— Ceylonicus,	29	1	3.
— Cynocephalus,	29	5.	
— *Guariba* dictus,	29	4	2.
— Guineenſis alius,	29	4	6.
— Guineenſis tertius,	29	4	6.
— Meerkatz,	29	4	2.
— Minimus &c,	29	4	10.
— Minor luteus,	29	4	8.
— *Monkje* dictus,	29	4	13.
— Moſcatus,	29	4	7.
— Niger &c,	29	4	22.
— Non Barbatus primus Cluſii,	29	4	15.
— Non Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	16.
— Sagouin,	29	4	14.
Cercopithéque,	29	4.	
— Cynocéphale,	29	5.	
—	29	5	1.

	G.	S.
Cerf,	12.	
—	12	1.
— D'Allemagne,	12	2.
— De Canada,	12	3.
— De Groënland.	12	4.
Cerva,	12	1.
— Parvula Africana,	13	1.
Cervo,	12	1.
Cervula Africana,	13	1.
— Subrubra,	13	3.
— Surinamenſis ſubrubra,	13	3.
Cervulus,	12	5.
Cervus,	12.	
—	9	14.
—	12	1.
— Africanus,	13	2.
— Burgundicus,	12	6.
— Canadenſis,	12	3.
— Cornibus ſimpliciſſimis,	8	1.
— Cornutus ex Nova Hiſpania,	9	14.
— Germanicus,	12	2.
— Groenlandicus,	12	4.
— Juvencus pergracilis Africanus,	13	1.
— Juvencus perpuſillus Guineenſis,	13	1.
— Major &c,	12	5.
— Minimus,	12	5.
— Minor &c,	12	5.
— Mirabilis,	12	8.
— Nobilis,	12	1.
— Odoratus,	13	5.
— Palmatus,	12	7.
—	12	8.
—	12	9.
— Platyceros,	12	7.
— Rangifer,	12	8.
— Temamaçama,	9	11.
Chameau,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Du Perou,	7	3.

	G.	S.
Chamois,	9	6.
— (Petit) d'Amérique,	9	5.
Chamor,	14	3.
Chaſir,	15	1.
Chaſira,	15	1.
Chat,	39.	
— D'Angora,	39	4.
— Cervier,	39	14.
— Domeſtique,	39	1.
— Epineux,	20	4.
— Pard,	39	13.
— Sauvage,	39	2.
— Sauvage Tigré,	39	3.
— Tigre,	39	3.
Chaus,	39	15.
Chauve-Souris,	32.	
— D'Amérique,	32	6.
— [Grande] de notre pays,	32	1.
— (Grande) de Ternate,	32	4.
— (Petite) de notre pays,	32	3.
— (Petite) de Ternate,	32	2.
— Rouſſe d'Amérique,	32	5.
Cheval,	14.	
—	14	1.
— Marin,	19	1.
— Ongre,	14	1.
Chevre,	9	1.
— D'Angora,	9	2.
— De Congo,	13	1.
— De Créte,	9	15.
— Domeſtique,	9	1.
— Du Levant,	9	12.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9	14.
— (Petite) d'Amérique,	9	4.
— Privée,	9	1.
— De Sirie,	9	13.
Chevreau,	9	1.
Chevreuil,	12	5.
— Du Bréſil,	12	5.
Chevrotain,	13.	
— D'Afrique,	13	4.
— De Guinée,	13	2.

	G.	ST.	S.
— Des Indes,	13		1.
— De Surinam,	13		3.
Chien,	35.		
—	35		1.
— Marin,	33		1.
— De Mer,	33		1.
Chienne,	35		1.
Chimpanrée,	29	1	2.
Chirquinchum,	4		4.
Choakamna,	29	3	1.
Χοίρος,	15		1.
— Ἄγριος,	15		3.
Chomik,	25		8.
Chulda,	36		1.
Chuldah,	36		1.
Cierva,	12		1.
Ciervo,	12		1.
Cinghiale,	15		3.
Cinghiare,	15		3.
Civet Cat,	37		4.
Civetta,	37		4.
Civette,	37		4.
Coati,	38		4.
— Mondi,	38		5.
—	38		6.
— Mondi à queue annelée,	38		6.
— Simplement dit,	38		4.
Coati,	38		4.
— Braſilienſium,	38		4.
— Cauda brevi,	37		1.
— Civetta,	37		4.
— Ginetta,	36		13.
— Griſeus,	37		1.
— Hernandeſii,	37		3.
— Urſulo affinis Americanus,	38		3.
Coaty,	1		4.
Cochon,	15.		
—	15		1.
— De la Chine,	15		2.
— Domeſtique,	15		1.
— D'Eau,	17		1.
— De Guinée,	15		4.
— D'Inde,	23		7.

	G.	E.
— Noir,	15	6.
— De Terre,	1	1.
Coes-Coes,	42	3.
Coja-Metl,	15	6.
Comadreia,	36	1.
Comozza,	9	6.
Conéio,	22	4.
Conepatl,	37	3.
Coniglio,	22	4.
Cony,	22	4.
Cordero,	10	1.
Corza,	12	7.
Cotia,	23	2.
Cow,	11	1.
Coyametl,	15	6.
Coyopollin,	42	6.
Cricetus,	25	8.
Croque-Noix,	25	3.
Cuandu,	20	4.
— Major,	20	5.
Cuati,	38	4.
Cudana,	14	4.
Cuetlachtli,	35	4.
Cuguacu-Apara,	12	5.
— Ara,	39	11.
— Arana,	39	11.
— Eté,	12	5.
Cuniculi Braſilienſis ſpecies,	22	7.
—	23	2.
—	23	4.
Cuniculus,	23.	
—	22	4.
— Americanus,	23	3.
— Americanus & Guineenſis,	23	7.
— Angorenſis,	22	6.
— Braſilienſis,	22	7.
—	23	8.
— Germanicus,	23	6.
— Javenſis,	23	1.
— Indicus,	23	7.
—	23	8.
— Indus,	23	7.
— Major paluſtris,	23	4.

	G.	ST.	S.
— Norvagicus,	23		5.
— Noſtras,	22		4.
— Omnium vulgatiſſimus,	23		2.
Cynocephalus,	29	5	3.
— Primus,	29	2	1.
— Secundus,	29	5	3.

D.

	G.	S.
DAbha,	34	1.
Dabuh,	34	1.
Dachs,	37	1.
Dahab,	34	1.
Daim,	12	7.
— D'Eſpagne,	12	7.
— De Groënlande,	12	4.
— De Virginie,	12	7.
Daino,	12	7.
Dam,	12	7.
Dama,	12	7.
— Cervus,	12	7.
— Hiſpanica,	12	7.
— Recentiorum,	12	7.
— Virginiana,	12	7.
— Vulgaris,	12	7.
Damhirſch,	12	7.
Damhirts,	12	7.
Dåmlin,	12	7.
Damula,	36	12.
Daniel,	12	7.
Danio,	12	7.
Dar,	37	1.
Daſypus &c,	4.	
— Cucurbitinus,	4	4.
Δασύπȣς,	22	4.
Deba,	8	1.
—	35	2.
Deeba,	35	2.
Deſman,	21	3.
Deſmanskatt,	36	13.
Diable de Java,	2	1.
— De Tajoan,	2	2.
Diabolus Tajovanicus,	2	1.

	G.	S.
Dib,	35	2.
Didelphis &c,	42.	
Dikerin,	10	1.
Dob,	38	1.
Doe,	12	7.
Dof,	12	7.
Dofhiort,	12	7.
Dog,	35	1.
Donnola,	36	1.
Donola,	36	12.
Dorcas,	9	6.
—	12	5.
Δορκάδιον,	12	5.
Dormouſe,	25	3.
— (Greater)	25	2.
Dornſchweyn,	20	1.
Doujong,	6	2.
Dromadaire,	7	2.
Dromas,	7	2.
Δρομας,	7	2.
Dromedario,	7	2.
Dromedarius,	7	1.
—	7	2.
Dromedary,	7	2.
Duba,	38	1.
Dubbe,	38	1.
Dujung,	6	2.
Dzyka-Koſa,	9	6.

E.

	G.	S.
EBamari,	7	2.
Echinus,	28	1.
— Braſilianus,	4	4.
— Indicus albus,	28	4.
— Sibiricus,	28	2.
— Terreſtris,	28	1.
— (Teſtudinatus)	4	3.
Ecureuil,	24.	
—	24	1.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Siberie,	24	2.
— Du Bréſil,	24	7.
— De la Caroline,	24	9.

	G.	ST.	S.
— (Grand) gris,	24		6.
— Noir,	24		3.
— De la Nouvelle Eſpagne,	24		8.
— Palmiſte,	24		10.
— De Terre,	24		9.
— Varié	24		4.
— De Virginie,	24		6.
— Volant,	24		12.
— Volant de Siberie,	24		13.
— Volant de Virginie,	24		14.
Eel,	10		1.
Egel,	11		1.
Egela,	11		1.
Egin,	7		2.
Eichhermelin,	24		1.
Εχίνος,	28		1.
Elan,	9		7.
—	12		9.
Elant,	12		9.
Ελαφος,	12		1.
Elegans & parvus Africanus Bos,	11		2.
Elegantiſſimum Animal,	29	1	3.
Elephant,	5.		
—	5		1.
Elephante,	5		1.
Elephas,	5.		
—	5		1.
— Africanus,	5		1.
Ελεφας,	5		1.
Elewandum,	29	4	21.
Elg,	10		1.
Elk,	12		9.
Elkerkedom,	16		1.
Ellend,	12		9.
Elſdiur,	12		9.
Encubertado,	4		4.
Encuberto,	4		4.
Enhörning,	16		1.
Ενυδρις,	40		1.
Eques Arborum,	39		2.
Equi-Cervus,	12		9.
Equus,	14.		
—	14		1.

	G.	ST.	S.
— Cicuratus,	14		1.
— Domeſticus,	14		1.
— Ferus,	14		2.
— Marinus,	6		1.
Erdmuſz,	26		4.
Erinaceus,	28.		
—	28		1.
— Americanus,	28		4.
— Americanus albus,	28		4.
— Auriculatus,	28		1.
— Malaccenſis,	28		3.
— Noſtras,	28		1.
— Sibericus,	28		2.
— Subauriculatus,	28		4.
— Surinamenſis,	28		4.
— Terreſtris,	28		1.
Erizo,	28		1.
Ermine,	36		2.
Ermineum,	36		2.
— (Animal) Recentiorum,	36		2.
Ernab,	22		1.
Eſel,	14		3.
Eſpinho,	20		4.
—	20		5.
Eſquilo,	24		1.
Exiguus Africanus Bos,	11		2.
Exoticum Animal,	4		3.
Exquima,	29	4	23.
— Guineenſis,	29	4	23.
Eychhorn,	24		1.
Eychorn,	24		1.
Eza,	9		1.
Ezel, [Wald]	14		5.

F.

	G.	S.
Fallow-Deer,	12	7.
— Faon,	12	1.
Fårle,	15	1.
— [Span]	15	1.
Farra,	26	2.
Fawn,	12	7.
Fech,	24	4.
Feld Marder,	36	8.

	G.	S.
Feldmuſz,	26	4.
Feles,	39	1.
— Fera Tigrina,	39	3.
Felis,	39.	
—	39	1.
— Angorenſis,	39	4.
— Domeſtica,	39	1.
— Sylveſtris,	39	2.
— Sylveſtris Tigrina,	39	3.
— Sylveſtris Tigrinus,	39	3.
— Zibethi,	37	4.
Ferret,	36	3.
Fiällmus,	23	5.
Fiällracka,	35	8.
Fiber,	21	1.
Filfras,	34	1.
Fitchet,	36	1.
—	36	10.
Flädermus,	32	1.
Flädermuſs,	32	1.
Flitter-Mouſe,	32	1.
Flygande Ikorn,	24	12.
Flying Squirrel,	24	12.
Foar,	10	1.
Foetta,	36	10.
Foina,	36	7.
Foras Flebar,	19	1.
Fouine,	36	7.
Foumart,	36	1.
Fourmiller,	1.	
—	1	2.
— Aux longues oreilles,	1	3.
— (Petit)	1	4.
— *Tamanoir*,	1	1.
Fouyna,	36	7.
Fox,	35	5.
— (Gray)	35	7.
Foyna,	36	7.
Fret,	36	3.
Frett,	36	3.
Frettel,	36	3.
Fuchſs,	35	5.
Furam,	36	3.
Furet,	36	3.
— De Java,	36	5.
— Des Indes,	36	4.
Furette,	36	3.
Furo,	36	3.
Furunculus,	36	3.

G.

	G.	ST.	S.
Γαλη,	36		1.
Γαλεη,	36		1.
Galeopithecus,	29	4	14.
Galero,	25		1.
Galts,	15		1.
Gamal,	7		1.
Gamela,	7		1.
Gamo,	12		7.
Gamſs,	9		6.
Ganeme,	10		1.
Gata,	39		1.
Gato,	39		1.
— Montés,	39		2.
Gatta,	39		1.
Gatto,	39		1.
— [Lupo]	39		15.
Gazella,	9		7.
—	9		8.
— Africana,	9		8.
—	9		10.
— Bezoartica,	9		9.
— Indica,	9		7.
— Novæ Hiſpaniæ,	9		11.
Gazelle,	9		8.
— D'Afrique,	9		10.
— Du Bezoar,	9		9.
— Des Indes,	9		7.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9		11.
Gehad,	39		5.
Geiſz,	9		1.
Gelen,	12		1.
Gelm,	12		9.
Gemal,	7		1.
Gemſs,	9		6.
Genas,	10		1.
Genethocatus,	36		13.
Genetta,	36		13.

	G.	S.
Genette,	36	13.
Genithkatz,	36	13.
Geſs,	28.	1.
Get,	9	1.
Gevazen,	12	1.
Gezwecz,	37	1.
Gheit, (Wild)	9	3.
Ghiro,	25	1.
Ghush, (Siyah)	39	15.
Ginetta,	36	13.
Giraff,	8	1.
Giraffa,	8.	
—	8	1.
Giraffe,	8.	
—	8	1.
Girnaffa,	8	1.
Gitſe,	9	1.
Glama,	7	3.
Gliero,	25	1.
Glis,	25.	
—	25	1.
—	26	1.
— Americanus,	25	5.
— Cricetus,	25	8.
— Marmota Americanus,	25	5.
— Marmota Italis,	25	7.
— Moſchiferus,	21	3.
— Norvagicus,	26	8.
— Volans Ternatanus,	32	4.
Goat,	9	1.
Gomela,	16	1.
Goote, [Wild]	9	6.
Goſpand,	10	1.
Gote-Bucke,	9	1.
Gouandou,	20	4.
Grå̊f-Svin,	37	1.
Graffa,	8	1.
Granbeſtia,	12	9.
Grau-Werck,	24	4.
Gray,	37	1.
— Fox,	35	7.
Greater-Dormouſe,	25	1.
— Sleeper,	25	1.
Greul,	25	1.

	G.	ST.	S.
Gronoſtay,	36		2.
Groſſe-Haſſelmuſs,	25		1.
Guabiru,	26		1.
Guariba,	29	4	2.
Guiny Pig,	23		7.
Gulo,	34		1.
Gur,	39		5.
Gurba,	36		1.
Gyraffa,	8		1.

H.

	G.	S.
Haas,	22	1.
Hameſter,	25	8.
Hamſter,	25	8.
Harda,	24	1.
Hardy-Shrew,	27	1.
Hare,	22	1.
Hart,	12	1.
Haſe,	22	1.
Haſelmaus,	25	2.
Haſermuſs,	25	2.
Haſs,	22	1.
Haſſelmuſs, (Groſſe)	25	1.
Håſt,	14	1.
Haut,	3	1.
Hay,	3	1.
Hayma,	19	1.
Hedgehog,	28	1.
Hedgog, (Great Sterll'd)	4	4.
Heinſt,	14	1.
Heirth,	10	1.
Helphant,	5	1.
Ἡμίονος,	14	4.
Hericius,	28	1.
Herinaceus,	28	1.
Heriſſon,	28.	
—	28	1.
— D'Amérique,	28	4.
— De Malacca,	28	3.
— De Siberie,	28	2.
Herix,	28	1.
Herman,	10	1.
Hermelin,	36	2.
Hermellani,	36	2.

Hermellanus,

	G.	ST.	S.
Hermellanus,	36		2.
Hermine,	36		2.
Hiam,	13		5.
Hind,	12		1.
Hinde,	12		1.
— Kalb,	12		1.
Hindin,	12		1.
Hinnulus,	12		1.
— Pergracilis Africanus,	13		1.
Hiort,	12		1.
Hippelaphus,	12		2.
Hippopotame,	19.		
—	19		1.
Hippopotamus,	19.		
—	19		1.
— Antiquorum,	19		1.
— Falsò dictus,	6		1.
Hirco-Cervus,	12		2.
Hircus,	9.		
—	9		1.
— Angorenſis,	9		2.
— Bezaarticus,	9		9.
— Bezoarticus,	9		9.
— Domeſticus,	9		1.
— Ferus,	9		3.
— Pazaharticus,	9		9.
Hirpus,	35		2.
Hirs,	12		1.
Hirſch,	12		1.
Hirts,	12		1.
Hiſtrice,	20		1.
Hœdus,	9		1.
Hog,	15		1.
— (Musk)	15		6.
Hogenain,	7		2.
Hogg,	10		1.
Hoitzlacuatzin,	20		2.
Hoitzlaquatzin,	20		2.
Homme des bois,	29	1	2.
Homo ſylveſtris,	29	1	2.
Hors-hwal,	6		1.
Horſe,	14		1.
— (Sea)	6		1.
Huhſs Marder,	36		7.
Hund,	35		1.
— (Meer)	33		1.
— [Sal]	33		1.
— [Seal)	33		1.
— (See)	33		1.
Huron,	36		3.
Hyæna,	34.		
—	34		1.
— Geſneri,	29	3	1.
— Odorifera,	37		4.
— Veteribus,	37		4.
— (Zilio)	34		1.
Hydrochœrus,	17.		
—	17		1.
Hyene,	34.		
—	34		1.
Hyſtrix,	20.		
—	20		1.
—	20		5.
— Americanus,	20		4.
— Americanus major,	20		5.
— Genuina,	28		3.
— Hudſonis,	20		3.
— Malaccenſis,	28		3.
— Novæ Hiſpaniæ,	20		2.
— Orientalis,	20		6.
— Orientalis criſtata,	20		1.
— Orientalis ſingularis,	20		6.

I.

	G.	S.
JAchmur,	11	2.
Jackcall,	35	3.
Jackhals,	35	3.
Jaela,	9	3.
Jaguara,	39	8.
— Braſilienſis,	39	8.
Jaguarete,	39	9.
— Braſilienſis,	39	9.
Jakhals,	35	3.
Javali,	15	3.
Jazwice,	37	1.
Ibex,	9	3.
— Parvus Americanus,	9	5.
Ichiarl,	7	3.
Ichneumon,	36	12.

	G.	S.
— De Yzquiepatl,	37	3.
Ictis,	36	3.
— Scythica,	36	9.
Jelen,	12	1.
Jelijenii,	12	1.
Jeſef,	34	1.
Jez,	28	1.
Igel,	28	1.
Igelkott,	28	1.
Ignavus,	3	1.
Jiya,	40	2.
Ikorn,	24	1.
— (Flygande)	24	12.
Ικτις,	36	3.
Iller,	36	10.
Iltis,	36	10.
Imar,	10	1.
Indianiſch Künele,	23	7.
Indiſch Seüle,	23	7.
Inveſtigator,	36	12.
Ιππέλαφος,	12	8.
Ιπποϖοταμος,	19	1.
Ιππος,	14	1.
Jument,	14	1.
Jupatiima,	42	1.
Juvenca, [ſylveſtris]	11	2.
Ize,	9	1.
Izquiepotl,	37	3.

K.

	G.	S.
KAabe,	33	1.
Kabſa,	10	1.
Kæmelthier,	7	1.
Kalb,	11	1.
Kalba,	35	1.
Καμηλος,	7	1
Kanin,	22	4.
Kaniſir,	15	1.
Καϖρος,	15	3.
Karas,	16	1.
Karaſch,	16	1.
Kargos,	22	1.
Karibou,	12	6.
Καστορ,	21	1.

	G.	ST.	S.
Katt,	39		1.
— (Deſmans)	36		13.
— (Will)	39		13.
Katta,	39		1.
Kattlo,	39		14.
Katz,	39		1.
— (Genith)	36		13.
— Luchs,	39		14.
— (Meer)	29	4	2.
Katze, (Wilde,)	39		2.
Kebes,	10		1.
Kelbe,	35		1.
Keleb,	35		1.
Kenlée,	35		6.
Kepb,	35		1.
Kephir,	39		5.
Keret,	27		1.
Kipod,	28		1.
Ko,	11		1.
Kobyla,	14		1.
Koc,	39		1.
Koczka,	39		1.
Koe,	11		1.
Koger-Angan,	36		5.
Kolczawa,	36		1.
Kolpb,	35		1.
Kon,	14		1.
Koniin,	22		4.
Kopeda,	28		1.
Koph,	29	1	1.
Kophin,	29	1	1.
Korn Färle,	25		8.
Korytansky,	9		6.
Koſlik,	9		6.
Koſzalka,	25		2.
Kot Dziki,	37		1.
—	39		2.
Kotzcohi,	9		3.
Koza,	9		1.
— (Dzyka)	9		6.
— Leſna,	12		5.
— Skalna,	9		6.
Kozel,	9		1.
Koziel,	9		1.
Kozoroziecz,	9		3.

	G.	S.
Kralik,	22	4.
Kret,	41	1.
—	41	2.
Κριός,	10	1.
Krolik,	22	4.
Krolijk,	22	4.
Kronhiort,	12	1.
Kroſſräf,	35	6.
Krticze,	41	1.
Krzyzaki,	35	6.
Κτίς,	36	3.
Ků,	11	1.
Kůhe,	11	1.
Kun,	14	1.
Kuna,	36	8.
Künelé,	22	4.
— (Indianiſch)	23	7.
Künigle,	22	4.
Kunlein,	22	4.
Kydd,	9	1.
Κυων,	35	1.

L.

	G.	S.
Labi,	39	5.
Lacerta Indica,	2	2.
Lacertus Indicus ſquamoſus,	2	1.
— Squamoſus minor,	2	1.
— Squamoſus peregrinus,	2	2.
Låderlapp,	32	1.
Λαγως,	22	1.
Laiſch,	39	5.
Lam,	10	1.
Lamantin,	6	2.
Lamb,	10	1.
Lambe,	10	1.
Lämblin,	10	1.
Lanii,	12	1.
—	12	7.
Lapin,	23.	
—	22	4.
— D'Allemagne,	23	6.
— D'Amérique,	23	3.
— D'Angora,	22	6.
— De Bahama,	25	4.
— Du Bréſil,	23	8.
— De Java,	23	1.
— Des Indes,	23	7.
— De Norvege,	23	5.
— De notre pays,	22	4.
Lapreau,	22	4.
Laſica Leſna,	36	3.
Laſino,	14	3.
Laska,	36	3.
Laye,	15	3.
Leem,	23	5.
Lekat,	36	2.
Lekatt,	36	2.
Leming,	23	5.
Leo,	39	5.
Leœna,	39	5.
Leon,	39	5.
Λέων,	39	5.
Leone,	39	5.
Leonpardal,	39	12.
Leonpardo,	39	12.
Leopard,	39	12.
Leopardus,	39	12.
Leophante,	5	1.
Leparde,	39	12.
Leppard,	39	12.
Lepre,	22	1.
Lepus,	22.	
—	22	1.
— Albiſſimus,	22	2.
— Albus,	22	2.
— Braſilianus,	22	7.
— Candidus,	22	2.
— Niger,	22	3.
— Plané niger,	22	3.
— Vulgaris cinereus,	22	1.
Lepusculus,	22	4.
Lérot,	25	2.
Letaga,	24	12.
Lévraut,	22	1.
Leure,	40	1.
Lew,	39	5.
Lewhart,	39	12.

	G.	S.
Leyon,	39	5.
Lezard de Cluſius,	2	2.
— Ecaillé,	2	1.
— Ecailleux,	2	1.
— Des Indes Orientales,	2	2.
Lhama,	7	3.
Liébre,	22	1.
Lievora,	22	1.
Liévre,	22.	
—	22	1.
— Blanc,	22	2.
— Du Bréſil,	22	7.
— De Java,	23	1.
— Noir,	22	3.
Lion,	39	5.
Lionne,	39	5.
Liron,	25	1.
Lis	35	5.
Liſska,	35	5.
Liſzka,	35	5.
Lobo,	35	2.
— Marino,	33	1.
Lodra,	40	1.
Lodria,	40	1.
Loir,	25.	
—	25	1.
Loni,	11	8.
Looſs,	15	1.
Los,	12	9.
Loup,	35	2.
— Cervier,	39	15.
— Doré,	35	3.
— Marine,	33	1.
— Du Mexique,	35	4.
— Tigre,	39	10.
Loutra,	40	1.
—	40	2.
Loutre,	40.	
—	40	1.
—	40	2.
— Du Bréſil,	40	2.
Louve,	35	2.
Louveteau,	35	2.
—	38	3.
Lozzos,	12	9.
Luchs,	39	15.
— (Katz)	39	14.
Luiaardt,	3	1.
Lummick,	23	5.
Lupo,	35	2.
— Cerveiro,	39	15.
— Cervero,	39	15.
— Cerviro,	39	15.
— Gatto,	39	15.
Lupus,	35	2.
— Armenius,	39	15.
— Aureus,	35	3.
— Aureus Aſiaticus,	35	3.
— Canarius,	39	12.
— Cervarius,	39	15.
— Indicus,	35	4.
— Mexicanus,	35	4.
— Veſpertinus,	34	1.
— Vulgaris,	35	2.
Lutra,	40.	
—	40	1.
— Ægypti,	36	12.
— Braſilienſis,	40	2.
— Nigricans &c.	40	2.
Lutris,	40	1.
Luzarne,	39	15.
Lws,	39	15.
Lybarde,	39	12.
Λυγξ,	39	15.
Λύκος,	35	2.
Lynce,	39	15.
Lynx,	39	15.
— Braſilienſis, *Jaguara* dicta,	39	8.
— Colore albo &c.	39	14.
Lytra,	40	1.

M.

	G.	ST.	S.
Maçame,	9		14.
Macaquo,	29	5	2.
Macatlchichiltic,	9		11.
Machlis Plinio,	12		8.
Maez,	9		1.
Magnus Vorator	34		11.

	G.	ST.	S.
Magot,	29	5	3.
Majale,	15		1.
Majalis,	15		1.
Maimon,	29	5	3.
Makaque,	29	5	2.
Maki,	31		
—	31		1.
— Aux pieds blancs,	31		2.
— Aux pieds fauves,	31		3.
— A queüe annelée,	31		4.
Malakaya,	39		3.
Malox,	28		1.
Manatee,	6		2.
Manati,	6		2.
— Indorum,	6		2.
— Phocæ Genus,	6		2.
Manatus,	6		2.
Mange-Fourmis,	1		1.
Mangeur de Fourmis,	1		2.
— (Gros)	1		1.
— (Petit)	1		4.
Mangouſte,	36		12.
Manicou,	42		1.
Manipouris,	18.		
—	18		1.
Manis &c,	2		1.
Mapach,	38		4.
Mar,	15		1.
Maracaia,	39		3.
Maraguao,	39		3.
Marcaſſin,	15		3.
Mård,	36		7.
—	36		8.
Marder,	36		7.
— (Bůch)	36		7.
— (Feld)	36		8.
— (Huhſs)	36		7.
— (Stein)	36		7.
— [Tach]	36		7.
— (Wild)	36		8.
Marmontana,	25		6.
—	25		7.
Marmoſa,	42		5.
Marmota,	25		7.
— Alpina,	25		7.

	G.	ST.	S.
— Americana,	25		5.
— Americanus,	25		5.
— Argentoratenſis,	25		8.
— Bahamenſis,	25		4.
— Italis,	25		7.
— Polonica,	25		6.
Marmotte,	25		7.
— Des Alpes,	25		7.
— Amériquaine,	25		5.
— D'Amerique,	25		5.
— De Bahama,	25		4.
— De Pologne,	25		6.
— De Straſbourg,	25		8.
Marſwin,	23		7.
Marta,	36		8.
Martaro,	36		8.
Marte,	36		8.
— Zibeline,	36		9.
Martes,	36		7.
—	36		8.
—	36		10.
— Abietina,	36		8.
— Domeſtica,	36		7.
— Domeſtica Matthioli,	36		10.
— Domeſticus,	36		7.
— Fagina,	36		7.
— Saxorum,	36		7.
— Scythica,	36		9.
— Sylveſtris,	36		8.
— Zibellina,	36		9.
Martin,	36		8.
Martire,	36		8.
Martis altera ſpecies nobilior,	36		8.
Martlet,	36		8.
Martorello,	36		8.
Marturo,	36		8.
Maul-Wurff,	41		1.
Mauſs, [Speck]	32		1.
Maypoury,	18		1.
Mazame,	9		14.
Meer-Ferckel,	23		7.
Meer-Hund,	33		1.
Meer-Katz,	29	4	2.
Meer-Schwein,	23		7.

	G.	ST.	S.
Meerſchweyn,	20		1.
Meer-Wolff,	33		1.
Meles,	37.		
—	37		1.
— Alba,	37		2.
— Cinerea,	37		4.
— Leucophæa,	36		12.
— Surinamenſis,	37		3.
Melis,	37		1.
Μελις,	37		1.
Memeriam Bacala,	10		5.
Merri,	14		1.
Mezeck,	14		4.
Mieren-Eeter,	1		1.
Miſtbellerle,	25		7.
Moldwrap,	41		1.
Mole,	41		1.
Moll,	41		1.
Mollmuſs,	41		1.
Monax,	25		5.
Monkje,	29	4	13.
Monops,	11		8.
Montanella,	25		7.
Montone,	10		1.
Morcego,	32		1.
Mormeldiur,	25		7.
Moromoro,	7		3.
Morſe,	6		1.
Morskieciele,	33		1.
Morſs,	6		1.
Mos,	15		1.
Moſcardino,	25		3.
Moſchus,	13		5.
Moskandaz,	11		2.
Mouller, (Pezze)	6		2.
Mouſe,	26		2.
— (Flitter)	32		1.
— [Shrew]	27		1.
Mouton,	10		1.
— De Perou,	7		3.
Mows,	26		2.
Muger,	6		.
Mula,	14		4.
Mulåſna,	14		4.
Mule,	14		4.

	G.	S.
Muleſel,	14	4.
Mulet,	14	4.
Mullvad,	41	1.
Mulo,	14	4.
Mulot,	26	9.
Multhier,	14	4.
Mulus,	14	4.
Mulwerf,	41	1.
Mungathia,	36	4.
Mungo,	36	4.
Murganho,	27	1.
Murmelthier,	25	6.
—	25	7.
Murmentle,	25	7.
Murmont,	25	7.
Murziegalo,	32	1.
Mus,	26.	
—	26	1.
—	26	2.
— Ægypti,	36	12.
— Africanus *Kayopollin* dictus,	42	6.
— Agreſtis,	26	4.
— Agreſtis, brachiuros,	26	12.
— Agreſtis capite grandi,	26	12.
— Agreſtis major,	26	4.
— Agreſtis major macrouros,	26	4.
— Agreſtis minor,	26	12.
— Agreſtis Virginianus albus,	26	7.
— Albus Virginianus,	26	7.
— Alpinus,	25	6.
—	25	7.
— Alpinus Plinii,	25	7.
— Americanus,	26	5.
—	26	6.
— Americanus & Guineenſis,	23	7.
— Americanus major &c,	42	8.
— Aquaticus,	21	3.
—	26	11.
— Aquaticus Cluſii,	21	3.

	G.	S.
— Aquaticus Exoticus Cluſii,	21	3.
— Aquatilis,	26	11.
— Aquatilis Cluſii,	21	3.
— Avellanarius,	25	2.
— Avellanarum,	25	2.
— Avellanarum major,	25	2.
— Avellanarum minor,	25	3.
— Braſilienſis magnus,	23	4.
— Cæcus,	27	1.
— Campeſtris major,	26	4.
— Campeſtris minor,	26	12.
— Cauda abrupta &c,	23	5.
—	23	7.
— Cauda brevi &c,	23	6.
—	26	12.
— Citellus,	23	6.
— Domeſticus,	26	1.
— Domeſticus communis,	26	2.
— Domeſticus major,	26	1.
— Domeſticus medius,	26	9.
— Domeſticus minor,	26	2.
— Domeſticus vulgaris,	26	2.
— Getulus,	24	11.
— Indicus,	23	7.
— Indicus arboreus ſtriatus,	24	10.
— Indicus dictus *Coyopollin*,	42	6.
— Laſſicus,	24	4.
— Lemingus,	23	5.
— Magnus campi quorumdam,	25	8.
— Major aquaticus,	26	11.
— Marſupialis,	42	2.
— Marſupialis maximus Orientalis,	42	3.
— Marſupialis ſylveſtris Braſilienſis,	42	1.
— Minor,	26	2.
— Montanus quorumdam,	25	6.
— Moſchiferus,	21	3.
— Moſchiferus Canadenſis,	21	4.

	G.	S.
— Noricus,	23	6.
— Ex Norvagia,	26	8.
— Norvagicus,	23	5.
—	26	8.
— Norvegicus,	23	5.
— Orientalis,	26	10.
— Palmarum,	24	10.
— Pharaonis,	36	12.
— Pharaonis quibuſdam,	23	7.
— Ponticus,	24	4.
— Ponticus volans,	24	12.
— Sarmaticus,	36	9.
— Scalopes,	42	5.
— Scythicus,	36	9.
— Scythicus volans,	24	12.
— Sylveſtris,	26	3.
— Sylveſtris Americanus,	23	2.
—	42	7.
—	42	9.
— Sylveſtris Americanus *Scalopes* dictus,	42	5.
— Tlaquatzin,	42	4.
— Venenoſus,	27	1.
— Venetus,	24	4.
— Volans,	24	12.
Muſaraigne,	27.	
—	27	1.
— Du Bréſil,	27	2.
Muſaraneus,	27.	
—	27	1.
—	27	2.
— Braſilienſis,	27	2.
Muſc,	13	5.
Muſcovy,	21	3.
Muſculus vulgaris domeſticus,	26	2.
Muſeraing,	27	1.
Muſet,	27	1.
Muſette,	27	1.
Musk-Hog,	15	6.
— Rat,	21	3.
Muſs, (Biſem)	27	1.

	G.	S.
— (Flåder)	32	1.
— (Moll)	41	1.
— (Spitz)	27	1.
Muſtela,	36.	
—	35	1.
— Ægypti peculiaris,	36	12.
— Ægyptiaca,	36	12.
— Africana,	24	10.
— Alba,	36	2.
— Alpina Junii,	36	2.
— Americana fœtida,	36	11.
— Armellina,	36	2.
— Candida,	36	2.
— Fœtida,	36	10.
— Glauca,	36	4.
— Javanica,	36	5.
— Martes,	36	8.
— Proprié ſic dicta,	36	1.
— Scythica,	36	9.
— Sobella,	36	9.
— Sylveſtris,	36	3.
— Tota alba,	36	2.
— *Viverra* dicta,	36	3.
— Vulgaris,	36	1.
— Zibellina,	36	9.
Muſz,	26	2.
— (Waſſer)	26	11.
Mutzet,	27	1.
Μυάριον,	26	2.
Mygale,	27	1.
Μυγαλῆ,	27	1.
Myrbiörn,	1	1.
Myrmecophaga,	1.	
—	1	2.
— Minima,	1	4.
— Minor,	1	3.
— *Tamanoir* dicta,	1	1.
Μῦς,	26	1.
— Ενυδρος,	26	11.
Μυσκος,	26	2.
Myſs,	26	2.
— (Niemegka)	27	1.
— Polna,	26	4.
— Wodna,	26	11.
Myſzorzechowa,	25	2.

N.

	G.	S.
NAbba,	16	1.
Näbbmus,	27	1.
Nabin,	8	1.
Nabuda,	8	1.
Namer,	39	12.
Naricornis,	16	1.
Nattblacka,	32	1.
Nedwed,	38	1.
Nerameiſch,	10	1.
Netopyrz,	32	1.
Niedzwiedz,	38	1.
Nielmuſz,	26	4.
Niemegka-Myſs,	27	1.
Nietoperſz,	32	1.
Nimra,	39	12.
Noemba,	16	1.
Nöt,	11	1.
Nottola,	32	1.
Notula,	32	1.
Nozorozec,	16	1.
Nůlmuſz,	26	4.
Nutria,	40	1.
Νυκτερὶς,	32	1.

O.

	G.	ST.	S.
OChſs,	11		1.
Odobenus,	6.		
—	6		1.
Ofer,	12		1.
Οἶς,	10		1.
Onager,	14		5.
Οναγρος,	14		5.
Onagrus,	14		5.
Onça,	39		8.
—	39		9.
Once,	39		9.
Οἰός,	14		3.
Opaſſum,	42		1.
Ophen,	12		5.
Opieze,	29	1	1.
Opoſſum,	42		1.
Oquitli,	7		3.

Oricq

	G.	ST.	S.
Orico cachero,	20		5.
—	28		1.
Orignal,	12		9.
Orſo,	38		1.
Os,	11		1.
Oſel,	14		3.
Oſtrowidz,	39		15.
Otter,	40		1.
Otzijſchak,	28		1.
Ouaikaré,	3		1.
Ouariri,	1		1.
Ouatiriouaou,	1		4.
Oveia,	10		1.
Ounce,	39		15.
Ourana,	23		4.
Ourang-outang,	29	1	2.
Ourico-cacheiro,	20		4.
Ouriſo,	28		1.
Ours,	38.		
—	38		1.
— De la Baye de Hudſon,	38		3.
— Blanc,	38		2.
— (Petit)	38		3.
Ovis,	10		1.
— Æthiopica,	10		4.
— Africana,	10		4.
— Angolenſis,	10		5.
— Arabiæ longicauda,	10		3.
— Arabica,	10		2.
—	10		3.
— Arabica altera,	10		3.
— Chilenſis,	7		4.
— Cretenſis,	9		15.
— Domeſtica,	10		1.
— Guineenſis,	10		5.
— Indica,	7		4.
— Laticauda,	10		2.
— Laticauda Arabica,	10		2.
— Longicauda,	10		3.
— Orientalis,	10		2.
— Peruana,	7		3.
—	7		4.
— Peruanæ alia ſpecies,	7		4.
— Peruviana,	7		4.

	G.	S.
— Strepſiceros Cretica Bellonii,	9	15.
— Turcica,	10	2.
Owca,	10	1.
Owcze,	10	1.
Ox,	11	1.

P.

	G.	ST.	S.
PAca,	23		4.
Paco,	7		4.
Pacos,	7		4.
Pak,	23		4.
Panggoeling,	2		1.
Pantegana,	26		1.
Panter,	39		12.
Πανθὴρ,	39		12.
Panthera,	39		12.
Panthere,	39		12.
Papio,	29	3.	
—	29	3	1.
— Ius,	29	3	1.
— Secundus,	3		1.
Pardalion,	39		12.
Pardalis,	39		12.
Πάρδαλις,	39		12.
Παρδος,	39		12.
Pardus,	39		12.
— Braſilienſis *Jaguara* dicta,	39		8.
— Cauda Brevi,	39		13.
Pareſſeux,	3.		
—	3		1.
— De Ceylan,	3		2.
Pas,	35		1.
Paſan,	9		9.
Paſen,	9		9.
Pate,	37		1.
Pavyon,	29	3	1.
Pecaris,	15		6.
Pecora,	10		1.
— D'Arabia, con la coda larga,	10		2.
— D'Arabia, con la coda longa,	10		3.

	G.	S.
Peert,	14	1.
Pege-buey,	6	2.
Pelandor-Aroé,	42	2.
Pelon,	7	3.
Perack,	32	1.
Pered,	14	4.
Perico-Ligero,	3	1.
Perro,	35	1.
Pervichcatl,	7	3.
Pes,	35	1.
Pezillo Ligero,	3	1.
Pezze Mouller,	6	2.
Phar,	26	2.
Phatagen,	2	2.
Philander,	42.	
—	42	1.
— Africanus,	42	6.
— Amboinenſis,	42	3.
— Americanus,	42	5.
— Braſilienſis,	42	4.
— Capite craſſo,	42	8.
— Cauda Brevi,	42	9.
— Maximus Orientalis,	42	3.
— Orientalis,	42	2.
— Surinamenſis,	42	7.
Philandre,	42.	
—	42	1.
— D'Afrique,	42	6.
— D'Amboine,	42	3.
— D'Amérique,	42	5.
— Du Bréſil,	42	4.
— A courte queue,	42	9.
— A groſſe tête,	42	8.
— Oriental,	42	2.
— De Surinam,	42	7.
Phir,	25	1.
—	26	2.
Phoca,	33.	
—	33	1.
— Dentibus exſertis,	6	1.
Phocas,	33.	
—	33	1.
Φώκη,	33	1.
Pholidote,	2.	
—	2	1.

	G.	ST.	S.
— A longue queue,	2		2.
Pholidotus,	2.		
—	2		1.
— Longicaudatus,	2		2.
Pig,	15		1.
— [Guiny]	23		7.
Pigg Swin,	20		1.
Pigritia,	3		1.
Pipiſtrello,	32		1.
Pir,	25		1.
Pirdah,	14		4.
Pirolus,	24		1.
Πίθηκος,	29	1	1.
Platyceros,	12		7.
Polatucha,	24		12.
Polecat,	36		10.
Pongi,	29	4	10.
Popieliza,	24		4.
Porc,	15		1.
Porc-Epic,	20.		
—	20		1.
— D'Amérique,	20		4.
— De l'Amérique Septentrionale,	20		3.
— De la Baye de Hudſon,	20		3.
— (Grand) d'Amérique,	20		5.
— Des Indes Orientales,	20		6.
— De la Nouvelle Eſpagne,	20		2.
Porcellio, [Teſtudinatus]	4		3.
Porcellus,	15		1.
— Cataphractus,	4		6.
— Frumentarius,	25		8.
— Guineenſis,	23		7.
— Indicus,	23		7.
Porco,	15		1.
— Caſtrato,	15		1.
— Spino,	20		1.
— Spinoſo,	20		1.
— Sylvatico,	15		3.
Porcopict,	20		1.
Porcupine,	20		1.

	G.	S.
Porcus,	15	1.
— Aculeatus Malaccenſis,	28	3.
— Aculeatus ſylveſtris,	20	6.
— Americanus,	15	6.
— Babyrouſſa,	15	5.
— Domeſticus,	15	1.
— Fluviatilis,	17	1.
— Guineenſis,	15	4.
— Indicus,	15	5.
— Moſchiferus,	15	6.
— Sylveſter,	15	6.
— Sylveſtris,	15	3.
Porte-corne,	16	1.
Portepyne,	20	1.
Poſſum,	42	1.
Poulain,	14	1.
Pouttet,	36	10.
Priguiza,	3	1.
Proſimia,	31.	
Pteropus,	30.	
Puant,	42	1.
Puerco,	15	1.
— Montes,	15	3.
— Sylveſtre,	15	3.
Puerco-Eſpin,	20	1.
Puſa,	33	1.
Putois,	36	10.
—	36	11.
— Rayé,	36	11.
Putorius,	36	10.
— Striatus,	36	11.
Puzolo,	36	10.

Q.

	G.	S.
Quachy,	38	4.
Quadrupes Bellonii,	26	11.
— Peregrina,	4	5.
— (Vultur)	34	1.
Quapizotl,	15	6.
Quasje,	37	3.
Quauhcoyametl,	15	6.
Quauhtechallotl,	24	3.
— Thliltic,	24	3.
Quauhtla-Coymatl,	15	6.
Quickhatch,	38	3.
Quimichpatlan,	24	12.

R.

	G.	S.
Raadiur,	12	5.
Rabit,	22	4.
Raccoon,	38	4.
Radja Outang,	39	6.
Rådiur,	12	5.
Råf,	35	5.
— (Blå)	35	8.
— (Kroſs)	35	6.
Raguahil,	7	2.
Rain-Deer,	12	8.
Rainger,	12	8.
Ram,	10	1.
Rangifer,	12	8.
Raphius,	39	13.
Rapoſa,	35	5.
Rat,	26.	
—	26	1.
—	26	2.
— D'Amérique,	26	6.
— Blanc de Virginie,	26	7.
— De Bois,	26	3.
— D'eau,	26	11.
— (Grand) des champs,	26	4.
— (Musk)	21	3.
— Muſqué,	21	3.
—	21	4.
— Muſqué de Canada,	21	4.
— De Norvege,	26	8.
— Oriental,	26	10.
— Palmiſte,	24	10.
— (Petit) des Champs,	26	12.
— De Pharaon,	36	12.
— De Pont,	24	12.
— De Tartarie,	24	12.
Rato da caſa,	26	1.
— Di caſa,	26	1.
— Penago,	32	1.
Raton,	26	1.
— Pequenno,	25	2.
—	27	1.

	G.	S.
Ratte,	26	1.
— (Watter)	26	11.
Rattus,	26	1.
— Americanus,	26	6.
— Aquaticus,	26	11.
— Aquatilis,	26	11.
— Domeſticus,	26	1.
— (Veſpertilio) Ternatanus,	32	4.
Ratz,	26	1.
— (Waſſer)	26	11.
Reddeer,	12	1.
Reech,	12	5.
Reechbock,	12	5.
Reechgeiſs,	12	5.
Reem,	16	1.
Reen,	12	8.
Rein,	12	8.
Reinen,	12	8.
Reinſdiur,	12	8.
Reinsſthier,	12	8.
Rell,	25	1.
Rellmuſs,	25	1.
Renard,	35	5.
— Amériquain,	1	1.
— Blanc,	35	8.
— Croiſé,	35	6.
— Gris,	35	7.
Renſcheron,	12	8.
Reyner,	12	8.
Rhen,	12	8.
Rhenne,	12	8.
Rhinoceros,	16.	
—	16	1.
Rhinocerote,	16	1.
Ῥινοκέρως,	16	1.
Riccio,	28	1.
Riche,	22	5.
Rind,	11	1.
Rizo,	28	1.
Roe-Deer,	12	5.
Ropoza,	42	1.
Roſmarus,	6	1.
— Vetus,	6	1.
Roſomacha,	34	1.
Roſs,	14	1.
Rotta, (Watn)	26	11.
Rouſſette,	30.	
—	30	1.
— A col rouge,	30	2.
— A longues oreilles,	30	3.
Rupicapra,	9	6.
Ruyn,	14	1.
Rys,	39	15.

S.

	G.	ST.	S.
Sabbel,	38		9.
Sabelmus,	23		5.
Sable,	36		9.
Sag,	35		1.
Sagoin,	29	4	14.
Sagouin,	29	4	14.
Säl-Hund,	33		1.
Sanda Benamet,	16		1.
Sanglier,	15		3.
— Appellé *Pecaris*,	15		6.
— Des Indes Orientales,	15		5.
— Du Mexique,	15		6.
Sapajou brun,	29	4	1.
— Cornu,	29	4	3.
— Jaune,	29	4	8.
— Noir,	29	4	2.
— A queue de Renard,	29	4	4.
Saphan,	22		4.
Sarigoy,	42		1.
Sarn,	12		5.
Sarna,	12		5.
Satherius,	36		9.
Satyrus,	29	1	2.
— Indicus,	29	1	2.
Saw,	15		1.
Scalopes,	42		5.
Schaaff,	10		1.
Schaaffuſz Arabia,	10		2.
—	10		3.
Schaah,	9		1.
Schaep,	10		1.
Schanar,	39		1.
Schär,	41		1.

	G.	ST.	S.
Schaͤrmus,	41		1.
Schem̃ikel,	29	1	1.
Schetor,	7		1.
Schildverken,	4		4.
Schirato,	24		1.
Schiratolo,	24		1.
Schirivolo,	24		1.
Schor,	11		1.
Schual,	35		5.
Schunara,	39		1.
Schwein,	15		1.
— (Dorn)	20		1.
— (Meer)	20		1.
— (Stachel)	20		1.
— (Wild)	15		3.
Schwyn,	15		1.
Sciurus,	24.		
—	24		1.
— Albus Sibericus,	24		2.
— Americanus,	24		5.
— Americanus volans,	24		12.
— Braſilienſis,	24		7.
— Carolinenſis,	24		9.
— Epilepticus,	25		1.
— Getulus,	24		11.
— Lyſteri,	24		9.
— Mexicanus,	24		3.
— Niger,	24		3.
— Novæ Hiſpaniæ,	24		8.
— Palmarum,	24		10.
— Petauriſta volans,	24		12.
— Ponticus,	24		4.
— Rariſſimus ex Nova Hiſpania,	24		8.
— Schyticus,	24		4.
— Sibericus volans,	24		13.
— Striatus,	24		9.
— Varius,	24		4.
— Virginianus,	24		6.
— Virginianus petauriſta,	24		14.
— Virginianus volans,	24		14.
— Volans,	24		12.
— Vulgaris,	24		1.
— Vulgaris rubicundus,	24		1.

	G.	ST.	S.
Scropha,	15		1.
Scurulus,	24		1.
Sczuzek,	25		1.
Sea-Calf,	33		1.
Seahorſe,	6		1.
Seakow,	6		1.
Seal-Hund,	33		1.
Sebey,	39		5.
Seehond,	33		1.
See-Hund,	33		1.
Seekoejen,	6		2.
Semivulpa,	42		1.
Seraphah,	8		1.
Sery,	27		1.
Seſef,	34		1.
Seüle, (Indiſch)	23		7.
Seuwle,	15		1.
Sezurez,	26		1.
Sheepe,	10		1.
Shrew,	27		1.
— (Hardy)	27		1.
— Mouſe,	27		1.
Shymel,	7		1.
Siaͤl,	33		1.
Sjechaal,	35		3.
Sig,	35		1.
Silenus,	3		2.
Sime,	29	1	1.
Simia,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Alba &c,	29	4	21.
— Callitrix &c,	29	4	26.
— Caudata &c,	29	4.	
—	29	5.	
— Ceylonica,	29	1	3.
— Cynocephala,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocephala Ceylonica,	29	2	2.
— Ecaudata &c,	29	1	2.
—	29	2.	
— Primus,	29	1	1.
— Secundus,	29	1	1.
— Ourang-Outang,	29	1	2.

	G.	ST.	S.
— Perſonata,	3		2.
— Sciurus &c,	31		1.
— Semicaudata &c,	29	3	1.
— Simpliciter dicta,	29	1	1.
Simiolus Ceylonicus,	29	4	8.
Simius Callitrix,	29	4	27.
— Cynocephalus alter,	29	2	1.
Singe,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Barbu,	29	4	24.
— Barbu à queue de Lion,	29	4	25.
— Blanc à barbe noire,	29	4	21.
— De Ceylan,	29	1	3.
— Cynocéphale,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocéphale de Ceylan,	29	2	2.
— (Grand) de la Cochinchine,	29	4	18.
— De Guinée,	29	4	6.
— De Guinée à barbe blanche,	29	4	23.
— De Guinée à barbe jaunâtre,	29	4	19.
— Lion,	29	4	16.
— Muſqué,	29	4	7.
— Noir à barbe blanche,	29	4	22.
— Noir d'Egypte,	29	4	26.
— (Petit) Lion,	29	4	11.
— [Petit] du Mexique,	29	4	28.
— (Petit) Négre,	29	4	5.
— (Petit) de Para,	29	4	12.
— A queue de Lion,	29	4	15.
— A queue de Rat,	29	4	13.
— Rouge,	29	4	20.
— Rouge de Cayenne,	29	4	20.
— Roux d'Egypte,	29	4	27.
— Varié,	29	4	9.
— Verd,	29	4	17.
Sion,	5		1.
Siſel,	23		6.

	G.	S.
Siyah-Ghush,	39	15.
Σκίυρος	24	1.
Skogſmus,	25	3.
Skop,	10	1.
Skrzeczek,	25	8.
Slaep ratte,	25	2.
Sleeper,	25	3.
— (Greater)	25	2.
Sobol,	36	9.
Soile,	33	1.
Sorce,	25	2.
Sorex,	26	1.
—	26	2.
—	27	1.
— Americanus,	26	5.
— Americanus major &c,	42	8.
— Aquaticus,	26	11.
— Domeſticus,	26	2.
— Moſcoviticus,	21	3.
— Odoriferus,	21	3.
— Plinii,	25	2.
— Sylveſtris Americanus,	42	7.
Sorgio di caſa,	26	2.
Sorgo Morgange,	26	11.
Sorice,	26	2.
Sourco,	26	1.
Souris,	26	2.
— D'Amérique,	26	5.
Sow,	15	1.
Spaca,	35	1.
Span-Färle,	15	1.
Speckmauſs,	32	1.
Spirioſus,	24	1.
Spitzmuſs,	27	1.
Sporteglione,	32	1.
Squilachi,	35	3.
Squirrel, (Flying)	24	12.
— (Great Grey Virginia)	24	6.
Squyrrell,	24	1.
Srna,	12	5.
Stachelſchweyn,	20	1.
Stagg,	12	1.
Steinbock,	9	3.

	G.	S.
Stein Marder,	36	7.
Stier,	11	1.
Stoat,	36	2.
Strepſiceros,	9	8.
—	9	15.
— Bellonii,	9	15.
— Jo. Caii,	9	8.
— Plinii,	9	8.
Στρεψίκερως,	9	8.
Su,	15	1.
Suber,	11	6.
Svin, (Gräf)	37	1
Surck,	41	1.
Sus,	15.	
—	15	1.
— Agreſtis,	15	3.
— Aquaticus multiſulcus,	18	1.
— Chinenſis,	15	2.
— Domeſticus,	15	1.
— Ferus,	15	3.
— Guineenſis,	15	4.
— Maximus Paluſtris,	17	1.
— Sinenſis,	15	2.
— Sylvaticus,	15	3.
Sus,	14	1.
Suſah,	14	1.
Suſel,	23	6.
Suſuatha,	14	1.
Suw,	15	1.
Swin, [Pigg]	20	1.
— (Will)	15	3.
Swine, (Wild)	15	3.
Swinka Zamorska,	23	7.
Swiſzez,	25	6.

T.

	G.	S.
TAch Marder,	36	7.
Tachs,	37	1.
Tai-Ibi,	42	4.
Tajacu,	15	6.
Taijbi,	42	4.
Taiſſon,	37	1.
Talpa,	41.	

	G.	ST.	S.
—	41		1.
Alba,	41		2.
— Alba Noſtras,	41		2.
— Americana rufa,	41		5.
— Coloris albi,	41		2.
— Maculata, Ooſt-Friſia,	41		3.
— Nigra Virginiana,	41		4.
— Noſtras,	41		1.
— Noſtras albi coloris,	41		2.
— Rubra Americana,	41		5.
— Siberica aurea,	41		6.
— Sibericus verſicolor,	41		6.
— Variegata,	41		3.
— Virginiana,	41		4.
— Virginianus niger,	41		4.
Tamamaçame,	9		11.
Tamandua,	1		1.
— Alba,	1		4.
— Americana minor,	1		2.
— Guacu,	1		1.
—	1		3.
— I,	1		2.
—	1		3.
— Major,	1		1.
— Minor cinerea,	1		2.
— Minor flaveſcens,	1		4.
— Miri,	1		2.
Tamanoir,	1		1.
Tamarind,	29	4	10.
Tamendoa,	1		1.
Tapeti,	22		7.
Tapiierete,	18		1.
Tapir,	18.		
—	18		1.
Tapirus,	18.		
—	18		1.
Taran,	20		1.
Tarandus,	12		8.
— Agricolæ & Eliotæ,	12		8.
Tardigradus,	3.		
—	3		1.
—	29	1	3.
—	29	2	2.
— Ceylonicus,	3		2.

	G.	ST.	S.
Tartarin,	29	5	3.
Taſch,	37		1.
Taſſo,	37		1.
Taſſus,	37		1.
Taſugo,	37		1.
Tatoe,	2		1.
Tatou,	4		2
—	4		4.
—	4		6.
— Kabaſſou,	4		5.
Tatu,	4		2.
—	4		4.
—	4		6.
— Africanus,	4		7.
— Apara,	4		2.
—	4		7.
— Caninus,	4		7.
— Eté,	4		5.
— Muſtelinus,	2		1.
—	4		1.
— Orientalis,	4		2.
— Piloſus,	23		7.
— Porcinus,	4		2.
—	4		6.
Tatupeba,	4		4.
Tatus,	4		2.
—	4		5.
— Major,	4		5.
Taupe,	41.		
—	41		1.
— Blanche,	41		2.
— Dorée de Siberie,	41		6.
— Rouge d'Amérique,	41		5.
— Variée,	41		3.
— De Virginie,	41		4.
Taur,	11		1.
Taureau,	11		1.
Taurus,	11		1.
— Domeſticus,	11		1.
— Ferus,	11		6.
— Mexicanus,	11		7.
— Quiviræ Provinciæ,	11		7.
— Quiviræ Regionis,	11		7.
— Quivirenſis,	11		7.
Taxo,	37		1.

	G.	S.
Taxus,	37	1.
— Suillus,	38	6.
Tchorz,	36	10.
Temamaçame,	9	11.
Tenlic,	35	6.
Tepe Maxtlaton,	39	3.
Ternera,	11	1.
Texon,	37	1.
Thaal,	35	5.
Thabia,	9	6.
—	12	5.
Thabiu,	9	6.
—	12	5.
Thaleb,	35	5.
Thapſa,	22	4.
Thliltic, (Quauhtechallotl)	24	3.
Thor,	11	1.
Thur,	11	3.
Tiger,	39	6.
Tigerthier,	39	6.
Tigra,	39	6.
Tigre,	39	6.
—	39	8.
—	39	11.
— D'Amérique,	39	8.
— Barbet,	39	10.
— (Eſpece de)	39	9.
— Friſé,	39	10.
— De la grande eſpece,	39	7.
— [Gros] de la Guiane,	39	8.
— [Loup]	39	10.
— Noir,	39	9.
— Rouge,	39	11.
— Royal,	39	7.
Tigris,	39	6.
— Americana,	39	8.
— Criſpa,	39	10.
— Cuguaçuarana,	39	11.
— Fulva,	39	11.
— Fulvus,	39	11.
— Jaguarete,	39	9.
— Mexicanus,	39	8.
— Nigra,	39	9.
— Regia,	39	7.

	G.	S.
Τίγρις,	39	6.
Titſlein,	9	1.
Tlacuatzin ſpinoſum,	20	2.
Tlacoozclotl,	39	13.
Tlalocelotl,	39	13.
Tlaquatzin,	42	1.
—	42	4.
Tlatlauhqui occlotl,	39	8
Tlilocoteqvillin,	24	3.
Topinara,	41	1.
Topo,	26	2.
—	41	1.
Toporagno,	27	1.
Tora,	11	1.
Torata,	11	1.
Toro,	11	1.
Tragelaphus,	9	12.
—	12	2.
— Bellonii,	9	12.
Τράγος,	9	1.
— ἄγριος,	9	3.
Tragulus,	13.	
— Africanus,	13	1.
—	13	4.
— Guineenſis,	13	2.
— Indicus,	13	1.
— Mazame,	9	14.
— Pergracilis Africanus,	13	1.
— Surinamenſis,	13	3.
— Temamaçama,	9	11.
Tragus Bezaarticus,	9	9.
— Biſulcorum mixtus,	8	1.
— Capra ſylveſtris Africana Grimmii,	13	4.
— Domeſticus,	9	1.
— Dorcas,	9	6.
— Moſchiferus,	13	5.
— Strepſiceros,	9	8.
Trichechus,	6	2.
Troiata,	15	1.
Truye,	15	1.
Tuabba,	16	1.
Tup,	10	1.
Tur,	11	3.
Tzwijerzatko,	28	1.

V.

	G.	S.
VAca,	11	1.
Vacca,	11	1.
— Marina,	6	2.
Vache,	11	1.
— Marine,	6.	
—	6	1.
Vare,	24	4.
Varia,	39	12.
Varius,	24	4.
Varoza,	25	7.
Varus,	24	4.
Veau,	11	1.
— Marin,	33	1.
— De mer,	33	1.
Vebar,	22	4.
Vech,	24	4.
Vechio Marino,	33	1.
Veldratte,	23	8.
Verdadeiro,	4	5.
Verrat,	15	1.
Verres,	15	1.
— Sylvaticus,	15	3.
Verro,	15	1.
Vervex,	10	1.
— Alius peregrinus,	7	4.
Veſpertilio,	32.	
—	32	1.
—	32	3.
— Americanus,	32	5.
—	32	6.
— Americanus rufus,	32	5.
— Americanus vulgaris,	32	6.
— Auriculis binis,	32	1.
— Auriculis quaternis,	32	3.
— Borſippæ,	30	1.
— Cato ſimilis Americanus,	32	5.
— Cauda nulla,	30	1.
— Caudatus &c,	32.	
— Cynocephalus ex Nova Hiſpania,	30	5.
— Cynocephalus Terna-		

Vu

	G.	ST.	S.
tanus,	30		1.
— Ingens,	30		1.
— Major,	32		1.
— Major Ternatanus,	32		4.
— Minor,	32		3.
— Minor Ternatanus,	32		2.
— Rattus Ternatanus,	32		4.
— Ternatanus,	32		2.
— Ternatanus auriculis ſimplicibus,	32		2.
— Vulgaris,	32		1.
— Vulgaris auriculis duplicibus,	32		3.
Vigogne,	7		4.
Vilfras,	34		1.
Vilpiſtrello,	32		1.
Vir ſylvarum,	29	1	2.
Viſon,	36		6.
Vitello,	11		1.
Vitulus,	11		1.
— Marinus,	33		1.
Viverra,	36		5.
— Fœmina,	36		3.
— Javanica,	36		5.
— Indica,	36		4.
— Mas,	35		3.
Ulf,	35		2.
Ulk,	36		10.
Umbulu,	1		1.
Unau,	3		1.
Volpe,	35		5.
Vorator, [Magnus]	34		1.
Vos,	35		5.
Urchin,	28		1.
Urochs,	11		3.
Uros,	11		3.
Urſa formicaria,	1		3.
Urſus,	38.		
—	38		1.
— Albus,	38		2.
— Cauda abrupta,	38		1.
— Cauda elongata,	38		4.
— Formicarius,	1		1.
— Freti Hudſonis,	38		3.
Urus,	11		3.

	G.	S.
Utter,	40	1.
Vuelblud,	7	1.
Vulpecula Americana,	37	3.
— Quæ Mayzium torrefactum æmulatur,	37	3.
Vulpes,	35	5.
— Alba,	35	8.
— Albus,	35	8.
— Americana, *Mapach* dicta,	38	4.
— Campeſtris,	35	5.
— Cinerea,	35	7.
— Cinereus Americanus,	35	7.
— Cœruleſcens,	35	8.
— Cruciatus,	35	6.
— Crucigera,	35	6.
— Fulvus,	35	5.
— Indica, *Izquiepotl* dicta,	37	3.
— Major Putoria &c,	42	1.
— Minor &c,	38	6.
— Vulgaris,	35	5.
Vulpi affinis Americana,	38	4.
Vultur Quadrupes,	34	1.
Vydra,	36	10.

W.

	G.	ST.	S.
Wald-Ezel,	14		5.
Walros,	6		1.
Walrus,	6		1.
Wanduru,	29	4	22.
Want,	41		1.
Warg,	35		2.
Warglo,	39		15.
Waſſer-Muſz,	26		11.
— Ratz,	26		11.
Watn-Rotta,	26		11.
Watter-Ratte,	26		11.
Weaſel,	36		1.
Weeſel,	36		1.
Weprz,	15		3.
Werck, [Grau]	24		4.
Weſla,	36		1.

	G.	S.
Wewér,	38	1.
Wewerka,	24	1.
Wider,	10	1.
Wieprz,	15	1.
— Leſny,	15	3.
Wiewiorka Lataiaca,	24	12.
Wild-Aſs,	14	5.
— Boar,	15	3.
— Gheit,	9	3.
— Goote,	9	6.
— Marder,	36	8.
— Schwein,	15	3.
— Swine,	15	3.
Wilde-Buffel,	11	8.
— Katze,	39	2.
Wilk,	35	2.
Will-Katt,	39	13.
— Swin,	15	3.
Wiſele,	36	1.
Wiſelin, (Wyſs)	36	2.
Wiſent,	11	6.
Wlk,	35	2.
Wol,	11	1.
Wolf,	35	2.
Wolff,	35	2.
— (Meer)	33	1.
Wolverenne,	38	3.
Wot-dziki,	11	3.
Wul,	11	1.
Wurff, (Maul)	41	1.
Wydra,	40	1.
Wyewyorka,	24	1.
Wyſs Wiſelin,	36	2.

X.

	G.	ST.	S.
XImio,	29	1	1.
Xoloitzcuintli,	35		4.

Y.

	G.	S.
YBſch,	9	3.
Ὗς,	15	1.
Yſeren-vereken,	28	1.
Ὕστριξ,	20	1.
Ytembo,	5	1.
Yzard,	9	6.
Yzquiepatl,	37	1.

Z.

	G.	S.
ZAbo,	34	1.
Zagicz,	22	1.
Zaiac,	22	1.
Zainq,	15	6.
Zainus,	15	6.
Zamer,	8	1.
Zbik,	37	1.
—	39	2.
Zebati,	16	1.
Zebi,	9	6.
—	12	5.
Zebiah,	12	5.
Zebra,	14	2.
— Indica,	14	2.
Zébre,	14	2.
Zeeb,	35	2.
Zeebah,	35	2.
Zeehundt,	33	1.
Zibet,	37	4.
Zibethica,	37	4.
Ziemuy,	28	1.
Zieſel,	23	6.
Zijm,	39	2.
Zilio-Hyæna,	34	1.
Zobel,	36	9.
Zon,	10	1.
Zoneh,	10	1.
Zorlito,	12	5.
Zuber,	11	6.
Zubr,	11	3.
Zurnapa,	8	1.
Zyſel,	23	6.

CLASSE II.

LES CETACÉES.

CLASSIS II.

CETACEA.

CATALOGUS AUTHORUM.

ALDRO. Piſc. . . Uliſſis Aldrovandi Philoſophi & Medici Bononienſis, de Piſcibus Libri V, & de Cetis, Liber I. &c. Bononiæ 1638. in-folio.

Art. Deſcr. Piſc. . . Petri Artedi Sueci deſcriptiones ſpecierum Piſcium, quos vivos præſertim diſſecuit, & examinavit, inter quos primariò Piſces regni Sueciæ, &c. Ichtyologiæ pars V. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Art. Gen. Piſc. . . Petri Artedi Sueci genera Piſcium, in quibus ſyſthema totum Ichtyologiæ proponitur, cum Claſſibus, Ordinibus, Generum Characteribus, ſpecierum differentiis, obſervationibus plurimis, &c. Ichthyologiæ pars III. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Art. Synon. Piſc .. Petri Artedi Angermannia-Sueci ſynonymia nominum Piſcium ferè omnium, in qua recentio fit nominum Piſcium omnium facilè Authorum, qui unquam de Piſcibus ſcripſere : uti Græcorum, &c. Ichthyologiæ pars IV. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Bell. Aquat. . . Petri Bellonii Cenomani de Aquatilibus libri duo, &c. Pariſiis 1553. in-octavo oblong.

Bell. des Poiſ. . . La nature & diverſité des Poiſſons, avec leurs pourtraits repréſentés au plus près du naturel, par Pierre Bellon du Mans. A Paris 1555, in octavo oblong.

Charlet. Exer. . . Gualteri Charletoni exercitationes, Piſcium differentiæ & nomina. Oxoniæ 1677. in-folio.

Cluſ. Exot. . . Caroli Cluſii Atrebatis, Aulæ Cæſareæ quondam familiaris, Exoticorum libri decem. &c. Raphelengii 1605. in-folio.

Euſ. Nieremb. . . Joannis Euſebii Nierembergii Madritenſis, ex Societate Jeſu, in Academia Regia Madritenſi Philoſophiæ Profeſſoris, Hiſtoria Naturæ maximæ peregrinæ, libris XVI. diſtincta. Antuerpiæ 1635. in-folio.

Faun. Suec. Linn. . . Caroli Linnæi Medici & Botan. Prof. Upſal. &c. Fauna Suecica, ſiſtens Animalia Sueciæ Regni, &c. Stockholmiæ 1746. in-octavo.

Geſn. Icon. Aquat. . . Icones Animalium aquatilium in mari & dulcibus aquis degentium. Tiguri 1560. in-folio.

Geſn. Piſc . . Conradi Geſneri Medici Tigurini Hiſtoriæ Animalium liber IV. qui eſt de Piſcium & aquatilium animantium natura. Tiguri 1558. in-folio.

Hiſt. de l'Acad. . . Hiſtoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris. in-quarto.

Hiſt. d Iſl. & de Gro. . . Hiſtoire Naturelle de l'Iſlande, du Groënland, du détroit de Davis, & d'autres pays ſitués ſous le Nord ; traduite de l'Allemand, par M. Anderſon, &c. A Paris 1750. in-douze.

Jonſt. Piſc. . . Hiſtoriæ Naturalis de Piſcibus & Cetis, libri V. cum æneis figuris, Johannes Jonſtonus Medicæ Doctor. Amſtelodami 1657. in folio.

Klein. Piſc. Miſ. 2. . . Jacobi Theodori Klein Hiſtoriæ Piſcium Naturalis promovendæ Miſſus ſecundus ; de Piſcibus per pulmones ſpirantibus, &c. Gedani 1741. in-quarto.

Linn. Syſt. Nat. ed. 6. . . Caroli Linnæi Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profeſſ. Upſal. Syſthema Naturæ, ſiſtens regna tria naturæ, in claſſes & ordines, genera & ſpecies redacta, Tabuliſque æneis illuſtrata. Editio ſexta, emendata & aucta. Stockholmiæ 1748. in-octavo.

Muſ. Worm. . . Muſeum Wormianum, ſeu Hiſtoria rerum rariorum, tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm. Med. Doct. &c. Amſtelodami 1655. in-folio.

Raj. Syn. Piſc. . . Joannis Raji Synopſis Methodica Piſcium. Londini 1713. in-octavo.

Rondel Piſc. .. Guillelmi Rondeletii Doctoris Medici & Medicinæ in Schola Monſpelienſis Profeſſoris Regii, libri de Piſcibus marinis. Lugduni 1554. in folio.

Sibbald. Obſ. .. Phalainologia nova, ſive Obſervationes de rarioribus quibuſdam Balænis in Scotiæ littus nuper ejectis, &c. Edinburgii 1692. in-quarto.

Will. Hiſt. Piſc. .. Franciſci Willughbeii Armig. de Hiſtoria Piſcium libri quatuor, juſſu & ſumptibus Societatis Regiæ Londinenſis, editi, &c. Oxonii 1686. in-folio.

CLASSIS II.

CLASSIS II.

CETACEA.

HORUM character eſt Corpus nudum, elongatum:
Pinnæ carnoſæ:

Cauda horizontaliter plana.

Omnia hujus Claſſis Animalia in mari perpetuò degunt; nec unquàm ſpontè, & abſquè vitæ periculo, in ſiccum exeunt. Hæc, QUADRUPEDUM modo, *duos* habent in corde *ventriculos*; *pulmonibus* ſpirant; coeunt, *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt. Partium deniquè omnium internarum ſtructurâ & uſu cum illis conveniunt. Omnia fiſtulâ unâ, vel fiſtulis duobus, per quas aquam rejiciunt & efflant, in capite vel roſtro donantur.

Alia ſunt edentula: alia verò dentata. Edentula maxillam ſuperiorem habent laminis corneis utrinque inſtructam; quæ laminæ corneæ

CLASSE II.

LES CETACÉES.

LEUR caractere eſt D'avoir le corps nud, & allongé:
Des nageoires charnuës:

Et la queue platte horizontalement.

Tous les Animaux de cette Claſſe vivent toujours dans la mer; & ils n'en ſortent jamais d'eux-mêmes, & ſans riſque de leur vie. Comme les QUADRUPEDES, ils ont *deux ventricules* au cœur; reſpirent par des *poûmons*; s'accouplent, font leurs petits *vivants*, & les *alaittent*. Ils leurs reſſemblent encore par la ſtructure & l'uſage de toutes leurs parties intérieures. Ils ont tous pardeſſus la tête ou le muſeau, un ou deux canaux, par leſquels ils rejettent l'eau.

Les uns n'ont point de dents: les autres en ſont munis. Ceux qui n'ont point de dents, ont la mâchoire ſupérieure garnie des deux côtés de lames de corne,

qui s'ajuſtent obliquement dans l'inférieure, comme la *Baleine*. Ceux qui ont des dents, ou n'en ont qu'à la mâchoire inférieure ſeulement, comme le *Cachalot*; ou n'en ont qu'à la mâchoire ſupérieure, comme le *Narhval*; ou en ont aux deux mâchoires, comme le *Souffleur*, le *Dauphin*, &c.

Ils ſe diviſent en quatre Ordres.

Dans le premier ſont compris ceux qui n'ont point de dents.

Dans le ſecond, ceux qui ont des dents à la mâchoire inférieure ſeulement.

Dans le troiſiéme, ceux qui ont des dents à la mâchoire ſupérieure ſeulement.

Et dans le quatriéme, ceux qui ont des dents aux deux mâchoires.

Table méthodique des Cetacées.

Les Cetacées ou
- N'ont point de dents... *La Baleine*. 1... Ordre I.
- Ont des dents,
  - A la mâchoire inférieure ſeulement... *Le Cachalot*. 2... Ordre. II.
  - A la mâchoire ſupérieure ſeulement... *Le Narhval*. 3... Ordre III.
  - Aux deux mâchoires... *Le Dauphin*. 4... Ordre IV.

in maxillâ inferiore obliquè includuntur, ut *Balæna*. Dentata dentes habent vel in maxillâ inferiore tantùm, ut *Cetus*; vel in maxillâ ſuperiore tantùm, ut *Ceratodon*; vel in maxillâ utrâque, ut *Phyſeter*, *Delphinus*, &c.

In quatuor Ordines dividuntur.

In primo Ordine continentur ea quæ ſunt edentula.

In ſecundo, ea quæ ſunt dentata in maxillâ inferiore tantùm.

In tertio, ea quæ ſunt dentata in maxillâ ſuperiore tantùm.

In quarto deniquè, ea quæ ſunt dentata in utrâque maxillâ.

Tabula Synoptica Cetaceorum.

Cetacea ſunt, vel
- Edentula... *Balæna*. 1... Ordo I.
- Dentata,
  - In maxillâ inferiore tantùm... *Cetus*. 2... Ordo II.
  - In maxillâ ſuperiore tantùm... *Ceratodon*. 3... Ordo III.
  - In maxillâ utrâque... *Delphinus*. 4... Ordo IV.

ORDO I.

CETACEA

edentula.

UNICO Genere, *Balænæ* ſcilicet, hic Ordo conſtituitur.

I.

Genus Balænæ.

Hujus character eſt
Dentes nulli:
Maxillâ ſuperior laminis corneis utrinque inſtructa.

Obſ. Hujus Generis ſpecierum aliæ binas tantùm habent pinnas laterales, utrinquè unam; aliæ, præter iſtas laterales, tertiam habent in dorſo pinnam.

ORDRE I.

LES CETACÉES

Qui n'ont point de dents.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui de la *Baleine.*

I.

Le Genre de la Baleine.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents:
D'avoir la mâchoire ſupérieure garnie des deux côtés de lames de corne.

Obſ. Parmi les eſpeces de ce Genre, les unes n'ont que deux nageoires latérales, ſçavoir une de chaque côté; & les autres, outre ces deux latérales, en ont une troiſiéme ſur le dos.

1. LA BALEINE ORDINAIRE DE GROENLAND.

Balæna bipinnis, in dorſo nigricans, in ventre alba, dorſo levi... BALÆNA VULGARIS GROENLANDICA.

Balæna vulgaris edentula dorſo non pinnato. *Raj. Syn. Piſc. p. 6. A.* 1.
Balæna major laminas corneas in ſuperiore maxillâ habens, fiſtulâ donata, bipinnis. *Raj. Syn. Piſc. p.* 16. 7.
Sibbald. Obſ. p. 28.
Balæna fiſtula in medio capite, dorſo caudam versùs acuminato. *Art. Gen. Piſc. g.* 48. *ſp.* 1.

Art. Synon. Piſc. g. 48. *ſp.* 1.
Art. Deſcr. Piſc. g. 48. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. N°. 264.
Balæna fiſtula in medio capite, dorſo caudam versùs acuminato. Myſticetus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 99. ſp.* 1.
Balæna vera Zorgdrageri. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 11. 1.
Balæna Rondeletii, Geſneri & aliorum. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 35.
Balæna vulgò dicta, ſive Myſticetus Ariſtotelis, Muſculus Plinii. *Geſn. Piſc. Fig. p.* 132. (*Fig. mala*).
Balæna vulgò dicta, ſive Muſculus. *Rondel. Piſc. Fig. p.* 475. (*Fig. ut ſuprà*).
Balæna vulgò dicta. *Geſn. Icon. Aquat. Fig. p.* 167. (*Fig. eadem*).
Balæna vulgi. *Aldrov. Piſc. p.* 688. *Fig. p.* 732. (*Fig. eadem*).
Jonſt. Piſc. p. 152.
Muſ. Worm. p. 281.
Balæna vulgaris. *Charlet. Exer. p.* 46.
Baleine de Groenland. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I. p.* 198. *& Tom. II. p.* 78. *Fig. p.* 168. (*Fig. bonne*).
Les Eſpagnols l'appellent VALLENA. *Geſn.*
Les Italiens, BALENA; VALENA. *Geſn.*
Les Allemands, WAL; WALLFISCH; WALLER. *Geſn.*
Les Suédois, GROENLANDS HWALFISKEN. *Art.* GRÖNLANDS-WALFISK. *Linn.*
Les Danois, SLICHTEBACK, *ou* SANDHUAL. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Groënlandois, ARBACH. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Iſlandois, SLETTBARK. *Hiſt. d'Iſl.*
Les autres Habitans du Nord, SLITBAKKER. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Anglois, WHALE, *ou* GREENLANDS-WHALE. *Art. Will.*

La Baleine eſt le plus grand des Animaux. Elle a ordinairement 70 pieds de long. (*Jean Faber* dit qu'il y en a qui vont juſqu'à 100 pieds*). Sa tête ſeule occupe le tiers de ſa longueur. Elle n'a point de dents; mais la mâchoire ſupérieure eſt garnie des deux côtés de lames de corne qui s'ajuſtent obliquement dans l'inférieure, comme dans un fourreau, qui pour cela eſt beaucoup plus large que la ſupérieure. Les lames de corne de devant & de derriere ſont les plus

* Raj. Syn. Piſc. p. 6.

Omnium Animalium maxima eſt *Balæna*. 70 pedum longitudinem communiter attingit. (Secundùm *Joannem Fabrum* ſunt quæ 100 pedes longitudine adæquant*). Caput maximum eſt, ſiquidem tertiam totius animalis longitudinis partem obtinet. Dentibus omninò caret; ſed eorum loco, in maxillâ ſuperiore tantùm utrinque ſunt laminæ corneæ, quæ in maxillâ inferiore, ſicut in vaginâ, obliquè includuntur: quam-

* Raj. Syn. Piſc. p. 6.

obrem maxillam inferiorem ſuperiore multò latiorem habet. Laminæ autem illæ corneæ in anteriore oris parte, itemque in poſteriore, breviores ſunt, in mediâ longiſſimæ, ut interdùm 8 vel 10 pedum longitudinem adæquent. Laminæ etiam illæ tenuiore ſui parte, ſecundùm earum longitudinem, appendicibus, ſetarum *Porcinarum* æmulis, augentur. Oculos habet oculis *Bovinis* non multò majores, & ſuprà oris angulos collocatos. Auriculæ ei nullæ; ſed, cuticulâ capitis detractâ, poſt & infrà oculum macula inſpicitur nigra, eoque in loco meatus auditorius. In parte capitis ſuperiore, ſuprà oculos, eminentia eſt quædam, è quâ hinc inde exeunt fiſtulæ, quibus aquam rejicit & efflat. Linguam habet maximam, ſubſtantiæ mollis & ſpongioſæ, maxillæ inferiori firmiter adnexam, albicantem, & ad margines maculis nigris ornatam. Pinna nulla eſt in dorſo; binas tantùm habet laterales (utrinque unam) poſt & paulò infrà oris angulos ſitas, oſſibus intùs firmatas, quæ *humanæ* manûs modo in digitos expanduntur. Pinnæ illæ 10 circiter pedes longæ ſunt, & 3 latæ; quæ latitudo, versùs ex-

courtes; & celles du milieu les plus longues : ces dernieres ont juſqu'à 8 ou 10 pieds de long. Toutes ces lames de corne ſont garnies dans toute leur longueur, du côté de leur tranchant, d'appendices qui reſſemblent à des poils de *Sanglier*. Ses yeux, qui ne ſont gueres plus grands que ceux d'un *Bœuf*, ſont placés audeſſus des angles de la bouche. Elle n'a point d'oreilles; mais lorſqu'on a ôté l'épiderme de la tête, on découvre derriere l'œil & un peu plus bas une tache noire, & dans ce même endroit un conduit, par lequel le ſon pénétre juſqu'au tympan. Elle a ſur la tête, & audeſſus des yeux, une éminence, de chaque côté de laquelle eſt un canal, par lequel elle rejette l'eau. Sa langue eſt très grande, d'une ſubſtance molle & ſpongieuſe, fermement attachée à la mâchoire inférieure, blanchâtre, & marquée vers ſes bords de taches noires. Elle n'a point de nageoires ſur le dos : elle en a ſeulement une de chaque côté, ſituée derriere, & un peu audeſſous des angles de la bouche, & ſoutenue intérieurement par des os, qui imitent ceux des doigts de la main de l'*homme*. Ces nageoires ont environ 10 pieds de long, & 3 de larges; & cette largeur diminue à meſure qu'elle s'éloigne du corps. Sa queue qui eſt plat-

te horizontalement, eſt l'arge d'environ 20 pieds. Sa peau eſt liſſe & noirâtre ſur le dos, & marbrée en certains endroits de blanc & de jaune, ſurtout ſur les nageoires, & ſur la queue. Le ventre eſt blanc. Le mâle a une verge qui a 6 pieds de long, & 7 à 8 pouces de diamétre, & qui ſe termine en une pointe d'un pouce de diamétre. Il la porte ordinairement au dedans du corps, où elle eſt cachée comme dans un fourreau. La partie de la génération de la femelle eſt ſemblable à celle des *Quadrupedes*, & eſt ordinairement fermée. La femelle a auſſi au bas du ventre 2 mammelles, qui, lorſqu'elle a des petits, ont 6 ou 8 pouces d'épaiſſeur, ſur 10 ou 12 de diamétre. On la trouve dans la *Mer du Nord*.

tremum procedendo, minuitur. Cauda horizontaliter plana eſt, & 20 circiter pedes lata. Cutis leviſſima, in ventre alba, in dorſo nigricans, & quibuſdam in locis, præſertim in pinnis & caudâ, ex albo & flavo, marmoris in modum, variegata. Mas penem habet 6 pedes longum, cujus diameter 7 aut 8 pollices attingit, quique in acumen diametri unius pollicis deſinit. Penis iſte in corpore ſub cute, ſicut in vaginâ, includitur. Fœmina vulvam habet vulvis *Quadrupedum* ſimilem, cujus orificium communiter clauſum eſt; & in imo ventre mammas duas, quæ, dum pulli lacte aluntur, 6 aut 8 pollices craſſæ ſunt, earumque diameter 10 aut 12 pollices æquat. Habitat in *Mari Septentrionali*.

2. La Baleine d'Islande.

Balæna bipinnis, ex nigro candicans, dorſo levi... Balæna Islandica.

Balæna Glacialis. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p.* 12. 3.
Nord-Caper. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I. p.* 199. *& Tom. II. p.* 91.

Elle reſſemble par ſa figure à la précédente: elle en differe ſeulement parce qu'elle a la tête & les lames de corne, qui garniſſent la mâchoire ſupérieure, beaucoup plus petites, & le corps

Figurâ ſuâ præcedentem æmulatur: ab eâ tantùm differt corpore graciliore, & capite & laminis corneis, maxillæ ſuperiori affixis, multò minoribus. Cutem ha-

bet levem, & ex nigro candicantem. *Harengis* veſcitur. Habitat in mari, circà *Norvegiam*, & *Iſlandiam.*

plus mince. Sa peau eſt liſſe, & d'un noir qui tire un peu ſur le blanchâtre. Elle ſe nourrit de *Harengs*. On la trouve ſur les côtes de *Norvege* & d'*Iſlande.*

3. LA BALEINE DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

Balæna bipinnis, unicò in dorſo gibbo... BALÆNA NOVÆ ANGLIÆ.

Balæna gibbo unico propè caudam. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 12. I.
Pflockfiſch. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 101.
Les Anglois l'appellent BUNCH, *ou* HUMP-BACK-WHALE. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*

A *Balænâ Groenlandicâ* differt gibbo ſuo in dorſo, versùs caudam, ſito, unius pedis altitudine & capitis *humani* craſſitie. Binas habet pinnas laterales (utrinque unam) in medio ferè corpore ſitas, 18 pedes longas, & candidiſſimas. Habitat in mari circà *Novam Angliam.*

Elle differe de la *Baleine de Groënland* parce qu'elle a ſur le dos, vers la queue, une eſpece de boſſe, qui a un pied de haut & l'épaiſſeur de la tête d'un *homme*. Elle a deux nageoires, une de chaque côté, placées preſque au milieu du corps. Ces nageoires ont chacune 18 pieds de long, & ſont fort blanches. On la trouve ſur les côtes de la *Nouvelle Angleterre.*

4. LA BALEINE A SIX BOSSES.

Balæna bipinnis, ſex in dorſo gibbis.

Balæna gibbis vel nodis ſex. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 13. 2.
Knoten-Fiſch, ou Knobbel-Fiſch. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 102.
Les Anglois l'appellent SCRAG-WHALE. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*

Figurâ ſuâ *Balænam Groenlandicam* imitatur : ab eâ tantùm differt quod laminas habeat corneas albas, ſexque in dorſo gibbos.

Elle reſſemble par ſa figure à *la Baleine de Groënland* : elle en differe ſeulement parce que ſes lames de corne ſont blanches ; & qu'elle a ſix boſſes ſur le dos.

5. Le Gibbar.

Balæna tripinnis, ventre levi.

Balæna edentula corpore ſtrictiore, dorſo pinnato. *Raj. Syn. Piſc. p.* 9. 2. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 13. 1. *a.*
Balæna fiſtula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorſo. *Art. Geſn. Piſc. g.* 48. *ſp.* 2.
Art. Synon. Piſc. g. 48. *ſp.* 2.
*Faun. Suec. Linn. N*o. 265.
Balæna fiſtula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorſo. Phyſalus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 99. *ſp.* 2.
Balæna vera. *Rondel. Piſc. Fig. p.* 482. (*Fig. mala*).
Balæna vera Rondeletii. *Geſn. Piſc. Fig. p.* 135. (*Fig. ut ſuprà*).
Gen. Icon. Aquat. Fig. p. 166. (*Fig. eadem*).
Aldro. Piſc. Fig. p. 677. (*Fig. eadem*).
Balæna vera Rondeletii, Geſn. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 38.
Phyſeter veterum. *Raj. Art.*
Gibbar, ou Finfiſch. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 92. *Fig. p.* 168. (*Fig. bonne*).
Les Xaintongeois l'appellent Gibbar. *Rondel. Geſn. Hiſt. d'Iſl.*
Les Grecs, φάλαινα. *Geſn.*
Les Suédois, Finn-Fisk. *Linn.*
Les Anglois, Finfish. *Raj. Art.* Finbak-Whale. *Klein.*

Sa longueur eſt égale à celle de la *Baleine de Groënland*; mais ſa groſſeur eſt beaucoup moindre, & ſon corps plus effilé. Il en differe encore plus parce qu'il a ſur le dos, vers la queue, une nageoire droite & pointuë, de 3 ou 4 pieds de long: celles des côtés ont 6 ou 7 pieds. Il a ſur la tête un double canal, par lequel il rejette l'eau avec violence. Ses lames de corne ſont plus courtes que celles de la *Baleine de Groënland*, & de couleur bleue. Sa peau eſt liſſe, & brune ſur le dos & blanche ſur le ventre. Sa queue eſt beaucoup plus

Balænæ Groenlandicæ longitudine par eſt; verùm craſſitie multò minor, & corpus ipſius gracilius eſt. Ab eâ faciliùs adhuc dignoſcitur ex pinnâ rectâ & acutâ, 3 aut 4 pedes longâ, dorſo innaſcente non longè à caudâ. Pinnæ laterales 6 aut 7 pedes longæ ſunt. In parte capitis ſuperiore duplex eſt fiſtula, per quam vehementer aquam rejicit & efflat. Maxillæ ſuperiori innaſcuntur laminæ corneæ quàm in *Balænâ Groenlandicâ* breviores, & coloris cœrulei. Cutis ei levis eſt, in

dorſo

dorſo fuſca, in ventre alba. Oris rictum habet multò ampliorem quam *Balæna vulgaris*. *Harengis*, *Scombris*, aliiſque *Piſcibus* veſcitur. In *Indiâ* & *Novo Orbe* frequens.

grande que celle de la *Baleine ordinaire*. Il ſe nourrit de *Harengs*, de *Maqueraux*, & d'autres *Poiſſons*. On le trouve fréquemment dans l'*Inde* & dans le *Nouveau Monde*.

6. La Baleine a museau rond.

Balæna tripinnis, ventre rugoſo, roſtro rotundo.

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam, & ſuperiore multò latiorem habens. *Raj. Syn. Piſc. p.* 17. 9.
Sibbald. Obſ. p. 33. *Fig. T.* 3. (*Fig. ſat bona*).
Balæna fiſtula duplici in fronte, maxillâ inferiore multò latiore. *Art. Gen. Piſc. g.* 48. *ſp.* 4.
Art. Synon. Piſc. g. 48. *ſp.* 4.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 99. *ſp.* 3.
Balęna Bellonii. *Aldro. Piſc. Fig. p.* 676. (*Fig. mala*).
Balęna. *Bell. Aquat. p.* 4. *Fig. p.* 6. (*Fig. ut ſuprà*).
Balene. *Bell. des Poiſ. p.* 4. *Fig. p.* 5. (*Fig. mauv.*)

Illius, cujus deſcriptionem dedit *Sibbaldus*, longitudo 78 pedes æquat: ambitus corporis 35 pedes ſuperat. Maxilla inferior multò latior eſt & amplior ſuperiore, figuræ ſemicircularis, & 13 pedes cùm 2 ½ pollicibus longa: ſuperior verò anguſtior, & versùs partem extremam contractior, in acutum deſinit. Rictus autem ipſius tantus eſt, ut in ejus ore uno eodemque tempore 14 *homines* ſtare poſſint. Lingua 15 pedes & 7 ½ pollices longa, & qua parte latiſſima 15 quoque pedes habet, ſubſtantiâque molliſſimâ conſtat. Totum palatum ni-

La longueur de celle que *Sibbald* a décrite, eſt de 78 pieds. Le tour de ſon corps eſt de plus de 35 pieds. Sa mâchoire inférieure eſt beaucoup plus grande & plus large que la ſupérieure, & de figure ſemicirculaire, & elle a 13 pieds 2 ½ pouces de long: ſa mâchoire ſupérieure eſt plus étroite, & ſe termine en pointe. Sa gueule eſt ſi grande, qu'il y peut tenir 14 *hommes* debout dans le même tems. Sa langue, qui eſt d'une ſubſtance molle, a 15 pieds 7 ½ pouces de long, & 15 pieds dans ſa plus grande largeur. Tout ſon palais eſt couvert de ſoyes noires, qui luy tombent ſur la langue: ſes

lames de corne ſont noires & courtes; les plus longues n'ont que 3 pieds. Elle a ſur le front deux canaux, par leſquels elle rejette l'eau, qui approchent de de la figure d'une pyramide, dont la baſe eſt vers le front. Ses yeux ſont placés un peu audeſſus des angles de la bouche, & diſtants du bout du muſeau de 13 pieds 2 pouces. Ses nageoires latérales ont 10 pieds de long, & 2 ½ pieds dans leur plus grande largeur, & 3 pouces ſeulement vers l'extrémité, & ſont éloignées de l'ouverture de la bouche de 6 pieds 5 pouces. Celle du dos eſt placée vers la queue, & eſt longue d'environ 3 pieds, & large de 2. Sa queue a 18 ½ pieds de large. Sa verge, qui eſt placée un peu audeſſous du nombril, a 5 pieds de long, & 4 pieds de tour à ſon origine; & elle devient enſuite peu à peu plus étroite juſqu'à ſon extrémité. L'anus eſt placé à 5 pieds audeſſous de la verge: ſon ouverture eſt longue d'un pied. Depuis la mâchoire inférieure juſqu'au nombril ſon ventre eſt garni de plis ou de rides, qui ont chacune 2 pouces de large, & qui ſont diſtantes d'autant les unes des autres. La couleur de ſa peau eſt noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. Cette eſpece vit de *Harengs*.

gris contectum eſt ſetis, quæ ſuprà linguam pendent: laminæ corneæ nigræ ſunt & breves; longiores enim 3 tantùm pedes æquant. Duæ ſunt in fronte fiſtulæ, quibus aquam rejicit & efflat, figuræ ad pyramidalem accedentis, cujus baſis versùs frontem vertitur. Oculi paulò ſuprà oris angulos ſiti ſunt, & ab eis ad roſtri extremitatem diſtantia eſt 13 pedum & 2 pollicum. Pinnæ laterales 10 pedes longæ, qua parte latiſſimæ 2 ½ pedes habent, & versùs extremum 3 tantùm pollices latæ. Ab eis ad oris hiatum diſtantia eſt 6 pedum & 5 pollicum. Pinna dorſalis versùs caudam ſita eſt, treſque circiter pedes longa, & 2 lata. Cauda 18 ½ pedes latitudine attingit. Penis, qui paulò infrà umbilicum pendet, 5 pedes longus, in exortu 4 pedes in ambitu obtinet, ſenſimque ad extremum anguſtius vergit. Ad 5 pedes ſub pene anus ſitus eſt; rima autem ejus unum pedem longa. A maxillâ inferiore ad umbilicum venter plenus eſt plicis ſeu rugis, quæ in latitudine 2 pollices obtinent, & pars eminens & pars cava æquales ſunt, ejuſdemque menſuræ. Cutis eſt in dorſo nigra, in ventre alba. *Harengis* victitat hæc ſpecies.

7. La Baleine a museau pointu.

Balæna tripinnis, ventre rugoſo, roſtro acuto.

Balæna tripinnis, nares habens, cum roſtro acuto, & plicis in ventre. *Raj. Syn. Piſc. p.* 16. 8.
Sibbald. Obſ. p. 29. *Fig. T.* 1. *Lit D.* (*Fig. ſat bona*).
Balæna fiſtulâ duplici in roſtro, protuberantiâ cornuiformi, in extremo dorſo. *Art. Gen. Piſc. g.* 48. *ſp.* 3.
Art. Synon. Piſc. g. 48. *ſp.* 3.
An Balæna *Tigridis* inſtar variegata? *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 16.

Junioris hujus ſpeciei deſcriptionem dedit *Sibbaldus.* Ab extremitate roſtri ad caudam 46 pedes longa eſt. Ambitus corporis juxtà pinnas laterales, qua parte craſſiſſimum, 20 pedum eſt, & 12 tantùm pedum juxtà pinnam dorſalem menſuratus. Caput eſt oblongum, molliter ad anguſtiam quamdam, ſecundùm roſtri longitudinem, inclinans: roſtrum autem figuræ inter acutum & obtuſum mediæ. Maxilla inferior circà medium 4 $\frac{1}{2}$ pedes lata: oris rictus 10 pedes longus, & 4 pedes cum 2 pollicibus latus: lingua, licet contracta, 5 pedes longa, versùs radices 3 pedes lata, & paris ferè cum latitudine craſſitiei, ſubſtantiâ, colore, & figurâ planè *Bovinæ* ſimilis. In parte roſtri altiore duæ ſunt fiſtulæ, quibus aquam rejicit, ab extremitate maxillæ ſuperioris 6 pedes &

Sibbald en a décrit une jeune de cette eſpece, qui a 46 pieds de long depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue: le tour de ſon corps meſuré aux nageoires latérales, où il eſt le plus gros, eſt de 20 pieds, & de 12 ſeulement meſuré à la nageoire du dos. Sa tête eſt oblongue, & ſe rétrécit un peu vers le bout du muſeau, qui tient le milieu entre l'aigu & l'obtus. La mâchoire inférieure eſt large de 4$\frac{1}{2}$ pieds vers ſon milieu: l'ouverture de la bouche eſt longue de 10 pieds, & large de 4 pieds 2 pouces: ſa langue, quoique contractée, a 5 pieds de long, & 3 de large vers ſa racine, & preſque autant d'épaiſſeur, & eſt ſemblable en ſubſtance, en couleur, & en figure à celle d'un *Bœuf.* Elle a ſur la partie la plus élevée de la tête 2 canaux, par leſquels elle rejette l'eau, qui ſont éloignés de 6 pieds 8 pouces du bout de la mâchoire ſupérieure. Ses yeux ſont environ de la groſſeur de

ceux d'un *Bœuf*, & placés auprès des angles de la bouche. Elle a 3 nageoires, ſçavoir 2 latérales & une ſur le dos : les latérales, qui ſont placées à la poitrine, & diſtantes des yeux de 5 pieds, ont 5 pieds de long, & 1 $\frac{1}{2}$ pied de large : celle du dos eſt diſtante de la queue de 8 $\frac{1}{2}$ pieds, & reſſemble aſſez à une corne. Sa queue a 9 $\frac{1}{2}$ pieds de large. Sa verge a à peine 2 pieds de long, & eſt placée à 5 $\frac{1}{2}$ pieds audeſſous du nombril. A 3 pieds audeſſous de la verge eſt ſitué l'anus, dont l'ouverture a $\frac{1}{2}$ pied de long, & eſt éloignée du bout de la queue de 14 pieds. Depuis la mâchoire inférieure juſqu'au nombril & aux nageoires latérales, le ventre eſt garni de plis ou de rides longitudinales, larges d'un pouce. La largeur & la profondeur des ſillons qu'elles forment, n'eſt pas tout à fait d'un pouce. Sa peau eſt très liſſe, noire & brillante ſur le dos, & blanche ſur le ventre.

8 pollices diſtantes. Oculi *Bovinis* ferè magnitudine pares videntur, nec procul ab oris angulis collocantur. 3 ei ſunt pinnæ, duæ laterales, unaque dorſalis : pinnæ laterales, utrinque in pectore ſitæ, & 5 pedes ab oculis diſtantes, 5 pedes longæ ſunt, & 1 $\frac{1}{2}$ pede latæ : pinna verò dorſalis 8 $\frac{1}{2}$ pedes à caudâ diſtat, cornuque ſat benè imitatur. Cauda 9 $\frac{1}{2}$ pedes lata. Penis, ad 5 $\frac{1}{2}$ pedes infrà umbilicum ſitus, pedes 2 in longitudine vix attingit. Infrà eum ad 3 pedes poſitus eſt anus, cujus apertura pedem dimidium æquat, & ab extremo caudæ 14 pedes diſtat. A maxillâ inferiore ad umbilicum, & uſque ad pinnas laterales, permultæ ſunt in ventre plicæ ſive rugæ longitudinales 1 pollice latæ; & ſulcorum inter has latitudo & profunditas pollice minores. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigra & nitidiſſima, in ventre alba.

ORDO II.

CETACEA

Dentata in maxillâ inferiore tantùm.

GENUS *Ceti* unicum eſt ad hunc Ordinem conſtituendum.

II.

Genus Ceti.

Hujus character eſt
Dentes in maxillâ inferiore tantùm:
Alveoli in maxillâ ſuperiore, ad dentes inferioris includendos aptati.

Obſ. Hujus Generis ſpecierum aliæ binas tantùm habent pinnas laterales, utrinque unam; aliæ, præter iſtas laterales, tertiam habent in dorſo.

ORDRE II.

LES CETACÉES

Qui ont des dents à la mâchoire inférieure ſeulement.

CET Ordre ne contient qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Cachalot*.

II.

Le Genre du Cachalot.

Son caractere eſt
D'avoir des dents à la mâchoire inférieure ſeulement:
Et à la mâchoire ſupérieure des trous propres à recevoir les dents de la mâchoire inférieure.

Obſ. Parmi les eſpeces de ce Genre les unes n'ont que deux nageoires latérales, une de chaque côté; & les autres, outre ces deux latérales, en ont une troiſiéme ſur le dos.

1. LE CACHALOT.

Cetus bipinnis, ſuprà niger, infrà albicans, fiſtulâ in cervice, dorſo levi... CETUS.

Cetus dentatus. *Muſ. Worm. p.* 280.
Charlet. Exer. p. 47.

Cete, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum, Cluſii Exot. *Raj. Syn. Piſc. p.* 11. 4.

Cete Cluſio deſcriptum, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 41. *Fig. T. A.* 1. *F.* 3. (*Fig. bona*).

Cete. Cluſii Exot Lib. VI. Raji, Willughbeji, & aliorum. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 14. 1.

Aliud Cete admirabile. *Cluſ. Exot. Fig. p.* 131. (*Fig. ſat bona*).

Balæna major, in inferiore tantùm maxillâ dentata, macrocephala, bipinnis. *Raj. Syn. Piſc. p.* 15. 3.
Sibbald. Obſ. p. 12.

Balæna. *Jonſt. Piſc. p.* 151. *Fig. T.* 41. & 42. [*Fig. bonis*].

Catodon fiſtula in cervice. *Art. Gen. Piſc. g.* 50. *ſp.* 2.
Art. Synon. Piſc. g. 50. *ſp.* 2.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 97. *ſp.* 2.
Faun. Suec. Linn. N°. 262.

Aquatile ingens. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 263. (*Fig. bona*).

Cachelot, ſive Potfish, Zorgdrageri. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 14. 2.

Cachalot. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 116.

Les Hollandois l'appellent POTWALFISH. *Klein. Hiſt. d'Iſl.* CAZILOT, *ou* POTFISCH; *& quelques uns*, NORD-CAPER. *Hiſt. d'Iſl.*

Le Cachalot décrit par *Cluſius*, a 52 ou 53 pieds de long. (Il y en a qui ont juſqu'à 80 pieds de long, & le reſte à proportion). Le tour de ſon corps eſt d'environ 31 pieds. Sa tête eſt très groſſe, & applatie en devant, comme le mufle d'un *Bœuf.* La mâchoire ſupérieure a 15 pieds de long, depuis ſon extrémité juſqu'aux yeux; & la mâchoire inférieure n'en a que 7: elle eſt garnie tout au tour de dents de la groſſeur du poignet, qui ſortent des gencives de 2 ou 3 pouces, & qui s'emboitent dans autant de trous ſitués dans la mâchoire ſupérieure. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé ſur le ſommet de la tête vers le dos, & a environ 3 pieds

Cetus à *Cluſio* deſcriptus 52 aut 53 pedum longitudinem attingit. (Sunt qui 80 pedum longitudinem æquant, craſſitie proportionatâ). 31 circiter pedes in ambitu corporis obtinet. Caput habet craſſiſſimum, & roſtri *Bovini* inſtar anteriùs compreſſum. Maxilla ſuperior, ab ipſius extremitate ad oculos uſque, 15 pedes longa eſt; maxilla verò inferior 7 tantùm pedes longa, in cujus ambitu plurimi ſunt dentes carpi humani craſſitie, qui è gingivis ad 2 vel 3 pollicum longitudinem exerti ſunt. Maxilla ſuperior totidem habet alveolos carneos, in quibus dentes inferioris excipit. In cervice,

verſùs dorſum, fiſtula eſt, foramen circiter 3 pedes amplum, per quod aquam in altum ejicit. Oculos habet 7 aut 8 pollices longos; pinnas laterales duas (utrinque unam) 4 pedes ab oculis diſtantes, 4 pedes & 4 pollices longas, unoque ferè pede craſſas. Ab umbilico ad maxillas diſtantia eſt 16 pedum: ad 3 pedes infrà umbilicum penis eſt 6 pedes longus; & infrà penem ad 3 ½ pedum diſtantiam anus eſt collocatus: cauda verò craſſiſſima, 13 pedes lata, 13 ½ pedes ab ano diſtat. Cutis eſt in dorſo nigra, in ventre alba.

de grandeur. Ses yeux ont 7 à 8 pouces de long. Il n'a que deux nageoires (une de chaque côté) diſtantes des yeux de 4 pieds. Ces nageoires ont 4 pieds 4 pouces de longueur, & preſque 1 pied d'épaiſſeur. Le nombril eſt éloigné des mâchoires de 16 pieds: à 3 pieds audeſſous du nombril ſe trouve la verge, qui a 6 pieds de long: l'anus eſt placé à 3 ½ pieds audeſſous de la verge; & de là juſqu'à la queue, il y a 13 ½ pieds de diſtance. Sa queue eſt très épaiſſe, & large de 13 pieds. Sa peau eſt noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre.

2. LE CACHALOT BLANC.

Cetus bipinnis, ex albo flaveſcens, fiſtulâ in cervice, dorſo levi... CETUS ALBICANS.

Balæna albicans. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 12. 2.
Albus Piſcis Cetaceus. *Raj. Syn. Piſc. p.* 11. 5.
White-Fish, Frederici Martenſ. *Raj. Klein.*
Wittfiſch, ou Weisfiſch. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 148.

Corporis longitudo 15 eſt aut 16 pedum. Figurâ ſuâ *Balænam vulgarem* imitatur; capite tamen acutiore donatur. Dentes habet parumper incurvos, compreſſos, apice rotundatos; eminentiam quamdam in cervice, & fiſtulam, per quam aquam ejicit; pinnam in dorſo nullam,

La longueur de ſon corps eſt de 15 ou 16 pieds. Il reſſemble par ſa figure à la *Baleine ordinaire*; il a cependant la tête plus pointue. Ses dents ſont un peu recourbées, applaties, & arrondies par enhaut. Il a ſur le ſommet de la tête une éminence, & un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire

ſur le dos; mais il en a une de chaque côté paſſablement longue. Sa queue eſt ſemblable à celle de la *Baleine ordinaire*. La couleur de ſa peau eſt d'un blanc jaunâtre. On le trouve dans le *Détroit de Davis*, & ſur tout dans *la Baye Méridionale*, appellée *Sud-Bucht*.

duas verò laterales, utrinque unam, pro mole corporis, ſatis longam; caudam caudæ *Balænæ vulgaris* æmulam. Cutis ex albo flaveſcit. Habitat in *Freto Davis*; in *Freto Meridionali, Sud-Bucht* vocato, frequens.

3. Le Cachalot de la Nouvelle Angleterre.

Cetus bipinnis, fiſtula in cervice, dorſo gibboſo... Cetus Novæ Angliæ.

Balæna Dudleji, dorſo Gibbo. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 15.
Cachalot des côtes de la Nouvelle Angleterre. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 127.
Cachalot. *Hiſt. de l'Acad. an.* 1741. *p.* 26.
Les Anglois l'appellent Sperma Ceti-Whale. *Hiſt. d'Iſl.*
Dans les Bermudes il porte le nom de Trumpo. *Hiſt. d'Iſl.*

La longueur de ſon corps eſt de 60 ou 70 pieds, & l'épaiſſeur de 30 ou 40 pieds. Sa tête eſt énorme, & fait preſque la moitié de la longueur de ſon corps. La mâchoire ſupérieure eſt beaucoup plus épaiſſe que l'inférieure; elle eſt fort large vers le muſeau, & ſon bout eſt applati en avant, comme le mufle d'un *Taureau*. La mâchoire inférieure eſt garnie de dents de la groſſeur du bras près de la main, qui ſont éloignées l'une de l'autre d'environ ½ pied, & qui s'emboitent dans autant de trous ſitués à la mâchoire ſupérieure. Ses yeux ſont petits à

Corporis longitudo 60 aut 70 pedes æquat; craſſities 30 aut 40 pedes. Caput eſt prægrande, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla ſuperior inferiore multò craſſior eſt, & latiſſima circà roſtrum, cujus extremitas, roſtri *Tauri* inſtar, anteriùs compreſſa eſt. Plurimi ſunt in maxillâ inferiore dentes, carpi humani craſſitie, circiter ½ pedem à ſe invicem diſtantes: maxilla autem ſuperior totidem habet alveolos carneos, in quibus prædicti dentes excipiuntur. Oculos habet, pro mole corporis,

poris, exiguos; fiſtulam in cervice, cujus diameter ſaltem 1 pedem æquat, & per quam aquam rejicit & efflat; binas tantùm pinnas laterales, utrinque unam; & loco pinnæ dorſalis, gibbum habet unum pedem craſſitie ſuperantem. Cutis eſt ad tactum molliſſima, & ex cinereo nigricans. Habitat in mari; circà *Novam Angliam* frequens.

proportion du corps. Il a ſur le ſommet de la tête un canal par lequel il rejette l'eau, & qui a au moins 1 pied de diamétre. Il n'a que deux nageoires, ſçavoir une de chaque côté: & à la place de la nageoire du dos, il a une boſſe de plus d'un pied d'épaiſſeur. Sa peau eſt très douce au toucher, & d'un gris noirâtre. On le trouve communément ſur les côtes de la *Nouvelle Angleterre.*

4. Le Petit Cachalot.

Cetus bipinnis, fiſtula in roſtro... Cetus minor.

Balæna minor, in inferiore maxillâ tantùm dentata, ſine pinnâ, aut ſpinâ in dorſo. *Raj. Syn. Piſc. p.* 15. 2.
Sibbald. Obſ. p. 9.
Catodon fiſtulâ in roſtro. *Art. Gen. Piſc. g.* 50. *ſp.* 1.
Art. Synon. Piſc. g. 50. *ſp.* 1.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 97. *ſp.* 1.

Longitudo corporis 24 pedes æquat. Caput habet rotundum, cum rictu oris parvo; dentes in maxillâ inferiore tantùm; in ſuperiore autem alveolos, pro dentibus inferioris recipiendis: ſunt autem hi dentes in planum finientes, & dimidium tantùm pollicis unius extrà gingivas extant. Fiſtulam habet in roſtro, per quàm aquam ejicit. Pinnâ dorſali caret; duabus tantùm lateralibus, utrinque unâ, donatur.

La longueur de ſon corps eſt de 24 pieds. Sa tête eſt ronde, & l'ouverture de ſa bouche petite. Il n'a des dents qu'à la mâchoire inférieure, qui s'emboitent dans autant de trous ſitués à la mâchoire ſupérieure: ces dents ne ſortent des gencives que d'un demi pouce, & ſont terminées par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé ſur le muſeau. Il n'a point de nageoires ſur le dos; il n'en a que deux latérales, une de chaque côté.

5. Le Cachalot a dents pointuës.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis.

Deuxiéme eſpece de Cachalot. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 139.

Celui qui eſt décrit dans l'*Hiſt. d'Iſl. & de Gro.* a 70 pieds de long. (On en trouve de 80 à 100 pieds). Sa tête eſt énorme, & a preſque la moitié de la longueur de ſon corps. La mâchoire inférieure, qui eſt beaucoup plus petite que la ſupérieure, s'emboite entiérement dans cette derniere, & eſt garnie de groſſes dents droites & pointuës par en-haut, rangées à diſtances égales les unes des autres, comme celles d'une *Scie*, & qui s'emboitent dans des trous ſitués à la mâchoire ſupérieure. Ses yeux ſont très petits, brillants & jaunâtres. Sa langue eſt petite & pointuë; le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé au haut & ſur le devant de la tête. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune 1 ½ pied de long, il en a une troiſiéme ſur le dos vers la queue. Il a auſſi ſur le haut du dos, une boſſe fort élevée. Sa peau eſt très liſſe, & noirâtre ſur le dos, & blanchâtre ſur le ventre.

Longitudo illius, cujus deſcriptionem dedit *D. Anderſonius*, *Hiſt. d'Iſl. & de Gro.* 70 pedes æquat. (Sunt qui 80 ad 100 pedes longitudine attingunt). Caput eſt maximum, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla inferior ſuperiore multò minor eſt, & in illâ omninò includitur. In maxillâ inferiore dentes ſunt craſſi, recti, in apice acuti, æqualiter à ſe invicem diſtantes, *Serræ* dentium inſtar; in maxillâ ſuperiore verò totidem ſunt alveoli, ad excipiendos inferioris maxillæ dentes comparati. Oculos habet valdè exiguos, ſplendentes & flavicantes; linguam parvam & acutam; in parte capitis anteriore & altiore fiſtulam, per quam aquam in altum ejicit; pinnas duas laterales, utrinque unam, 1 ½ pede longam, & præter iſtas, tertiam in dorſo versùs caudam, & gibbum altiſſimum in parte ſuperiore dorſi. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigricans, in ventre candicans.

6. Le Cachalot a dents en faucilles.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, arcuatis, falciformibus.

Balæna major, in inferiore tantùm maxillâ dentata, dentibus arcuatis, falciformibus, pinnam ſeu ſpinam in dorſo habens. *Raj. Syn. Piſc. p.* 15. 4.
Klein. Piſc. Miſ. 2. *p.* 15. 1.
Sibbald. Obſ. p. 13. *Fig. T.* 1. *Lit. A.* (*Fig. mala*).
Phyſeter maxillâ ſuperiore longiore, ſpinâ longâ in dorſo. *Art. Gen. Piſc. g.* 46. *ſp.* 1.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 101. *ſp.* 1.
Phyſeter maxillâ ſuperiore longiore, pinnâ longâ in dorſo. *Art. Synon. Piſc. g.* 46. *ſp.* 1.
Troiſiéme eſpece de Cachalot. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 142.

Corporis longitudo quandoque 70 pedes attingit. Caput tantæ molis eſt, ut, demptâ caudâ, totius corporis mediam longitudinem habeat, & craſſitie reliquam corporis partem, etiam quâ craſſiſſimum, ſuperet. In maxillâ inferiore, quæ ſuperiore paulò brevior eſt, dentes ſunt rotundi, parumper compreſſi, arcuati, & falciformes, in mediâ longitudine craſſiores & magis arcuati, & ſenſim de craſſitie remittentes, ſuperiùs in conum acutum, intùs verſum, deſinentes, inferiùs etiam de craſſitie perdentes, & in radicem tenuiorem & quàm in medio anguſtiorem finientes. In maxillâ ſuperiore totidem ſunt alveoli quot ſunt dentes in inferiore, ad iſtos dentes excipiendos comparati. Oculi

La longueur de ſon corps eſt quelquefois de 70 pieds. Sa tête eſt ſi grande, qu'elle a la moitié de la longueur de tout le corps, ſi l'on en excepte la queue, & qu'elle eſt plus groſſe que le reſte du corps, même dans l'endroit où il eſt le plus épais. La mâchoire inférieure eſt un peu plus courte que la ſupérieure, & eſt garnie de dents rondes, un peu comprimées & recourbées en forme de faucilles. Le plus grand diamétre de chaque dent eſt vers le milieu de ſa longueur, & chacune ſe termine par un cone pointu, dont le ſommet eſt tourné vers la partie intérieure de la bouche. Toutes ces dents s'emboitent dans autant de trous ſitués à la mâchoire ſupérieure. Ses yeux ſont très petits. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé un peu audeſſus du milieu du mu-

ſeau. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune environ 4 pieds de long, il en a ſur le dos une troiſieme aſſez longue, & qui ſe termine en pointe : (ce qui luy a fait donner le nom d'*Epine*). Sa peau eſt très liſſe, & d'un brun noirâtre. Le mâle a une verge longue de 6 pieds, & éloignée des mâchoires d'environ 20 pieds. L'anus eſt placé à environ 3 pieds au-deſſous de la verge ; & de-là juſqu'à la queue il y a 14 pieds de diſtance. Les extrémités de la queue ſont diſtantes de 9 pieds l'une de l'autre.

ſunt perexigui. Parùm ſuprà roſtrum medium fiſtula eſt, per quam aquam in altum ejicit. Binas habet pinnas laterales (utrinque unam) 4 circiter pedes longas, & præter iſtas, tertiam in dorſo ſatis longam, & in acutum deſinentem : (undè *Spinæ* nomen). Cutis eſt leviſſima, & ex fuſco nigricans. Mas penem habet 6 pedes longum, & 20 circiter pedes à mandibulis diſtantem : à pene ad podicem 3 plùs minùs pedum diſtantia eſt : à podice ad caudam diſtantia 14 pedum : caudæ extrema à ſe invicem 9 pedes diſtant.

7. Le Cachalot a dents plattes.

Cetus tripinnis, dentibus in planum deſinentibus.

Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minùs inflexos, & in planum deſinentes. *Raj. Syn. Piſc. p.* 16. 5.
Sibbald. Obſ. p. 18.
Phyſeter pinnâ dorſi altiſſimâ, apice dentium plano. *Art. Gen. Piſc. g.* 46. *ſp.* 2.
Art. Synon. Piſc. g. 46. *ſp.* 2.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 101. *ſp.* 2.
Mular Nierembergii. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 15. 2. *a.*
Piſcis Mularis. *Euſ. Nieremb. p.* 265.
Cachalot à petites dents groſſes & applaties. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 117.

La longueur de ſon corps eſt quelquefois de plus de 100 pieds. Il reſſemble au précédent par ſa figure, mais il en differe par celle de ſes dents, qui ſont moins recourbées, & qui ſe ter-

Corporis longitudo quandoque 100 pedes ſuperat. Figurâ ſuâ præcedentem imitatur, ab eo autem differt figurâ dentium, qui minùs ſunt in medio inflexi, & in planum

deſinunt. Fiſtulam habet in fronte, per quam aquam rejicit & efflat; pinnas duas laterales, & præter iſtas, tertiam in medio ferè dorſo, quam gerit erectam, quæque arbori navis, à Nautis *Mât de Mizéne* dictæ, comparatur. Habitat in mari; frequens circà *Caput Septentrionale*, & circà *Finmarchiam*.

minent par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé ſur le front. Outre les deux nageoires latérales, il en a une troiſiéme preſque au milieu du dos, qu'il porte droite & élevée, & qu'on compare au mât d'un vaiſſeau, appellé *Mât de Mizéne*. On le trouve le plus fréquemment au *Cap du Nord*, & ſur les côtes de *Finmarchie*.

ORDRE III.

LES CETACÉES

Qui ont des dents à la mâchoire ſupérieure ſeulement.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans les deux précédents, qu'un ſeul Genre, qui eſt celui du *Narhval.*

III.

Le Genre du Narhval

Son caractere eſt

D'avoir à la mâchoire ſupérieure ſeulement deux dents très longues, droites, & qui avancent en avant.

ORDO III.

CETACEA

Dentata in maxillâ ſuperiore tantùm.

IN hoc Ordine, ſicut in duobus præcedentibus, unicum continetur Genus, ſcilicet *Ceratodontis.*

III.

Genus Ceratodontis.

Hujus character eſt

In maxillâ ſuperiore tantùm dentes duo longiſſimi, recti, antrorsùm prominentes.

* 1. Le Narhval.

Ceratodon.

Narhwal. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p.* 18. *Fig. T.* 2. *Lit. C.* (*Fig. bona*).
Monoceros Piſcis è Genere Cetaceo. *Raj. Syn. Piſc. p.* 11. 6.
Monoceros Piſcis qui de Genere Cetaceo eſſe fertur. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 42. *Fig. T. A.* 2. (*Fig. mala*) *& cranium cum dente eâdem Tab.* (*Fig. bona*).
Monoceros. Unicornu. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 98. *ſp.* 1.
Monoceros, Unicornu Marinum. *Charlet. Exer. p.* 47.
Unicornu Marinum. *Muſ. Worm. Fig. p.* 282. [*Fig. mala*]. *& cranium Fig. p.* 283. *&* 284. [*Fig. ſat bonis*].
Monodon. *Art. Gen. Piſc. g.* 49. *ſp.* 1.

Art. Synon. Piſc. g. 49. ſp. 1.
Faun. Suec. Linn. No. 263.
Licorne de mer. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 102. *Fig. p.* 108. [*Fig. bonne*].
Les Suédois l'appellent ENHÖRNING. *Linn.*
Les Iſlandois, NARHWAL. *Raj. Will. Art.*
Les Septentrionaux, NARHVAL. *Charlet.*
Les Groënlandois, TOWACK. *Hiſt. d'Iſl.*

Corporis longitudo vulgaris 20 aut 22 pedes circiter æquat. (Sunt qui 40 ad 60 pedes longitudine attingunt, ſecundùm *Anderſon. Hiſt. d'Iſl. & de Gro.*). Caput habet, pro mole corporis, perexiguum. In maxillâ ſuperiore duo ſunt dentes (*a*) 6 aut 7 pedes longi, recti, ſpiraliter intorti (*b*), labium ſuperius perforantes, antrorsùm prominentes. Oculos habet perexiguos; fiſtulam in capite, per quam aquam rejicit; pinnam in dorſo nullam; binas tantùm habet laterales, utrinque unam valdè exiguam. Cutis eſt leviſſima,

La longueur ordinaire de ſon corps eſt d'environ 20 ou 22 pieds. (Il y en a de 40 à 60 pieds, ſelon *Anderſon*, *Hiſt. d'Iſl. & de Gro.*). Sa tête eſt très petite, en comparaiſon de la groſſeur de ſon corps. Il a à la mâchoire ſupérieure deux dents (*a*) longues de 6 ou 7 pieds, droites, tortillées en ſpirale (*b*), qui percent la lévre ſupérieure, & avancent en avant. Ses yeux ſont très petits. Il a par deſſus la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire ſur le dos: il en a ſeulement une de chaque côté, & très petite. Sa peau eſt très liſſe, blanche, & marquée ſur le dos de taches noires. On

(*a*) Rariſſimè reperiuntur *Ceratodontes* duobus dentibus præditi; ex illis enim una perit ordinariè in alveolo ſuo: quod facilè comprobatur inſpectione juniorum, qui omnes duobus dentibus præditi ſunt. Vide *Anderſon. Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Vol. II. p.* 104.

(*b*) Secundùm Authores quoſdam hujusmodi reperiuntur dentes nequaquam ſpiraliter intorti, ſed per totam longitudinem leves. Fortaſſè *Ceratodontis* altera ſpecies.

(*a*) Il eſt très rare de trouver le *Narhval* avec ſes deux dents; parce qu'il y en a ordinairement une qui périt dans ſon alvéole. La preuve de cela, c'eſt que les jeunes en ont deux. Voyez *l'Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 104.

(*b*) Quelques Autheurs diſent avoir trouvé quelques unes de ces dents, qui n'étoient point tortillées en ſpirale, mais liſſes d'un bout à l'autre. C'eſt peut-être une autre eſpece de *Narhval.*

le trouve ordinairement ſur les côtes d'*Iſlande* & de *Groënland*, & dans le *Détroit de Davis*.

alba, maculis nigris in dorſo variegata. Habitat in mari circà *Iſlandiam* & *Groenlandiam*, & in *Freto Davis*.

ORDO IV.

CETACEA

Dentata in utrâque maxillâ.

HIc Ordo, ſicut & præcedentes, unico conſtituitur Genere, ſcilicet *Delphini.*

IV.

Genus Delphini.

Hujus character eſt
Dentes in maxillâ utrâque.

Obſ. Hujus Generis ſpecies ultima binas tantùm habet pinnas laterales, utrinque unam; aliæ omnes, præter iſtas laterales, tertiam habent in dorſo.

ORDRE IV.

LES CETACÉES

Qui ont des dents aux deux mâchoires.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans tous les précédents, qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Dauphin.*

IV.

Le Genre du Dauphin.

Son caractere eſt
D'avoir des dents aux deux mâchoires.

Obſ. La derniere eſpece de ce Genre n'a que deux nageoires latérales, une de chaque côté; toutes les autres, outre ces deux laterales, en ont une troiſiéme ſur le dos.

* 1. Le Dauphin.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ, dentibus acutis, roſtro longo, acuto... Delphinus.

Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto. *Art. Gen. Piſc. g. 47. ſp. 2.*
Art. Synon. Piſc. g. 47. ſp. 2.
Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto. Delphinus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 100. ſp. 2.*
Delphinus antiquorum. *Raj. Syn. Piſc. p. 12. 7.*

Delphinus. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p. 24. Fig. T. 3. Lit. A. & cranium T. I. No. 2. (Fig. bonis)*
Aldro. Piſc. p. 701. Fig. p. 703, & 704. [Fig. malis].
Jonſt. Piſc. p. 154. Fig. T. 43. & cranium T. 44. [Fig. ſat bonis].
Rondel. Piſc. Fig. p. 459. (Fig. ſat bona).
Will. Hiſt. Piſc. p. 28. Fig. T. A. 1. F. 1. (Fig. bona).
Bell. Aquat. p. 7. Fig. p. 9. (Fig. ſat bona).
Muſ. Worm. p. 288.
Charlet. Exer. p. 47.
Delphinus Bellonii. *Geſn. Piſc. p. 380. Fig. p. 381. (Fig. ſat boni).*
Delphinus, vel Delphin. *Geſn. Icon. Aquat. p. 163. Fig. p. 161. & cranium p. 162. (Fig. ſat bona).*
Sus Marinus roſtro acuto. *Euſ. Nieremb. p. 259.*
Daulphin, que nous appellons Oye de mer. *Bell. des Poiſ. p. 6. Fig. p. 7. (Fig. aſſez bonne).*
Dauphin. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p. 153.*
Les François l'appellent Bec d'Oye. *Rondel. Geſn.* Oye de mer. *Bell.*
Les Bretons, Morhouch, *ou* Morho. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Δελφὶς ; Δελφίν. *Geſn. Aldro. Bell. Rondel. Charlet.*
Les Italiens, Delfino. *Geſn.*
Les Allemands, Meerschweyn. *Geſn.*
Les Polonois, Morska Swinia. *Geſn. Aldro.*
Les Suédois, Marswin. *Linn.*
Les Norvégeois, Nyssa. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Hollandois, Tuymelaar. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Marins, Tummeler. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Flamands, Meerswyn. *Aldro.*
Les Anglois, Dolphin. *Raj. Art.* Porpesse. *Will. Art.*

La longueur de ſon corps eſt de 9 ou 10 pieds : ſon diamétre, dans l'endroit le plus gros, d'environ 2 pieds. Son corps eſt oblong & rond, gros à la partie antérieure ; & la poſtérieure ſe termine en pointe. Son muſeau eſt rond, long & pointu ; l'ouverture de ſa bouche a environ 14 ou 15 pouces. Ses deux mâchoires ſont armées de petites dents pointuës comme des alênes. Ses yeux ſont aſſez grands. Il a par deſſus la tête un canal,

Corporis longitudo 9 aut 10 pedes attingit : diameter, quâ parte craſſiſſimum, 2 circiter pedes. Corpus habet oblongum & terete, in parte anteriore craſſum, in poſteriore verò in acumen deſinens; roſtrum rotundum, longum & acutum ; oris rictum 14 aut 15 pollices longum. In utrâque maxillâ dentibus munitur exiguis, *Subularum* inſtar, acutis. Oculos habet ſat magnos ; fiſtulam in

capite, per quam aquam rejicit; pinnas duas laterales 16 circiter pollices longas & 10 pollices latas, & tertiam inſupèr medium versùs dorſum 1 ½ pedem longam & 13 pollices latam. Caudæ latitudo 2 circiter pedes æquat. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigra, in ventre alba.

par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, deux latérales longues d'environ 16 pouces & larges de 10, & une vers le milieu du dos longue de 1 ½ pied & large de 13 pouces. Sa queue eſt large d'environ 2 pieds. Sa peau eſt très liſſe, & noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre.

2. Le Marsouin.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ, dentibus acutis, roſtro brevi, obtuſo... PHOCÆNA.

Delphinus corpore ferè coniformi, dorſo lato, roſtro ſubacuto. *Art. Gen. Piſc. g.* 47. *ſp.* 1.
Art. Synon. Piſc. g. 47. *ſp.* 1.
Delphinus corpore ſubconiformi, dorſo lato, roſtro ſubacuto. Phocæna. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 100. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. No. 266.
Phocæna Rondeletii; Geſn. *Raj. Syn. Piſc. p.* 13. *A.* 8.
Will. Hiſt. Piſc. p. 31. *Fig. T. A.* 1. *F.* 2. (*Fig. bona*).
Phocæna. *Rondel. Piſc. p.* 473.
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 163. (*Fig. bona*).
Jonſt. Piſc. p. 155. *Fig. T.* 41. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 48.
Turſio, ſive Phocæna. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 26. *Fig. T.* 3. *Lit. B. Fœtus T.* 2. *Lit. A. B. & Cranium T.* 1. *No.* 3. (*Fig. bonis*).
Geſn. Piſc. Fig. p. 837. (*Fig. bona*).
Aldro. Piſc. p. 719. *Fig. p.* 720. (*Fig. bona*).
Turſio. *Rondel. Piſc. Fig. p.* 474. (*Fig. bona*).
Bell. Aquat. p. 15. *Fig. p.* 16. (*Fig. bona*).
Sus Marinus, roſtro obtuſo. *Euſ. Nieremb. p.* 259.
Marſouin. *Bell. des Poiſ. Fig. p.* 12. (*Fig. bonne*).
Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I. p. 211.
Marſouin, Souffleur, ou Tunin. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 151.
Les Grecs l'appellent φωκαινα. *Geſn. Aldro. Bell.*
Les Allemands, MEERSCHWEYN. *Geſn.*
Les Suédois, MARSWIN. *Linn. Art.* TUMBLARE. *Linn.*
Les Danois, MARSUIN. *Art.* BRUUSKOP, *ou* SPRINHWAL, *ou* SPRINGER. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Cimbres, MARSUIN. *Raj. Will. Art.*

Les Norvégeois, MARSUEN, *ou* NISER. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Iſlandois, SUINHUAL, *ou* SUINHUALLUR, *ou* WITINGR. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Flamands, BRUYNVISCH. *Aldro.*
Dans la Friſe Orientale, BRUNFISCH. *Geſn.*
Les Anglois, PORPESSE. *Raj. Will. Art. Klein. Hiſt. d'Iſl.* PORPUS. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Ecoſſois, SEA-PORC. *Hiſt. d'Isl.*

Son corps eſt beaucoup plus gros & moins long que celui du *Dauphin*: il en differe encore par la forme de ſon muſeau, qui eſt court & obtus. Ses deux mâchoires ſont armées de petites dents pointuës. Ses yeux ſont très petits. Il a ſur le ſommet de la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a, comme le *Dauphin*, trois nageoires, deux latérales & une vers le milieu du dos. Sa peau eſt très liſſe, & noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. On le trouve dans toutes les mers.

A *Delphino* differt corpore craſſiore & minus longo, & roſtro brevi & obtuſo. Dentes habet in utrâque maxillâ parvos & acutos; oculos perexiguos; fiſtulam in cervice, per quam aquam rejicit; pinnas tres, *Delphini* inſtar, duas ſcilicet laterales, & præter iſtas, tertiam medium verſùs dorſum. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigra, in ventre alba. Habitat ubiquè in mari.

3. L'ÉPÉE-DE-MER.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ Gladii recurvi æmulâ, dentibus acutis, roſtro quaſi truncato.

Epée de Mer. *Hiſt. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 155.
Les Pêcheurs de Baleines, *ſur les côtes de la Nouvelle Angleterre, l'appellent* KILLÆRS. *Hiſt. d'Isl.*

La longueur de ſon corps eſt d'environ 10 ou 12 pieds. (Celles qu'on prend ſur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*, & qu'on y appelle *Killærs*, ont quelquefois juſqu'à 30 pieds de long). Son muſeau eſt comme tronqué. Ses deux mâchoires

Corporis longitudo 10 aut 12 pedes æquat. (Qui circà *Novam Angliam* capiuntur, quique ibi *Killærs* vocantur, quandoque 30 pedum longitudinem attingunt). Roſtrum habet quaſi truncatum; dentes in utrâque maxillâ parvos

& acutos; fiſtulam in capite, per quam aquam ejicit; pinnas duas laterales, utrinque unam, & præter iſtas, tertiam in dorſo *gladii* recurvi æmulam, 3 aut 4 pedes longam, & unum vel 1 ½ pedem in origine latam; quæ latitudo, ſenſim versùs ejus extremum procedendo, minuitur. Habitat in mari circà *Spitzbergam*, in *Freto Davis*, & circà *Novam Angliam*.

ſont armées de petites dents pointuës. Elle a ſur la tête un canal, par lequel elle rejette l'eau. Outre ſes deux nageoires latérales, elle en a ſur le dos une troiſiéme, qui reſſemble aſſez à à un *ſabre* recourbé: cette nageoire a 3 ou 4 pieds de long, & 1 pied ou 1 ½ pied de large proche le corps; & elle devient de plus en plus étroite, à meſure qu'elle s'en éloigne. On la trouve prés de *Spitzberg*, dans le *Détroit de Davis*, & ſur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*.

4. L'EPAULARD.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ, dentibus obtuſis... ORCA.

Delphinus roſtro ſursùm repando, dentibus latis ſerratis. *Art. Gen. Piſc. g.* 47. *ſp.* 3.
Art. Synon. Piſc. g. 47. *ſp.* 3.
Faun. Suec. Linn. N°. 267.
Delphinus roſtro ſursùm repando, dentibus latis ſerratis. Orca. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6 g.* 100. *ſp.* 3.
Balæna minor, utrâque maxillâ dentata, *Orca* dicta Bellonio & Rondeletio. *Raj. Syn. Piſc. p.* 15. 1.
Sibbald. Obſ. p. 6.
Orca Rondeletii & Bellonii. *Raj. ſyn. Piſc. p.* 16. 3.
Will. Hiſt. Piſc. p. 40.
Geſn. Piſc. Fig. p. 748. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Aquat. p. 168. *Fig. p.* 169. [*Fig. bona*].
Orca. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 22. *cujus cranium Fig. T. I. No.* 1. (*Fig. bona*).
Aldro. Piſc. p. 697. *Fig. p.* 698. (*Fig. mala*).
Jonſt. Piſc. p. 153.
Rondel. Piſc. Fig. p. 483. (*Fig. bona*).
Bell. Aquat. p. 16. *Fig. p.* 18. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 47.
Buts-Kopf. Frid. Martenſ. *Raj. Syn. Piſc. p.* 16.
Butzkopf. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 150.
Oudre, ou Grand Marſouin. *Bell. des Poiſ. p.* 13. *Fig. p.* 14. (*Fig. mauv.*).

Les Eſpagnols l'appellent TINET. *Geſn.*
Les Allemands, VASSZ WAL; ZUBER-WAL. *Geſn.*
Les Suédois, LÔPARE. *Linn.*
Ceux qui habitent les bords de l'Ocean, LOPER. *Art.*
Les Norvégeois, SPRINGWAL. *Geſn.*
Les Anglois, GRAMPUS. *Raj. Art. Hiſt. d'Iſl.*
Les Ecoſſois, NORTH CAPER. *Raj. Art. Hiſt. d'Iſl.*

La longueur de ſon corps eſt d'environ 24 ou 25 pieds: ſon diamétre, dans l'endroit le plus gros, qui eſt vers le ventre, ſurpaſſe la moitié de ſa longueur. Ses deux mâchoires ſont armées de dents obtuſes. La mâchoire inférieure eſt beaucoup plus grande & plus épaiſſe que la ſupérieure. Ses yeux ſont ſemblables à ceux des *Bœufs*. Il a ſur la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, ſçavoir deux latérales, & une ſur le dos qui a plus de 3 pieds de long. Sa peau eſt très liſſe, & noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. On le trouve dans les *Mers Occidentales*.

Longitudo corporis 24 vel 25 circiter pedes attingit: Hujus diameter, quâ parte craſſiſſimum eſt, circà ventrem ſcilicet, mediam longitudinem ſuperat. Dentes habet in utrâque maxillâ obtuſos; maxillam inferiorem ſuperiore multò majorem & craſſiorem; oculos oculis *Bovinis* ſimiles; fiſtulam in capite, per quam aquam rejicit. Tribus donatur pinnis, duobus lateralibus, & inſuper tertiâ in dorſo 3 pedum longitudinem ſuperante. Cutis eſt leviſſima, nigra in dorſo, in ventre alba. Habitat in *Mari Occidentali*.

5. LE SOUFFLEUR.

Delphinus pinnâ in dorſo nullâ... PHYSETER.

Phyſeter. *Rondel. Piſc. Fig. p.* 485.
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 170.
Aldro. Piſc. Fig. p. 689.
Jonſt. Piſc. p. 153.
Charlet. Exer. p. 47.
Phyſeter Rondeletii, Geſn. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 41.
(Phyſalus Bellua, ſeu) Phyſeter Rondeletii. *Geſn. Piſc. Fig. p.* 851.
Les Xaintongeois l'appellent SEDENETTE. *Rondel. Geſn.*
Les Languedochiens, MULAR. *Rondel. Geſn.*
Les Grecs, φυσητήρ. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, CAPIDOGLIO. *Rondel. Geſn.*

Les Allemands, SPRÜTZWAL ; WETTERWAL. *Geſn.*
Les Anglois, WHIRLE-POOL. *Will. Geſn.*

Deſcriptione *Phyſeteris*, quam nobis dedit *Rondeletius*, videtur eum nec eſſe en Genere *Balænarum*, nec ex Genere *Cetorum*; dentes enim habet quemadmodùm *Orca*: *Orca* autem dentibus in utrâque maxillâ munitur; quamobrem *Phyſeterem Delphini* Generis eſſe putavi. Hæc ſunt verba *Rondeletii*. *Phyſeter* « Bellua eſt admirandæ magnitudinis, ex Balænarum » Genere: ore maximo, dentibus acutis, ſerratis quemadmodùm Orca. Lingua intùs magna & carnoſa. Fiſtulam longè ampliorem habet, quàm reliquæ Belluæ: quam ob cauſam multò plùs aquæ rejicit & efflat, undè illi nomen φυσητηρος. Ab Orca differt, quod multò longior ſit, & dorſi pinnâ careat. Pinguedine multâ abundat, veluti Balæna & Belluæ reliquæ ». Habitat in Oceano.

Il paroît par la deſcription que *Rondelet* a donnée du *Souffleur*, qu'il doit être ſéparé des *Baleines* & des *Cachalots*, puiſqu'il a les dents comme l'*Epaulard*, lequel en a aux deux mâchoires: c'eſt pourquoi je l'ai placé dans le même Genre. Voilà mot pour mot la deſcription qu'en donne *Rondelet*. *Le Souffleur*, « eſt un Cetacée d'une grandeur » extraordinaire, du Genre des » *Baleines*: ſa bouche eſt très » grande; ſes dents ſont pointuës, & en forme de ſcie, comme celles de *l'Epaulard*: ſa langue eſt grande & charnuë. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt beaucoup plus grand que ceux des autres *Cetacées*: c'eſt pourquoi il rejette beaucoup plus d'eau, & avec plus de violence: d'où luy eſt venu le nom de *Souffleur*. Il differe de *l'Epaulard* en ce qu'il eſt beaucoup plus long, & qu'il n'a point de nageoire ſur le dos. Il devient très gras, comme la » *Baleine* & les autres *Cetacées* ». On le trouve dans l'Ocean.

TABLE

TABLE
DES CETACÉES,

Selon l'Ordre dans lequel ils ſont rangés dans cet Ouvrage.

ORDRE I.

I. Genre de la Baleine.

1. La Baleine ordinaire de Groënland.
2. La Baleine d'Iſlande.
3. La Baleine de la Nouvelle Angleterre.
4. La Baleine à ſix boſſes.
5. Le Gibbar.
6. La Baleine à muſeau rond.
7. La Baleine à muſeau pointu.

ORDRE II.

II. Genre du Cachalot.

1. Le Cachalot.
2. Le Cachalot blanc.
3. Le Cachalot de la Nouvelle Angleterre.
4. Le Petit Cachalot.
5. Le Cachalot à dents pointuës.
6. Le Cachalot à dents en faucilles.
7. Le Cachalot à dents plattes.

ORDRE III.

III. Genre du Narhval.

1. Le Narhval.

ORDRE IV.

IV. Genre du Dauphin.

1. Le Dauphin.
2. Le Marſouin.
3. L'Epée-de-mer.
4. L'Epaulard.
5. Le Souffleur.

TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre ; & la lettre E, l'Eſpece.

B.

	G.	E.
BAleine,	1.	
— De Groënland,	1	1.
— D'Iſlande,	1	2.
— A muſeau pointu,	1	7.
— A muſeau rond,	1	6.
— De la Nouvelle Angleterre,	1	3.
— Ordinaire de Groënland,	1	1.
— A ſix boſſes,	1	4.
Balene,	1	6.
Bec d'Oye,	4	1.

C.

	G.	E.
CAchalot,	2.	
—	2	1.
—	2	3.
— Blanc,	2	2.
— Des côtes de la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— A dents en faucilles,	2	6.
— A dents plattes,	2	7.
— A dents pointuës,	2	5.
— (Deuxiéme eſpece de)	2	5.
— De la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— (Petit)	2	4.
— A petites dents groſſes & applaties,	2	7.
— (Troiſiéme eſpece de)	2	6.

D.

	G.	E.
DAulphin,	4	1.
Dauphin,	4.	
—	4	1.

E.

	G.	E.
EPaulard,	4	4.
Epée-de-mer,	4	3.

G.

	G.	E.
GIbbar,	1	5.

L.

	G.	E.
LIcorne de mer,	3	1.

M.

	G.	E.
MArſouin,	4	2.
— (Grand)	4	4.

N.

	G.	E.
NArhval,	3.	
—	3	1.

O.

	G.	E.
OUdre,	4	4.
Oye de mer,	4	1.

S.

	G.	E.
SEdenette,	4	5.
Souffleur,	4	2.
—	4	5.

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus deſignat; & Littera S, Speciem.

A.

	G.	S.
Aquatile ingens,	2	1.
Arbach,	1	1.

B.

	G.	S.
Balæna,	1.	
—	2	1.
— &c,	2.	
— Albicans,	2	2.
— Dudleji,	2	3.
— Glacialis,	1	2.
— Iſlandica,	1	2.
— Minor, *Orca* dicta,	4	4.
— Novæ Angliæ,	1	3.
— Rondeletii, Geſneri & Aliorum,	1	1.
— Vera,	1	5.
— Vera Rondeletii,	1	5.
— Vera Zorgdrageri,	1	1.
— Vulgaris,	1	1.
— Vulgaris Groenlandica,	1	1.
— Vulgi,	1	1.
— Vulgò dicta,	1	1.
Baleine,	1.	
— De Gro nland,	1	1.
— D'Iſlande,	1	2.
— A muſeau pointu,	1	7.
— A muſeau rond,	1	6.
— De la Nouvelle Angleterre,	1	3.
— Ordinaire de Groënland,	1	1.
— A ſix boſſes,	1	4.
Balena,	1	6.
— Bellonii,	1	6.
Balena,	1	5.
Balene,	1	6.
Bec d'Oye,	4	1.
Brunfiſch,	4	2.
Bruuſkop,	4	2.
Bruynviſch,	4	2.
Bunch,	1	3.
Buts-Kopf,	4	4.
Butzkopf,	4	4.

C.

	G.	S.
Cachalot,	2.	
—	2	1.
—	2	3.
— Blanc,	2	2.
— Des côtes de la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— A dents en faucilles,	2	6.
— A dents plattes,	2	7.
— A dents pointuës,	2	5.
— (Deuxiéme eſpece de)	2	5.
— De la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— (Petit)	2	4.
— A petites dents groſſes & applaties,	2	7.
— (Troiſiéme eſpece de)	2	6.
Cachelot,	2	1.
Caper, (Nord)	1	2.
—	2	1.
Capidoglio,	4	5.
Catodon fiſtula in cervice,	2	1.
— Fiſtula in roſtro,	2	4.

	G.	S.
Cazilot,	2	1.
Ceratodon,	3.	
—	3	1.
Cete,	2	1.
— Cluſii,	2	1.
— (Aliud) admirabile,	2	1.
Cetus,	2.	
—	2	1.
— Albicans,	2	2.
— Dentatus,	2	1.
— Minor,	2	4.
— Novæ Angliæ,	2	3.
D.		
	G.	S.
Daulphin,	4	1.
Dauphin,	4.	
—	4	1.
Delfino,	4	1.
Delphin,	4	1.
Δελφίν,	4	1.
Delphinus,	4.	
—	4	1.
— Antiquorum,	4	1.
— Bellonii,	4	1.
Δελφίς,	4	1.
Dolphin,	4	1.
E.		
	G.	S.
Enhörning,	3	1.
Epaulard,	4	4.
Epée-de-mer,	4	3.
F.		
	G.	S.
Finbak-Whale,	1	5.
Finfiſch,	1	5.
Finfish,	1	5.
Finn-fisk,	1	5.
Fiſch, (Knobbel)	1	4.
— (Knoten)	1	4.
Fish, (White)	2	2.
G.		
	G.	S.
Gibbar,	1	5.
Grampus,	4	4.
Greenlands-Whale,	1	1.
Groenlands-Hwalfisken,	1	1.
Grönlands-Walfisk,	1	1.
H.		
	G.	S.
Hump-back-whale,	1	3.
Hwalfisken, (Groenlands)	1	1.
K.		
	G.	S.
Killærs,	4	3.
Knobbel-fiſch,	1	4.
Knoten-fiſch,	1	4.
Kopf, (Buts)	4	4.
— (Butz)	4	4.
L.		
	G.	S.
Licorne de mer,	3	1.
Löpare,	4	4.
Loper,	4	4.
M.		
	G.	S.
Marſouin,	4	2.
— (Grand)	4	4.
Marſuen,	4	2.
Marſuin,	4	2.
Marſwin,	4	1.
—	4	2.
Meerſchweyn,	4	1.
—	4	2.
Meerſwyn,	4	1.
Monoceros,	3	1.
— Piſcis,	3	1.
Monodon,	3	1.
Morho,	4	1.
Morhouch,	4	1.
Morskaſwinia,	4	1.
Mular,	4	5.
— Nierembergii,	2	7.
Muſculus,	1	1.
— Plinii,	1	1.
Myſticetus,	1	1.
— Ariſtotelis,	1	1.

N.

	G.	S.
NArhval,	3.	
—	3	1.
Narhwal,	3	1.
Narwhal,	3	1.
Niſer,	4	2.
Nord-caper,	1	2.
—	2	1.
Northcaper,	4	4.
Nyſſa,	4	1.

O.

	G.	S.
ORca,	4	4.
— Bellonii,	4	4.
— Rondeletii,	4	4.
Oudre,	4	4.
Oye de mer,	4	1.

P.

	G.	S.
PFlockfiſch,	1	3.
Φ'αλαινα,	1	5.
Phocæna,	4	2.
— Rondeletii,	4	2.
φωκαινα,	4	2.
Phyſalus,	1	5.
— Bellua,	4	5.
Phyſeter,	4	5.
— &c,	2	6.
—	2	7.
— Rondeletii,	4	5.
— Veterum,	1	5.
Φυσητηρ,	4	5.
Piſcis [Albus] Cetaceus,	2	2.
— [Monoceros]	3	1.
— Mularis,	2	7.
Pool, (Whirle)	4	5.
Porc, [Sea]	4	2.
Porpeſſe,	4	1.
—	4	2.
Porpus,	4	2.
Potfiſch,	2	1.
Potfish Zorgdrageri,	2	1.
Potwalfish,	2	1.

S.

	G.	S.
SAndhual,	1	1.
Schweyn, (Meer)	4	1.
—	4	2.
Scrag-Whale,	1	4.
Sea-Porc,	4	2.
Sedenette,	4	5.
Slettbark,	1	1.
Slichteback,	1	1.
Slitbakker,	1	1.
Souffleur,	4	2.
—	4	5.
Sperma ceti-whale,	2	3.
Spring wal,	4	4.
Springer,	4	2.
Sprinhwal,	4	2.
Sprützwal,	4	5.
Suinhual,	4	2.
Suinhuallur,	4	2.
Sus Marinus roſtro acuto,	4	1.
— Marinus roſtro obtu-ſo,	4	2.
Swinia, (Morska)	4	1.

T.

	G.	S.
TInet,	4	4.
Towack,	3	1.
Trumpo,	2	3.
Tumblare,	4	2.
Tummeler,	4	1.
Tunin,	4	2.
Turſio,	4	2.
Tuymelaar,	4	1.

V.

	G.	S.
VAlena,	1	1.
Vallena,	1	1.
Vaſſz Wal,	4	4.
Unicornu,	3	1.
— Marinum,	3	1.

W.

	G.	S.
WAl,	1	1.
— (Spring)	4	4.

	G.	S.
— (Sprinh)	4	2.
— (Sprütz)	4	5.
— (Vaſſz)	4	4.
— (Wetter)	4	5.
— (Zuber)	4	4.
Walfisk, [Gr nlands]	1	1.
Waller,	1	1.
Wallfiſch,	1	1.
Weisfiſch,	2	2.
Wetter-Wal,	4	5.
Whale,	1	1.
— [Finbak]	1	5.
— [Greenlands]	1	1.
— [Hump-back]	1	3.
— (Scrag)	1	4.
— [Sperma ceti]	2	3.
Whirle-Pool,	4	5.
White-fish,	2	2.
Whittfiſch,	2	2.
Witingr,	4	2.

Z.

	G.	S.
Zuber-Wal,	4	4.

EXTRAIT DES REGISTRES
de l'Académie Royale des Sciences.

Du 6 Septembre 1754.

MESSIEURS Duhamel & de Juſſieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, qui a pour titre : *Le Regne Animal, diviſé en neuf Claſſes. Premiere Claſſe, Les Quadrupedes*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que la méthode employée par l'Auteur, paroiſſoit plus exacte que celles qui avoient été publiées, & qu'elle méritoit ſon Approbation : en foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat. A Paris, le 2 Décembre 1754.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

EXTRAIT DES REGISTRES
de l'Académie Royale des Sciences.

Du 23 Avril 1755.

MESSIEURS Duhamel & de Juſſieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, dans lequel il établit une nouvelle Claſſe, à laquelle il rapporte les Animaux que les Naturaliſtes déſignent par le nom de *Cetacées*, & qu'ils rangent parmi les *Poiſſons*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que cet Ouvrage rempli d'ailleurs de recherches curieuſes ſur les différens noms donnés par les Auteurs à chacun de ces Animaux, pouvoit être utile aux Naturaliſtes, & méritoit d'être imprimé avec ſon Approbation, en foi de quoi j'ai ſigné le préſent certificat. A Paris, ce 26 Avril 1755.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amés & feaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, SALUT : Nos bien amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expoſer qu'ils auroient beſoin de nos Lettres de Privilege pour

l'impreſſion de leurs Ouvrages. A CES CAUSES voulant favorablement traiter les Expoſans, Nous leur avons permis & permettons par ces préſentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudroient choiſir, toutes les recherches ou obſervations journalieres, ou relations annuelles de tout ce qui a été fait dans les aſſemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires, ou traités de chacun des Particuliers qui la compoſent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner leſdits Ouvrages, & jugé qu'ils ſont dignes de l'impreſſion, en tel volume, forme, marge, caractere, conjointement ou ſéparement, & autant de fois que bon leur ſemblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes; ſans toutesfois qu'à l'occaſion des Ouvrages ci-deſſus ſpécifiés ils puiſſent en imprimer d'autres qui ne ſoit pas de ladite Académie: Faiſons défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes, de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangère dans aucun lieu de notre obéiſſance, comme auſſi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucune traduction ou extrait, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit des Expoſans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expoſant, ou de celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de l'expoſer en vente, les Manuſcrits ou Imprimés qui auront ſervis de copie à l'impreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur DAGUESSEAU, Commandeur de nos Ordres, Chancelier de France, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires de chaqu'un dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préſentes; du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir leſdits Expoſans & leurs ayans cauſes pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la Copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue pour dûement ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conſeillers Secretaires, foi ſoit ajoûtée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceſſaires ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le dix-neuviéme du mois de Mars, l'an de grace mil ſept cent cinquante, & de notre Regne le trente-cinquiéme. Par le Roi en ſon Conſeil.

MOL.

Regiſtré ſur le Regiſtre douze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 430. fol. 309. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenſes à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles ſoient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, ſoit qu'ils s'en diſent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la ſuſdite Chambre huit Exemplaires preſcrits par l'Article 108 du même Reglement. A Paris le 5 Juin 1750.

LE GRAS, *Syndic.*